



● ● ● إِنْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا... (سوره کهف، آیه ۷) ● ● ●


مسلماناً ما آنچه را روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدامشان در عمل نیکوترند.

● آفریدگار هستی به ما فرصتی به نام زندگی بخشیده است تا برای پر رنگ کردن نقش و تأثیر خود در این جهان پهناور پیوسته تلاش کنیم. تلاشی آگاهانه و هدفمند برای آفریدن آثاری جاودانه، آن چنان که آینده‌ای باشد از شکرانه امروز و سرمایه‌ای ارزشمند برای آیندگان. پویندگان چنین راهی در این پهنه، پیوسته به کشف اسرار می‌پردازند از جمله آنکه چگونه شمار بسیاری ماده با رفتارهای گوناگون، تنها از شمار معینی اتم با آرایش و چیدمانی نظام‌مند پدید آمده‌اند. شیمی دانشی است که به ما کمک می‌کند تا هوشمندانه از مواد در خلق آثاری هنرمندانه، زیبا و ماندگار بهره ببریم.

انسان از دیر باز مواد ضروری برای زندگی خود را از خوان نعمت‌های الهی گسترده شده در جای جای زمین تأمین کرده و برای رفع نیاز آنها را تغییر داده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در تغییر این مواد، افزون بر محیط و شیوه زندگی، آیین‌ها، آداب و رسوم و حتی ادبیات و افسانه‌ها نیز نقش داشته‌اند. با این توصیف، هر یک از آثار به جای مانده از گذشتگان در جهان را می‌توان نمادی از هنر زمان خویش دانست که افزون بر زیبایی، بازتابی از ماندگاری آن اثر نیز به شمار می‌رود (شکل ۱).



پ) مجسمه موآی در جزیره ایستر



ب) سفالینه‌ای از ایران باستان



آ) تنگ آبخوری دوره ساسانی

شکل ۱- نمونه‌های فلزی، سفالی و سنگی به جای مانده از گذشتگان

بدیهی است که مواد اولیه برای ساخت چنین آثاری افزون بر فراوانی و در دسترس بودن، باید واکنش‌پذیری کم، استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. توجه کنید که عمر طولانی این آثار، تأییدی بر این ویژگی‌ها است و هر چه عمر یادگار به جا مانده بیشتر باشد، گفتنی‌های بیشتری با خود دارد، گفتنی‌هایی که اسرار هنر، زیبایی و ماندگاری را فاش می‌کند. با رشد و پیشرفت علوم به ویژه شیمی، پرده از این اسرار برداشته شد تا پایه‌ای برای ساخت سازه‌ها و بناهای امروزی و در خور ستایش فراهم گردد.

شیمی‌دان‌ها در گام نخست، نوع، مقدار، ساختار و رفتار مواد سازنده آثار به جا مانده را بررسی کردند، سپس با بهره‌گیری از دانش شیمی توانستند به مواد جدیدتری دست یابند. موادی با خواص ویژه که کاربردهای معین داشتند. برخی بر این باورند که چنین موادی را می‌توان مبنای کار و کلید موفقیت طراحان، هنرمندان و مهندسان برای خلق سازه‌های زیبا و ماندگار امروزی دانست.

آیا می‌دانید

خاک‌رس از نخستین مواد در دسترس بشر به شمار می‌رود. این مخلوط به دلیل تفاوت در نوع و مقدار اجزای سازنده بسیار متنوع است، به طوری که فراورده‌های آن گستره‌ای از آجر تا ظروف چینی را در بر می‌گیرد. سفال معروف به جادوی آب و خاک از کهن‌ترین دست سازه‌های انسان است که از خاک‌رس ساخته می‌شود.

* اردو میں ۵ تین فارسی ۱۱ غیرم الکد و صدد ۱۱ شتہ ۱۱ ش

در سال ۱۳۹۵ این شرکت فاکس فیدرات $\frac{11 \times 1.39}{2 \times 1.79} \times 100 = 74.4$ درصد $\frac{1190}{1790} \times 100 = 66.48$ درصد

خود را بیازمایید

خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است. جدول زیر درصد جرمی^۱ مواد سازنده نوعی

خاک رس^۲ را نشان می‌دهد که از یک معدن طلا استخراج شده است.

عنصر از مجموع اتم برابر ۱۵ است.

درصد جرمی						
ماده						
Au و دیگر مواد	MgO	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	H ₂ O	Al ₂ O ₃	SiO ₂
۰/۱	۰/۴۴	۰/۹۶	۱/۲۴	۱۳/۳۲	۳۷/۷۴	۴۶/۲۰

۱- با توجه به داده‌های جدول به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

(آ) نام شیمیایی هر یک از مواد موجود در این نوع خاک را بنویسید.

(ب) سرخ فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می‌دهید؟

(پ) پیش بینی کنید هنگام پختن سفالینه های تهیه شده از این نوع خاک رس، از جرم کدام




ماده به مقدار بیشتری کاسته می شود؟ چرا؟ H_2O چون ترکیب مذکوره بوده دمای ذوب و جوش کمتری دارد. فیلیدی بنی در ۱۵۰ سانتی گراد

۲- اگر اجزای این مخلوط نخست جداسازی شده سپس خالص سازی شوند، پیش بینی کنید ساختار ذره‌ای هریک از این اجزا در حالت خالص و جامد (به جز SiO_2) با کدام الگوی

زیر همخوانی دارد؟ چرا؟

جامعہ پرینی

جامعہ ملری



عنصر: ماده‌ی خالصی است که از یک نوع اتم ساخته شده باشد
 O_2 و O_3 و Cl_2 و F_2 و Au
 ترتیب یا ماده مرکب: ماده‌ی خالصی که از یک نوع ذره ساخته شده ولی در این یک نوع ذره بیش از یک عنصر اتم به کار رفته مانند H_2O و Al_2O_3



● نمونه‌ای از نقش‌کند روی سنگ در گنجنامه همدان.

$Al(OH)_3, NaOH, H_2FeO_4, H_2SO_4$
 شبنم از این نوع در ایران واهمه
 مستقیم نمواند به طبیعت تولید است
 (ب) جاذبه مولکولی (ب) واهمه از این نوع
 مرکز در بد اینها H_2O
 (پ) عنصر (Al) از یک نوع
 اتم ساخته شده است

با مواد سازنده نوعی خاک رس آشنا شدید که مخلوطی از اکسیدها را دربرمی گیرد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که SiO_2 افزون برخاک‌های رس، یکی از سازنده‌های اصلی بسیاری از سنگ‌ها، صخره‌ها و نیز شن و ماسه است. وجود این ماده باعث استحکام و ماندگاری سازه‌های سنگی و نقشکننده‌های روی آنها شده است. آیا می‌دانید چه ساختاری

باعث این رفتار ویژه می شود؟

جہاں ہر موکلہ کی یا ترتیب کو نوڈ وائس: انڈیکس اور واحد کی
مستقلی بننا ہر موکلہ کی ہر جوڑا آمدہ مانہ
کرنس دی آئیہ Co_2 وید Ir

ترکیب بدنه: شبیه ای غول آسا از یون
های مثبت و منفی است و در آن واحد
مستقل، نام تکمیل و محدود ندارد.

Mass Percent Clay

جایه ششگ یا جایه کوئولانسی : شبکه غول اسین از اتم ها بیشتر با پیوندهای کوئولانسی به هم مربوط هستند

در ساختار آن ها واحد متعلق به فاسفید و هیدروژن دارد ماده

الکسان C و بیلیس Si-


SiO₂

+ ۱۷۰۰°C در دمای بالا

اگر تمام مواد موجود را با تغییر فرمت در دما به فصل
جایگزین کنیم آن ها را بر اساس نوع ذرات
سازنده (اتم، مولکول یا یون) و نوع نیروی
جاذبه بین ذره ای (لانه ن دوانه ردا ن
دهیه ردرنی - فزنی - نیو یا کوئ دوانی)
به چهار دسته تقسیم کرد.


سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار

سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته جامد زمین است به طوری که
ترکیب های گوناگون این دو عنصر بیش از ۹۰٪ پوسته جامد زمین را تشکیل می دهند، از این
رو سیلیس^۱ (SiO_2)، فراوان ترین اکسید در این لایه از سیاره ما به شمار می رود. کوارتز^۲ از
جمله نمونه های خالص و ماسه از جمله نمونه های ناخالص سیلیس است.
از شیمی ۲ به یاد دارید که Si ۴، شبه فلزی از خانواده کربن است، از این رو شاید تصور کنید که
ساختار سیلیسیم مانند کربن است و سیلیس ساختاری همانند کربن دی اکسید دارد! (شکل ۲).




شکل ۲- نمونه ای از سیلیسیم، سیلیس و یخ خشک

مانند CO_2 و HCl و H_2O ...
لانه ن یا دوقطبی انیونی - دوقطبی انیونی



جاذبه دوانه ردا ن یا جاذبه دوقطبی - دوقطبی



کپیونیه هیدروژنی نوعی

جاذبه قوی دوقطبی - دوقطبی




رادی دوج ذرات آن ها بین ذرات با هم
ارابه ها به هم می چسبند

برای آشکار شدن این موضوع باید ساختار هر یک از آنها را بررسی و با یکدیگر مقایسه کرد.

با هم ببیندیشیم

۱- با توجه به شکل های زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید.

$\text{CO}_2(\text{g})$



$\text{CO}_2(\text{s})$

از تکرار واحد متقطعی نیم
مولکول کربن دی اکسید موجود است
پس جاذبه مولکول است.



۶۸

بادی دوج و جوش
و بین دوج ذرات
ذره ای ضعیف



$\text{SiO}_2(\text{s})$

شبه شبکه ردا ن از اتم های
 Si و O با پیوند کوئ دوانی
آن به هم مربوط هستند.
پس جاذبه کوئ دوانی با
سختی دوج ذرات با
دست خنک رسیده



۱- Silica
۲- Quartz

(آ) از شیمی ۱ به یاد دارید که مواد مولکولی در ساختار خود مولکول‌های مجزا دارند. کدام ماده در شکل ۴ جزو مواد مولکولی است؟ CO_2 ، H_2O ، CH_4 ، C_{60} ، SiO_2


(ب) ماده کووالانسی مجموعه‌ای از اتم‌های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند.

۲- پیش بینی کنید کدام ماده:

۱- پیش بینی کنید کدام ماده:
(ا) سخت تر است؟ چرا؟ SiO_2 چون شامل اتم های از Si و O است که در یک فضای خونی با پیوندهای کووالانسی به هم متصل هستند.
(ب) نقطه ذوب پایین تری دارد؟ چرا؟ CO_2 چون از واحد های مستقل (کوئال) به وجود آمده که با پیوندهای ضعیف دوقطبی $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ به هم پیوسته و با پیوندهای تری کس این پیوندها ضعیفتر می شود.

دریافتید که موادی مانند کربن دی اکسید و آب، مواد مولکولی به شمار می‌روند زیرا ذره‌های سازنده آنها مولکول‌های مجزا هستند، اما موادی مانند سیلیس، شامل شمار بسیار زیادی از اتم‌های سیلیسیم و اکسیژن با پیوندهای اشتراکی Si-O-Si بوده و دارای ساختاری به هم پیوسته و غول‌آسا است. ساختاری که دلیلی بر سختی بالا و دیرگداز بودن چنین موادی است. از آنجا که این مواد در دما و فشار اتاق به حالت جامد هستند، آنها را با نام جامد کووالانسی نیز می‌خوانند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که عنصرهای اصلی سازنده جامدهای کووالانسی در طبیعت، کربن و سیلیسیم هستند، دو عنصری که از آنها تاکنون یون تک اتمی در هیچ ترکیبی شناخته نشده است، زیرا اتم‌های C و Si با تشکیل پیوندهای اشتراکی به آرایش الکترونی هشت‌تایی می‌رسند.

۱- گرافیت و الماس از جمله دگرشکل‌های طبیعی کربن بوده که جزو جامدهای کووالانسی هستند. با توجه به ساختارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



از کرامت هم عادت
را نماند و در کمال دلب
بالا لغوی آن که در
و سخن را در این
منفی حداد است و در
ساقی را این دو در
است

(1)

(۲)

(۱)
ج. احساس جاکند که در زمانی که کوهستان هرگز
کوهستان با پیدایش یک شبکه سه بعدی به ع افت
کوهستان یک شبکه متصل است. احساس زمان و جاذبه
در زمان و خوب است. دمای دو-
آن بیشتر از ۳۰۰ است. برای بیشتر

(۲)
۱۳. اگر اذیت حاصل گردد لایه های درونی در
اتم C با هم پیوند به اتم C دیگر متصل بوده
با فشار لایه لایه را در دریا به اتم های C پیوند
قدی گویند لایه های هم متصل هستند. ولی در بین
لایه های خارجی ضعیف لایه های درونی را پس وجود دارد
از اذیت رسانای خود کمتر است. و در بعضی

५९

۱۰۵۵ صفحه ۷۹

(آ) کدام ساختار، جامد کووالانسی با چینش دو بُعدی اتم‌ها و کدام یک، جامد کووالانسی



نقش زیبایی مداد بر کاغذ.

با چینش سه بُعدی اتم‌ها را نشان می‌دهد؟ (۲) دو بُعدی (۱) سه بُعدی

(ب) با توجه به اینکه گرافیت موجود در مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا می‌گذارد، کدام

ساختار با این ویژگی همخوانی دارد؟ توضیح دهید. ساختار لایه‌ای و جاذب ضعیف میان لایه‌ها

(پ) چرا در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود؟ چون سختی آن بی‌نظیر است.

(ت) کدام چگالی (۲/۲۷ یا ۳/۵۱ گرم بر سانتی متر مکعب) راه گرافیت می‌توان نسبت داد؟ چرا؟

۲- با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. *۲۱۴۷ چون چگالی آن از الماس کمتر است - برای میان لایه‌های گرافیت جاذب ضعیف و اندر دالی فضای خالی دارد*

Si-Si

C-C

پیوند

۲۲۶

۳۴۸

میانگین آنتالپی (kJmol⁻¹)

* در یک گروه از لایه‌ها پانزده شش‌اتمی

افزایش می‌یابد
گروه ۱۴

C — C (C)
Si — Si (Si)

Ge — Ge (Ge)

* عناصر بالای گروه ۱۴ جابجایی لندونانی
تشکیل می‌دهند از لایه‌ها پانزده پیوند

اشتراک رافتر تک
شده در دایره
کاهش می‌یابد

(آ) اگر سیلیسیم خالص ساختاری همانند الماس داشته باشد، پیش‌بینی کنید نقطه ذوب

الماس بالاتر است یا سیلیسیم؟ چرا؟ *الماس - چون پیوند بین ذره‌ای در هر دو پیوند کووالانسی است*

(ب) اگر آنتالپی پیوند Si-O بیشتر از پیوند Si-Si و ساختار Si(s) با SiO₂(s) مشابه باشد،

توضیح دهید چرا سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نشده و به‌طور عمده به شکل

سیلیس یافت می‌شود؟ *چون تشکیل پیوند با Si و O همراه با آزاد شدن انرژی و افزایش*

با پایداری، به عبارت دیگر، انرژی پیوند Si-O از Si-Si و O-O بیشتر است.

گرافن، گونه‌ای به ضخامت یک اتم

گرافن، تک لایه‌ای از گرافیت است که در آن، اتم‌های کربن با پیوندهای اشتراکی حلقه‌های

شش‌گوشه تشکیل داده‌اند (شکل ۳). چنین ساختاری با الگویی مانند کندوی زنبور عسل،

استحکام ویژه‌ای دارد به‌طوری که مقاومت کششی آن حدود ۱۰۰ برابر فولاد است. از آنجا

که ضخامت گرافن به اندازه یک اتم کربن است، می‌توان آن را یک گونه شیمیایی دو بُعدی

دانست و انتظار می‌رود شفاف و انعطاف‌پذیر باشد. یافته‌های تجربی نیز این ویژگی‌های


گرافن را تأیید می‌کنند. یک روش ساده برای تهیه گرافن استفاده از گرافیت و نوارچسب

نازک برای جدا کردن لایه‌هایی از آن است (شکل ۴).



شکل ۳- مدل گلوله و میله برای نمایش گرافن

در شکل یا از نزدیک: شکل دایره
فصلف می‌کند یا بلور سیلیسیم
در طبیعت است. شش‌گوشه کربن دارای
در شکل الماس گرافیت،
اکثرین ۵۲ و ۵۳ است



توجه: گرافن، تک لایه‌ای از گرافیت
در سانس برق است، دو بُعدی شفاف
و انعطاف‌پذیر است.

شکل ۴- تهیه گرافن با استفاده از نوار چسب

در این روش، نخست مقداری گرد گرافیت را بین دو تکه نوار چسب فشار می‌دهند. سپس یکی از نوار چسب‌ها را جدا می‌کنند. به این ترتیب لایه‌هایی از گرافیت روی سطح چسبنده نوار چسب قرار می‌گیرد. در ادامه، این نوار چسب را به سطح چسبنده نوار چسب سوم چسبانده، فشار می‌دهند و از هم جدا می‌کنند تا لایه نازک‌تری از گرافیت روی نوار چسب سوم باقی بماند. با ادامه این کار لایه‌ای به ضخامت نانومتر در برخی قسمت‌های نوار چسب باقی می‌ماند که همان گرافن است.

در میان تارنماها

با مراجعه به منابع علمی معتبر درباره کاربردهای گرافن اطلاعات جمع‌آوری و در کلاس ارائه کنید.

کاوش کنید ۱

درباره «رسانایی الکتریکی گرافن» کاوش کنید.

وسایل و مواد مورد نیاز: لامپ LED، باتری ۹ ولتی، سیم، سوکت، مقاومت ۳۳۰ اهمی، مداد و کاغذ.

۱- مداری مطابق شکل روبه‌رو بسازید.

۲- با یک مداد نرم، چهار گوشه‌ای ضخیم و تیره روی کاغذ بکشید، به طوری که حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر طول و حدود ۱/۵ سانتی‌متر عرض داشته باشد، سپس مستطیل را با مداد به طور کامل سیاه کنید.



۳- نوک فلزی دو سیم رابط را با مستطیل گرافیتی که ضخامتی در حدود چند نانومتر دارد تماس دهید سپس به لامپ نگاه کنید، چه رخ می‌دهد؟ *لامپ روشن می‌شود.*

۴- دو نقطه اتصال را به هم نزدیک یا از هم دور کنید، چه تغییری در شدت روشنایی لامپ پدید می‌آید؟ *هر چه نقطه‌ها به هم نزدیک‌تر شوند، روشنایی بیشتر. زیرا مقاومت کمتری در مسیر جریان الکتریکی قرار دارد.*

سازه‌های یخی، زیبا و سخت اما زودگذار

با ساختار و رفتار سیلیس به عنوان نماینده‌ای از جامدهای کووالانسی آشنا شدید. ماده‌ای که در حالت خالص و تراش خورده، شفاف، زیبا و سخت است. یخ نیز ظاهری شبیه به آن دارد به طوری که سازه‌های یخی شفاف بوده و هنر به کار رفته در آنها، خود جلوه‌گر زیبایی است


(شکل ۵).



نمونه SiO2 در دما نیست، چسبنده.


لذا زودگذر است.

دارای دو پیوند کووالانسی و دو پیوند هیدروژنی.



شکل ۵- نمونه‌هایی از سازه‌های یخی


ت که در سیلیس همه



۱- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.




هیدروژن - اکسیجن - نیتروژن
آرگن - کربن - هیدروکربن
فلزات - نافلزات - کمپلکسها
جاذبه بین مولکولی

● اغلب ترکیب‌های آلی جزو مواد مولکولی هستند.



بہ نام خداوندی و حمد و ثناء

۶. دمای جوش در جامدهای مایه‌ای
به دو عامل بستگی دارد.
۱- با جرم مولی رابطه مستقیم دارد.
۲- با قوت جاذبه بین مولکول‌ها
رابطه مستقیم دارد.



۷۲ $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ → دای هوش
- $C_3H_8 < C_2H_6 < CH_4$ دای هوش


رفتار فیزیکی ماده آسان پس تغییر
 دمای ذرات، جوش و ... به
 جرم مولی و نوع نیروی بین ذره ای
 و قدرت نیروی بین ذره ای وابسته است
رفتار شیمیایی به طور عمده بستگی
 به جفت الکترون های پیوندی یا
 پیوندهای اشتراکی و جفت الکترون
 ناپیوندی موجود در مولکول وابسته است
 هر چه پیوندها قویتر، آن ماده با دیگر
 سطح انرژی آن با شتاب بیشتری
 آن کمتر در معرض

به نیروهای بین مولکولی آن وابسته است، در حالی که رفتار شیمیایی آن به طور عمده به پیوندهای اشتراکی (جفت الکترون های پیوندی) و جفت الکترون های ناپیوندی موجود در مولکول وابسته است.

رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها

در شیمی ۱ آموختید که ساختار لوویس، الکترون های ظرفیت اتم های سازنده یک گونه شیمیایی را طوری نمایش می دهد که هر اتم بر اساس توزیع جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی از قاعده هشت تایی پیروی می کند به جز اتم هیدروژن که تنها یک جفت الکترون پیوندی یا یک پیوند اشتراکی پیرامون آن نمایش داده می شود. توزیع این جفت الکترون ها در هر مولکول نقش مهمی در تعیین رفتار آن به ویژه در میدان الکتریکی دارد.

ساده ترین مولکول ها، دواتمی هستند. مولکول هایی مانند H_2 و Cl_2 که از دو اتم یکسان تشکیل شده اند، **مولکول دو اتمی جور هسته**^۱ نامیده می شوند. چنین مولکول هایی در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند، به دیگر سخن، گشتاور دو قطبی آنها صفر بوده و مولکول های ناقطبی هستند. از سوی دیگر مولکول های دو اتمی مانند HCl ، **مولکول دواتمی ناجور هسته**^۲ بوده و قطبی هستند. شکل ۶ توزیع الکترون ها را بر اساس نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی برای این مولکول ها نشان می دهد.



(ب) احتمال حضور جفت الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است، گویی بیشتر وقت خود را آنجا می گذرانند، از این رو احتمال حضور آنها روی هسته ها، یکسان و متقارن است.

(آ) احتمال حضور جفت الکترون پیوندی پیرامون هسته اتم کلر بیشتر بوده زیرا خاصیت نافلزی آن بیشتر است، از این رو احتمال حضور الکترون های پیوندی روی هسته ها، یکسان و متقارن نیست.

شکل ۶- نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی برای نمایش احتمال حضور الکترون ها در مولکول های دواتمی (آ) جور هسته (ب) ناجور هسته. رنگ سرخ تراکم بیشتر و رنگ آبی تراکم کمتر بار الکتریکی را نشان می دهد.

۱- Homonuclear Diatomic Molecule
 ۲- Heteronuclear Molecule

در هر دوره یا ترم از زبان فارسی به روش جامع تدریس می شود.
 گزینش آشنایان بیشتر می شود.


آیا می دانید

شیمی دان ها در مباحث نظری برای توجیه بارهای الکتریکی جزئی در یک گونه شیمیایی از یک کمیت نسبی به نام الکترون گاتیوی بهره می گیرند. کمیتی که برای اتم های یک عنصر در گونه های شیمیایی مختلف، متفاوت است.

بر اساس شکل ۶، توزیع یکنواخت و متقارن الکترون ها در مولکول های دو اتمی جور هسته، نشانه ناقطبی بودن آن است در حالی که در مولکول های دو اتمی ناجور هسته، توزیع الکترون ها یکنواخت نبوده و تراکم بار الکتریکی روی اتم های سازنده آن یکسان نیست، در این شرایط به اتمی که تراکم بار الکتریکی روی آن بیشتر است، بار جزئی^۱ منفی (δ^-) و به دیگری بار جزئی مثبت (δ^+) نسبت می دهند. بدیهی است چنین مولکول هایی گشتاور دوقطبی بزرگ تر از صفر دارند.

آیا می دانید نقشه پتانسیل مولکول های سه اتمی چگونه است؟ شکل ۷ دو نمونه از این

نقشه ها را نشان می دهد.





شکل ۷- نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی (آ، آب، ب) کربن دی اکسید

در مولکول خطی کربن دی اکسید، تراکم بار الکتریکی بر روی اتم های اکسیژن بیشتر از اتم کربن است، از این رو به اتم های اکسیژن بار جزئی منفی (δ^-) و به اتم کربن بار جزئی مثبت (δ^+) نسبت داده می شود، هر چند که به دلیل توزیع متقارن بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی، این مولکول در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند و گشتاور دوقطبی آن صفر است. اگر چه در مولکول خمیده آب تراکم بار الکتریکی روی هسته اتم اکسیژن بیشتر است اما این مولکول بر خلاف کربن دی اکسید در میدان الکتریکی جهت گیری می کند (چرا؟).

چون نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی آن متقارن بوده یا از نظر بخش بار الکتریکی متقارن است، طرف ۵ کمی منفی با تراکم بیشتر الکترون ها و طرف ۴ کمی مثبت است.

۱- شکل زیر نقشه پتانسیل مولکول های کربونیل سولفید (SCO) و اتین (C_2H_2) را نشان

می دهد. با توجه به آنها گشتاور دوقطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟



کربونیل سولفید قطبی است - توزیع الکترون


۱- Partial Charge

متقارن است و گشتاور دوقطبی دارد.

اتین قطبی است. تراکم الکترون

متقارن است و گشتاور دوقطبی ندارد.


در مولکول های آلی بخش هیپو رزنی را ناقطبی در نظر می گیرند.



• در مولکول خطی سه اتمی، هسته هر سه اتم سازنده آن بر روی یک خط راست قرار دارند.

تشخیص مولکول قطبی و ناقطبی
الف. تک اتمی مانند گازهای نجیب $He, Ne, Ar, \dots$ ناقطبی هستند.
ب. دواتمی با اتم یکسان مانند $F_2, O_2, I_2, Br_2, Cl_2$ و H_2 ناقطبی، و دواتمی با اتم های متفاوت مانند CO, NO, HCl قطبی هستند.

پ. مولکول های اتمی به شرط آنکه همزمان هم اتم های اطراف اتم مرکزی در آن یکسان باشد هم اطراف اتم مرکزی الکترون ناپایبندی وجود داشته باشد ناقطبی هستند مانند $O=C=O$ و $F-Be-F$ و غیره.




اگر اتم اطراف اتم مرکزی یکسان باشد یا اتم های اطراف اتم مرکزی هفت الکترون باشند و گشتاور دوقطبی در هر دو طرف برابر باشد ناقطبی است.

مولکول نه قطبی از نظر بخشش بار الکتریکی متعادل است، یا کمترین جفت و منفی در مولکول محکم
منطبق هستند. در اتم He ، BeF_2 ، $AlCl_3$ ، CH_4 ، CO_2 ، CS_2 نه قطبی هستند.

در SO_2 خصیت نه قطبی یا
قدرت الکترون گیری $S:1.0$
بیشتر است لذا تراکم بار منفی
روی اکسیژن است.


۲- با توجه به نقشه پتانسیل مولکول های آمونیاک و گوگرد تری اکسید به پرسش های پاسخ دهید.



(آ) با بیان دلیل، هر یک از اتم ها را در نقشه های بالا با $(\delta+)$ و $(\delta-)$ نشان دار کنید.



(ب) کدام مولکول قطبی و کدام ناقطبی است؟ چرا؟ CH_4 قطبی اندج آن درون المراف اتم ترزی نه متعادل است.

۳- با توجه به شکل های زیر با دلیل پیش بینی کنید کدام مایع، کلروفرم $(CHCl_3)$ و کدام یک کربن تتراکلرید (CCl_4) است؟




آیا می دانید

کلروفرم، مایعی بی رنگ بوده که بخار آن سمی و اعتیاد آور است. در گذشته از این به عنوان ماده بیهوش کننده بیمار در اتاق عمل استفاده می شد.



$CHCl_3$ قطبی بوده و درون المراف اتم ترزی نه متعادل است.
 CCl_4 نه قطبی است.
هنر نمایی شاره (سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق

خورشید بزرگترین منبع انرژی برای زمین است. منبعی تجدیدپذیر که انرژی خود را با پرتوهای الکترومغناطیسی به سوی ما گسیل می دارد. بدیهی است که بهره گیری بیشتر از این انرژی پاک، کاهش رد پای زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. دانشمندان برای استفاده بهینه از انرژی خدادادی و رایگان خورشید به دنبال فناوری هایی هستند که بتوانند بخشی از آن را ذخیره نموده و به شکل انرژی الکتریکی وارد چرخه مصرف نمایند (به ویژه شب هنگام که نیاز به آن بیشتر احساس می شود). گفتنی است که برای تبدیل پرتوهای خورشیدی به انرژی الکتریکی به دانش و فناوری پیشرفته نیازمند است، از این رو تنها در برخی کشورهای توسعه یافته انجام می شود.




- از واکنش فلز سدیم با گاز کلر، جامد یونی سفید رنگی بر جای می ماند که همان نمک خوراکی است. نور و گرمای زیاد آزاد شده در این واکنش نشان می دهد که بسیار گرماده است.

دریافتید که با متمرکز شدن پرتوهای خورشیدی بر روی گیرنده برج، دمای سدیم کلرید مذاب (شاره یونی) افزایش می یابد و این شاره بسیار داغ به منبع ذخیره انرژی گرمایی سرازیر می شود تا حتی در روزهای ابری و شب هنگام، انرژی لازم برای تبدیل آب به بخار داغ را فراهم کند. بخار داغ، توربین را برای تولید انرژی الکتریکی به حرکت در می آورد.

داده های تجربی نشان می دهند که گستره دمای سدیم کلرید مذاب در این فناوری در حدود $1350^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$ است، گستره دمای که برای مواد مولکولی نمی توان انتظار داشت! آیا می دانید این ویژگی نشان دهنده چه نوع نیروی جاذبه میان ذره ها است؟ چه ساختاری

برای سدیم کلرید تصویر می کند؟ ساخته شده از یون های Na^+ و Cl^- در شبکه بلوری منظم است. **چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامد یونی**

می دانید که هر ترکیب یونی دوتایی را می توان فرآورده واکنش یک فلز با یک نافلز دانست، واکنشی که در آن اتم ها با یکدیگر الکترون دادوستد می کنند. در واکنش هایی از این دست، اتم فلز با از دست دادن الکترون و اتم نافلز با به دست آوردن الکترون، به ترتیب به کاتیون و آنیون تبدیل می شوند. شکل ۸ دادوستد الکترون میان اتم های سدیم و کلر را هنگام تشکیل سدیم کلرید نشان می دهد.



شکل ۸ - دادوستد الکترون میان اتم ها. چرا شعاع اتم ها هنگام تبدیل به یون تغییر می کند؟

پس از دادوستد الکترون و تشکیل یون ها، میان یون های ناهمنام، نیروی جاذبه و میان یون های همنام، نیروی دافعه پدید می آید. اگر هر یک از یون ها همانند کره ای باردار باشد، انتظار می رود نیروهای جاذبه و دافعه از همه جهات به آن وارد شود، به دیگر سخن این نیروها به شمار معینی از یون ها محدود نشده بلکه میان همه آنها و در فاصله های گوناگون وارد می شود. وجود سدیم کلرید و دیگر جامدهای یونی در طبیعت نشان می دهد که نیروهای جاذبه میان یون های ناهمنام بر نیروهای دافعه میان یون های همنام غالب است، آن چنان که شمار بسیار زیادی از یون ها به سوی یکدیگر کشیده می شوند. چنین روندی، دلیل پدید آمدن


به تعداد یون های با بار مخالف که در نزدیکی آن قرار گرفته اند، عدد کوئوردیناسیون آن یون گفته می شود. عدد کوئوردیناسیون مربوط به یون است نه ترکیب یونی. مثلاً با یک لفت: عدد کوئوردیناسیون یون سدیم ۶ است، عدد کوئوردیناسیون یون کلر ۶ است.

14
 ΔH تشکیل: مقدار انرژی مبادله شده (معمولاً آزاد شده) از تشکیل یک مول ماده مرکب از عناصر ساده آن در پایدارترین در شکل
 $\text{تکس} \Delta H = \Delta H_{\text{تکس}} = 0$
 $\text{تکس} \Delta H$ تشکیل شبکه یونی: مقدار انرژی آزاد شده از تشکیل یک مول ترکیب یونی جامد از یون های گازی سازنده آن

انرژی لازم برای فروپاشی شبکه یونی سدیم کلرید برابر با 787 kJ mol^{-1} بوده و

بیشتر از پتاسیم برمید (689 kJ mol^{-1}) است، زیرا چگالی بار یون های سازنده شبکه در سدیم کلرید به ترتیب بیشتر از یون های سازنده پتاسیم برمید است. در شیمی می توان چنین

مقایسه ای را با دو معادله واکنش به صورت زیر نمایش داد. **اول ترکیب یونی**




گرمای مصرف شده در فشار ثابت برای واکنش هایی از این دست را آنتالپی فروپاشی شبکه

می نامند و با فروپاشی ΔH نمایش می دهند. بنابراین:


$$\Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{NaCl, s}) = +787 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{KBr, s}) = +689 \text{ kJ mol}^{-1}$$



ΔH فروپاشی شبکه یونی:

مقدار انرژی لازم برای تبدیل
 اول ترکیب یونی جامد به یون های
 گازی شکل سازنده آن



برای تشکیل شبکه $\Delta H = \Delta H_{\text{NaCl}}$ این واکنش

خود را بیازمایید

۱- در هر مورد با خط زدن واژه نادرست، هر یک از عبارت های زیر را کامل کنید.

(آ) آنتالپی فروپاشی، گرمای $\frac{\text{آزاد}}{\text{مصرف}}$ شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ از شبکه یونی و تبدیل آن به $\frac{\text{اتم های}}{\text{یون های}}$ گازی سازنده است.


(ب) هر چه $\frac{\text{چگالی بار}}{\text{یون های سازنده یک جامد یونی کمتر باشد}}$ ، شبکه آن $\frac{\text{آسان تر}}{\text{دشووار تر}}$ فروپاشیده می شود.

۲- کدام آنتالپی فروپاشی شبکه را می توان به KCl(s) نسبت داد؟ چرا؟ **باید از NaCl شبکه**

دانه KBr نه بیشتر باشد.
 اندر می تواند از هر دو **تجین است.**


717 kJ mol^{-1} ، 649 یا 1037

۳- با توجه به نمودار زیر به پرسش ها پاسخ دهید.





افزایش شعاع
 کاهش انرژی شبکه یونی

همه با الکترونی یون ها
 زیادتر دانه اند با حجم یون های کوچکتر
 باشد، انرژی شبکه یونی زیادتر
 و تجزیه یا فروپاشی آن دشوارتر
 است.




افزایش شعاع آنیون
 کاهش انرژی شبکه یونی



آ) با افزایش شعاع کاتیون فلزهای قلیایی، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ توضیح دهید. کاهش می یابد چون گنجایی بار در کاتیون کاهش می یابد و انرژی شبکه با گنجایی بار در یون ها رابطه مستقیم دارد.

ب) با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ توضیح دهید. کاهش می یابد چون گنجایی بار در آنیون کم می شود و آنتالپی شبکه با گنجایی بار در یون ها رابطه مستقیم دارد.

۴- با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه را برای برخی ترکیب های یونی نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.



آنیون / کاتیون	F ⁻	O ²⁻
Na ⁺	۹۲۶	۲۴۸۸
Mg ²⁺	۲۹۶۵	۳۷۹۸

آ) درباره درستی جمله زیر گفت و گو کنید.

«آنتالپی فروپاشی شبکه با بار الکتریکی کاتیون و هم با بار الکتریکی آنیون رابطه مستقیم دارد.»

ب) آیا می توان میان آنتالپی فروپاشی شبکه و نقطه ذوب جامدهای یونی رابطه ای در نظر گرفت؟ توضیح دهید؟
 معمولاً هر چه آنتالپی فروپاشی شبکه بزرگتر باشد، دمای ذوب ترکیب یونی بالاتر است.

فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلای زیبا

مواد از جمله فلزها همواره برای زندگی انسان و ادامه آن ضروری و ارزشمند بوده اند به طوری که تمدن های آغازی نیز براساس گستره کاربری آنها نام گذاری شده اند.

پس از دوره سنگی، در دوره برنز و سپس آهن، جوامع دچار دگرگونی و رشد چشمگیری شدند و این خود نشان از جایگاه برجسته فلزها در تمدن بشری دارد. این عناصرها هنوز هم کلید رشد، گسترش و ارتقای کیفیت زندگی به شمار می روند، آن چنان که بسیاری باور دارند پایداری جامعه پیشرفته با فناوری کارآمد به گستردگی استفاده از عنصرهای فلزی وابسته است.


می دانید که فلزها بخش عمده عنصرهای جدول دوره ای را تشکیل می دهند، عنصرهایی که در هر چهار دسته s، p، d و f جای داشته اما رفتارهای فیزیکی و شیمیایی متنوعی دارند. داشتن جلا، رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی و شکل پذیری از جمله رفتارهای فیزیکی فلزها بوده در حالی که واکنش پذیری و تنوع اعداد اکسایش از جمله رفتارهای شیمیایی آنهاست.

به نظر شما این رفتارها از چه ساختاری سرچشمه می گیرند؟ شبکه بلوری فلزها با ساختار مواد کووالانسی، مولکولی و یونی چه تفاوت هایی دارد؟


۱) جامه فلزی: شامل انداز

فلزات اصلی تغییرقلایی و فلزات خاکی و Al و ... و فلزات واسطه فلزهای من - آهن و ... که در ذات سازنده آنها یون مثبت فلز در دریای آنیون و نیروی بین ذره ای پیوندهای فلزی است.


هالت جامه و مناب رسانای خوب انرژی هستند و برخلاف فلزات یونی ضمن عبور برق تجزیه نمی شوند تفاوت دمای ذوب و نقطه انجماد بسیار است.




فلزات در مقابل ضربه مقاوم بوده و جایشان خود هستند به شکل ذرات و نیل گرد در می آیند.




در ذات سازنده: یون مثبت فلز و دریای آنیون با پیوندهای فلزی



در ذات سازنده: اتم نیتروژن در ساختار پلیمری



نیروی بین ذره ای: پل هیدروژن و دانه های دانه های کوچک



نیروی بین ذره ای: پیوند یونی و ذرات سازنده: یون

پیوند با زندگی

«رنگ، نماد زیبایی»

طبیعت زیستگاهی برای ما و آزمایشگاهی بزرگ برای علوم تجربی است. که در آن رنگ و رنگ آمیزی یکی از خوشایندترین جلوه‌ها است و به انسان لذتی همراه با آرامش می‌بخشد. آیا می‌دانید چرا پوشش بهاری به رنگ سبز، ابرها به رنگ سفید و گل رُز به رنگ سرخ دیده می‌شود؟ آیا می‌دانید چرا محلول ترکیب‌های برخی فلزهای واسطه به رنگ‌های گوناگون دیده می‌شوند؟ به طور کلی احساس و درک رنگ به دلیل نورهایی است که از محیط پیرامون به چشم ما می‌رسد، در واقع این نورها همان پرتوهای الکترومغناطیسی بوده که طول موج آنها در گستره 400 nm تا 700 nm است و چشم ما آنها را می‌بیند.

از این رو اگر در محیطی نور مرئی نباشد، انسان نمی‌تواند پیرامون خود را ببیند. شکل ۱۱ نشان می‌دهد که مواد رنگی بخشی از نور سفید تابیده شده را جذب و باقی مانده آن را عبور می‌دهند یا بازتاب می‌کنند.



شکل ۱۱- تابیدن نور و دیدن مواد رنگی

آیا می‌دانید

سبز، آبی و قرمز سه رنگ اصلی هستند. هنگامی که دو تا از آنها مخلوط شوند رنگ‌های فرعی زرد، فیروزه‌ای و ارغوانی پدید می‌آید. از مخلوط هر سه، تنها رنگ سفید پدید می‌آید.



بر اساس شکل ۱۱، اگر یک نمونه ماده همه طول موج‌های مرئی را بازتاب کند، به رنگ سفید و اگر همه آنها را جذب کند، به رنگ سیاه دیده می‌شود، همچنین چشم ما مواد رنگی را با طول موج‌های عبوری یا بازتاب شده از آنها می‌بیند. اینک می‌پرسید که مواد رنگی چه ساختاری دارند؟ سازنده اصلی یک ماده رنگی که به آن رنگ می‌بخشد، رنگ دانه^۱ نام دارد، برای نمونه Fe_2O_3 ، TiO_2 و دوده از جمله رنگ دانه‌های معدنی هستند که به ترتیب رنگ‌های سفید، قرمز و سیاه ایجاد می‌کنند. در گذشته انسان، این مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانی‌ها تهیه می‌کرد.

نور مرئی را می‌توان به ۷۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر از امواج الکترومغناطیسی که قابل دیدن است، تقسیم کرد. نور مرئی را می‌توان به ۷۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر از امواج الکترومغناطیسی که قابل دیدن است، تقسیم کرد. نور مرئی را می‌توان به ۷۰۰ تا ۴۰۰ نانومتر از امواج الکترومغناطیسی که قابل دیدن است، تقسیم کرد.

امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده‌های صنعتی آن چنان سریع و چشمگیر است که این فراورده‌ها در رقابتی اقتصادی افزون بر جنبه‌های کمی و کیفی از دیدگاه زیباشناختی، باید رنگ و رنگ‌آمیزی مناسب و جذابی نیز داشته باشند. چنین اهمیتی باعث تولید رنگ‌های ساختگی گوناگونی شده است. رنگ‌هایی که در صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به کار می‌روند.

معدن گندم رفته در جادو رابیع

توجه کنید رنگ‌هایی که برای پوشش سطح استفاده می‌شوند، نوعی کلویید هستند که لایه نازکی روی سطح ایجاد می‌کنند تا افزون بر زیبایی، مانع خوردگی در برابر اکسیژن، رطوبت و مواد شیمیایی گردد.

آیا می‌دانید

رنگدانه‌های آلی گستره وسیعی دارند به طوری که شمار آنها بسیار زیاد و متنوع است. از این مواد در غذا، نساجی و... استفاده می‌شود.

۲۹، ۴۸ اعداد اکسایش
متنوع و ترکیبات رنگین
ندارند. ۲۹، ۴۸

خود را بیازمایید

- شکل زیر پیشرفت واکنش فلز روی با محلول نمکی از وانادیم (V) را نشان می‌دهد.



محلولی از نمک وانادیم (V)

افزودن گرد روی



محلولی از نمک وانادیم (IV)



محلولی از نمک وانادیم (III)



محلولی از نمک وانادیم (II)


با توجه به شکل به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.

(آ) آرایش الکترونی اتم وانادیم (۲۳V) را بنویسید.


(ب) آرایش الکترونی وانادیم را در حالت‌های اکسایش (II) و (III) بنویسید.

(پ) توضیح دهید چرا در هر مرحله رنگ محلول متفاوت از دیگری است؟ زیرا در هر مرحله تعداد الکترون‌های ظرفیتی یون وانادیم در مدارات بیرونی آن تغییر می‌کند.
(ت) در این واکنش، وانادیم (V) کدام نقش را دارد (اکسنده یا کاهنده)؟ چرا؟ آئنده چون عدد اکسایش آن در واکنش کاهش یافته و کاهنده شده است.

از ویژگی مشترک عناصر واسه این است که اغلب، ترکیبات رنگین دارند، و اغلب اعداد اکسایش مختلفی از خود نشان می‌دهند



۱. درجه کاهش
۲. درجه کاهش
۳. درجه کاهش
۴. درجه کاهش
پس وانادیم (V) آئنده است




۳۴- دوتا از ۴۵
دقیق از ۳۵

در واکنش پودر روی با نمک وانادیم، چون $2H^+$ آئنده می‌شود، لذا باعث کاهش کاتیون وانادیم در رنگ مربوط می‌شود. پس چون یون وانادیم کاهنده می‌شود به عنوان آئنده عمل کرده است.


۲- تیتانیوم افزون بر ویژگی‌های یادشده به شکل آلیاژهای گوناگون نیز کاربرد گسترده‌ای در صنعت دارد. برای نمونه نیتینول^۱ آلیاژی از تیتانیوم و نیکل بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است. این آلیاژ در ساخت فراورده‌های صنعتی و پزشکی همانند شکل ۱۲ به کار می‌رود.



(پ)



(آ)



(ب)

شکل ۱۲- کاربرد برخی آلیاژهای تیتانیوم
(آ) سازه فلزی در ارتودنسی (ب) استنت برای رگ‌ها (پ) قاب عینک



به‌تدریج دانه‌های فوق دانه‌های بزرگ‌تری تشکیل می‌دهند و این فرآیند را پخت می‌گویند.

دانه‌های بزرگ‌تر $\text{Fe} < \text{Ti} < \text{Mg}$

Ti_2O_3 به تیتانیوم دی‌اکسید می‌گویند که به‌عنوان یک ماده پخت‌کننده استفاده می‌شود. این ماده به‌عنوان یک ماده پخت‌کننده استفاده می‌شود. این ماده به‌عنوان یک ماده پخت‌کننده استفاده می‌شود.

تمرین‌های دوره‌ای

۱- با توجه به ۳۶ عنصر نخست جدول دوره‌ای عناصرها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱۸) (آ) عنصرهای کدام گروه‌ها جزو مواد مولکولی هستند؟ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ (بنیادین فلزات) (۵ و ۵ و ۵) (I, Br, Cl, F) (۱۷ گروه)

(ب) عنصرهای کدام گروه جزو مواد کووالانسی هستند؟ ۱۴ (گروین سیم و رینم)

(پ) عنصرهای کدام دسته (s, p یا d) همگی فلزند؟ d (H و H از دسته s فلزند) و s و d (از دسته p فلزند)

۲- سیلیسیم کربید (SiC) یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می‌رود.

(آ) این ماده را در کدام دسته از مواد جای می‌دهید؟ چرا؟ **جواب: ماده‌ای که در دسته فلزات قرار می‌گیرد. این ماده از نظر ساختار و خواص با فلزات شباهت دارد.**


(ب) سختی آن را در مقایسه با الماس و سیلیسیم پیش‌بینی کنید. **جواب: سیلیسیم سخت‌تر از الماس است. زیرا در الماس هر اتم به ۴ اتم دیگر پیوند دارد، در حالی که در سیلیسیم هر اتم فقط به ۲ اتم دیگر پیوند دارد.**

۳- هر یک از شکل‌های زیر رفتاری از مواد یونی را نشان می‌دهد. در هر مورد آن رفتار را با دلیل توصیف کنید.


(۱) در ترکیب یونی جامد به دلیل جاذبه قوی میان یون‌ها امکان حرکت یون‌ها و انتقال الکتریسیته وجود ندارد. لذا لایه‌ها فشرده است.

(۲) به دلیل مذاب ترکیب یونی، رسانایی یونی بوده و ضمن عبور جریان لایه‌ها را روشن می‌کنند.

(۳) ترکیبات یونی به علت محدود بودن رسانایی یونی به علت تحرک یون‌ها رسانایی یونی بوده و لایه‌ها را روشن می‌کنند.



(ب)



۴- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیل بنویسید. **جواب: یون‌های یونی در حالت جامد به دلیل جاذبه قوی میان یون‌ها، رسانایی یونی ندارند. در حالت مذاب یا محلول، یون‌ها آزاد می‌شوند و رسانایی یونی پیدا می‌کنند.**

(آ) تنوع و شمار مواد مولکولی بیشتر از مواد یونی و آن هم بیشتر از مواد کووالانسی است.

(ب) ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو مواد مولکولی به شمار می‌روند.

(پ) ترتیب واکنش‌پذیری فلزهای پتاسیم، کلسیم و تیتانیوم به صورت $K > Ca > Ti$ است.

۵- اتم‌های فلزی به دلیل تمایل به از دست دادن الکترون، در حالت یونی در ترکیب‌های یونی قرار می‌گیرند. اتم‌های نافلزی به دلیل تمایل به گرفتن الکترون، در حالت یونی در ترکیب‌های یونی قرار می‌گیرند. **جواب: اتم‌های فلزی به دلیل تمایل به از دست دادن الکترون، در حالت یونی در ترکیب‌های یونی قرار می‌گیرند. اتم‌های نافلزی به دلیل تمایل به گرفتن الکترون، در حالت یونی در ترکیب‌های یونی قرار می‌گیرند.**

۶- فلزات به دلیل رسانایی خوب، در سیم‌کشی‌ها به کار می‌روند. فلزات نافلزی به دلیل رسانایی کم، در عایق‌ها به کار می‌روند. **جواب: فلزات به دلیل رسانایی خوب، در سیم‌کشی‌ها به کار می‌روند. فلزات نافلزی به دلیل رسانایی کم، در عایق‌ها به کار می‌روند.**




۸۷

۷- فلزات به دلیل رسانایی خوب، در سیم‌کشی‌ها به کار می‌روند. فلزات نافلزی به دلیل رسانایی کم، در عایق‌ها به کار می‌روند. **جواب: فلزات به دلیل رسانایی خوب، در سیم‌کشی‌ها به کار می‌روند. فلزات نافلزی به دلیل رسانایی کم، در عایق‌ها به کار می‌روند.**

طبیعت به شکل نمک‌های اکسیژن‌دار یافت می‌شوند. با توجه به ساختار لوویس آنیون‌های

$(F \times 4) + (E - 2) = E -$

$\left[\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \\ | \\ \text{:}\ddot{\text{O}} - \text{Si} - \ddot{\text{O}}\text{:} \\ | \\ \text{:}\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array} \right]$



یون سیلیکات

يون فسفات

يون سولفات

آ) هریک از ساختارهای لوویس را با جفت نقطه‌ها کامل کرده سپس بار الکتریکی هر آنیون

را مشخص کنید.

➔ (ب) فرمول شیمیایی نمک حاصل از این آنیون‌ها را با یون سدیم سپس یون کلسیم بنویسید.

۶- نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دی‌متیل‌اتر با جرم مولی نزدیک به هم به

صورت زیر است. با توجه به آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.



دی متیل اتر

در پروپان تدریج با آب است
مقتضی حرکت در دو جهت
صفر تا مثبت و در میدان
فشاری می باشد.

تقدیر مع جاہلہ معنی متقدمین و
مردانہ لاجعہ و اعانت و دروہ و معنی متقدمین و

(آ) کدام یک در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند؟ چرا؟


(ب) توضیح دهید کدام یک در دمای اتاق می‌تواند به حالت مایع باشد؟

دی شیل انزلہ جازہ پیاں فوکر لایاں قدر است .

۷- گروهی از دانش‌آموزان همهٔ مواد خالص را به حالت جامد در نظر گرفته و آنها را براساس

رفتار مطابق نمودار زیر دسته‌بندی کرده‌اند. با پر کردن جاهای خالی، نمونه‌ای برای هر جامد

مثال بزنید.





- ۱- کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند.
(۱) شیمی دانشی است که به ما کمک می کند تا هوشمندانه از مواد در خلق آثار هنرمندانه ، زیبا و ماندگار بهره ببریم.
- (۲) شمار بسیاری ماده با رفتارهای گوناگون ، تنها از شمار معدودی اتم یا آرایش و چیدمانی متفاوت پدید آمده اند.
- (۳) اتم آن از زیرباز مواد ضروری برای زندگی خود را به کمک فناوری شیمیایی ساخته و برای رفع نیاز آن ها را تغییر داده است.
- (۴) آثار به جا مانده از گذشتگان در چشم ما هنر زمان خویش دانست که افزودن زیبایی ، بازیابی از مانده های آن عصر نیز به شمار میرود.

- ۲- در تغییر یک ماده برای رفع نیاز اتم کدام عامل مؤثر است ؟
(۱) محیط و شیوه زندگی (۲) آیین ها ، آداب و رسوم (۳) ادبیات و افکارها (۴) تمام موارد

- ۳- چیدمان عبارت از زیر دست است ؟
مواد اولیه برای ساخت ، ابزار و وسایل هنری ، افزون بر توانایی و در دسترس بودن باید دانش دیگری کم ، استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند.
- * هر چه عمر وسیله سفالی بیشتر باشد ، بعدت فرایش گفتنی های کمتری با خود دارد . گفتنی های کمتر به اسرار هنر ، زیبایی و ماندگاری را فاش میکند.
- * بهر چه پیشرفت علوم به ویژه شیمی پرده از اسرار نهفته بر نمونه های فلزی و سفالی رنگی گذشته برداشته شد تا پایه ای برای ساخت سازه ها و بناهای امروزی و درخورشان فراهم گردد.
- * سیمه ان ها ابتدا نوع ، مقدار ، رفتار و رفتار مواد سازنده آن ها به جا مانده را بررسی کرده و سپس با بهره گیری از دانش شیمی توانسته اند به مواد جدیدتری دست یابند .
- * اغلب معنقد هستند که با توجه به تغییر شیوه زندگی ، از مواد قدیمی نمی توان در خلق سازه های زیبا و ماندگار امروزی استفاده کرد یا آنها را شباهت طراحان مواد به استفاده کرد.

(۱) ۵ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۱

- ۴- کدام گزینه در مورد خاک رست بیان نشده است ؟

- (۱) در همه جرمی مواد سازنده آن عبارتند از $SiO_2 < Al_2O_3 < H_2O < Na_2O < Fe_2O_3 < MgO < CaO$ است.
- (۲) به غلام بودن خاک رس بدلیل وجود آهن (III) اکسید در آن است.
- (۳) اگر خاک رس را حرارت دهیم از جرم H_2O آن نسبت به سایر مواد نیزان بیشتری کاسته می شود.
- (۴) اگر اجزای آن را جدا کنیم SiO_2 از شکر و ماده ششغلی (مکمل های SiO_2) تشکیل شده است.
- ۵- کدام جزوه سازنده خاک رس یکی از سازنده های اصلی بسیاری از سنگ ها ، صخره ها و زبرشن و ماسه است که وجود آن باعث استحکام و ماندگاری سازه های سنگی و نقش کنده های روی آن شده است.

Al_2O_3 (۱) SiO_2 (۲) MgO (۳) Na_2O (۴)





۶- کدام ویژگی در مورد سیلیس درست نیست؟

- (۱) ترکیبی زیبا، سخت و مانده کار است.
(۲) اکسید عنصر سیلیسیم است که پس از اکسید نیتروژن فراوانترین عنصر در پوسته زمین است.
(۳) کوارتز از نمونه های فراوان آن است.
(۴) فراوانترین اکسید در پوسته جامد سیاره ما است.

۷- چند عبارت در زیر درست است؟

- * در هر مول SiO_2 باشد CO_2 چه مول پیونده وجود دارد.
- * در CO_2 برخلاف SiO_2 جاده واحده های مجزایی بنیم مرکب وجود دارد.
- * SiO_2 ماده کوئرتزولانی است چون برخلاف CO_2 از مجموعه اتم های Si و O خسته شده که با پیونده اشتراکی به هم متصل هستند.
- * SiO_2 جاده ای سخت است با نقطه ذوب بالا و رسانایی جزئی برق.
- * به موادی مانند CO_2 و H_2O که ذره سازنده آن ها مرکب های مجزا هستند مواد مولکولی گویند.
- * ماده کوئرتزولانی شبکه غول آبی اتم ها هستند که با پیونده اشتراکی به هم وصل هستند و سخت و درگیرانه هستند مانند سیلیس.
- * طبق یافته های تجربی عنصرهای اصلی سازنده جاده های کوئرتزولانی در طبیعت کربن و سیلیس هستند.
- * دو عنصر Si و O با یک شدن در هیچ ترکیب شناخته شده ای بصورت یون تنگ اتمی شناخته نشده است.
- * اتم های Si و O فقط با تشکیل پیوندهای اشتراکی به آرایش اکته درن هستیایی می رسند.

۶ (۴)

۷ (۳)

۸ (۲)

۹ (۱)

۸- در ساختار لایه ای واحد متعلق بنیم مرکب وجود ندارد و جاده کوئرتزولانی محسوب می شود؟

- (۱) گرافیت $C.s$ (۲) الماس $C.s$ (۳) سیلیس SiO_2 (۴) تمام موارد

۹- پخته شدن نان سنگک روی دانه های دانه سنگ را می توان گفت به این است.

- (۱) ساختار مرکب (۲) مقاومت گرمایی (۳) هستیایی شیشه اتم ها (۴) پیونده قوی $Si-O$

۱۰- کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند؟

- (۱) گرافیت جاده کوئرتزولانی با چینش دو لایه ای اتمی و الماس جاده کوئرتزولانی با چینش سه لایه ای اتمی هر دو در درجه کربن با دای و اولی رسانایی خوب برقی و دوم رسانایی خوب گرماست.
(۲) ساختار لایه ای گرافیت وجود جاده ضعیف میان لایه ها باعث کاررگرافیت در منفرده است.
(۳) رسانایی آنتروپی و دمای ذوب بالا به کاررگرافیت در منفرده است و دمای ذوب بالا به کاررگرافیت در منفرده است.
(۴) چون الماس جاده شیب است در ساختار منته و ابزار برش شیشه به کار می رود.





۱۱- کدام ترکیب در سمت راست انجام نشده است.

(۲) میانیته آنتالپی پیوندها در $C-C < C-Si-Si$
(۴) دمای ذوب آنتناس < سیلیسیم

(۱) در محلول در آب (در محلول در آب) در محلول در آب
(۳) چگالی گرافیت > چگالی آنتناس

۱۲- کدام ترکیب در محلول در آب در محلول در آب؟

(۱) تنگ لایه ای از گرافیت است، که در آن اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی حلقه های ششگونی را تشکیل داده اند. وقتی مت آن در محلول در آب قرار می گیرد.
(۲) انگلیسی ما شده اند در محلول در آب، با استحکامی ویژه ای دارد به طوری که مقاومت کششی آن حدود ۱۰۰ برابر فولاد است.
(۳) ضخامت گرافن به اندازه یک اتم کربن است، که گونه ای شیمیایی (دولایه ای)، شفاف و انعطاف پذیر است.
(۴) یک روش ساده برای تهیه گرافن، استفاده از گرافیت و لایه های نازک برای جدا کردن لایه های آن است.

۱۳- فلید عبارت از زیر در سمت راست است؟

* گرافن رسانای الکتریسیته است، ولی رسانایی آن از رسانایی فلز کمتر است.
* سیلیس لعنوزان جامد کوئرتز و لایسی در حالت خالص و تراش خورده، شفاف و بی رنگ است.
* پنج از نظر ظاهر شبیه سیلیس است، سازه های بلورینی شفاف بوده و هنر به کار رفته در آن خود جلوه گر زیبایی است. ولی پنج برخلاف سیلیس جامد کوئرتز است.
* مرکب های H_2O در ساختار پنج یک آمایش منظم و سه بعدی، تشکیل حلقه های ششگونی می دهد که می تواند به عنوان یک شبکه ای در نظر گرفته شود.
* در پنج هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوندهای اشتراکی و دو اتم هیدروژن از مرکب های دیگر با پیوندهای هیدروژنی متصل است، در حالی که در سیلیس هم اتم ها با پیوندهای اشتراکی به یکدیگر متصل شده اند.

۱۴- کدام ترکیب عبارت رستی بیان نمی کند؟

(۱) در ساختار یک جامد کوئرتز و لایسی میان هم اتم ها پیوندهای اشتراکی وجود دارد به همین دلیل چنین موادی دمای ذوب بالایی دارند و دیگر گداز هستند.
(۲) برای Cl_2 و C برخلاف H_2O و $NaCl$ واژه کوشیایی رایج هانده ماده موکدلی، فرمول موکدلی و نماد ی
بین موکدلی را می توان به کار برد
(۳) C ، H_2O و $NaCl$ را به ترتیب جامد کوئرتز و لایسی و جامد کوئرتز می توان نامید.

۱۴- رفتار فیزیکی مواد موکدلی به نوع و قدرت نیروهای بین موکدلی آن ها بستگی دارد.





۱۵- نیروی بین مولکولی یک جسم کربلگم نرینه بی اثر است ؟

(۱) آنتالپی تبخیر (۲) زقطار شیمیایی (۳) نقطه جوش (۴) نقطه ذوب

۱۶- زقطار شیمیایی یک ترکیب مولکولی به بستگی دارد.

(۱) پیوندهای اشتراکی در مولکول آن ترکیب (۲) جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول آن
(۳) قدرت و نوع نیروهای بین مولکولی (۴) مورد ۱ و ۲

۱۷- چند عبارت در زیر درست است ؟

- * ساختار لوئیس توزیع الکترون های ظرفیت اتم های سازنده یک گونه شیمیایی را طوری نمایش می دهد که هر اتم به واسطه توزیع جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی بخیر اتم H از یک عدد هفت آبی پیروسی کند.
- * در ساختار لوئیس اتم هیدروژن تنها با یک جفت الکترون با یک پیوند اشتراکی پیروسی آن نمایش داده می شود.
- * توزیع جفت الکترون ها در مولکول ، نقش مهمی در تعیین رفتار آن به ویژه در میدان الکتریکی دارد.
- * مولکول های دواتمی با اتم یکسان را مولکول دواتمی جو هسته گویند ، که ضمیمه جفت الکترون ناپیوندی نداشته باشند در میدان الکتریکی جفت گیری نمی کنند . گشتا و در دو قطبی آن ها صفر بوده و مولکول های ناقطبی نامیده می شوند .
- * در مولکول های دو قطبی با اتم های نا جو هسته ، توزیع الکترون بواسطه نقش پتانسیل الکترواستاتیکی نامتقارن بوده و مولکول های قطبی هستند ، و در میدان الکتریکی جفت گیری می کنند .

(۱) ۵ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۲

۱۸- کدام نرینه عبارت رستی بیان نمی کند ؟

- (۱) در یک تناوب از چپ به راست با کاهش شعاع اتمی ، تمایل به جذب الکترون های پیوندی و جفت نافروری می گردد و جفدهم رفته افزایش می دهد.
- (۲) نقش پتانسیل الکترواستاتیکی بواسطه نمایش اتمال جفدهم الکترون در مولکول است که در آن سمت اتم نافرورتر که تجمع الکترون بیشتر است رنگ قرمز و سمت با تراکم کمتر الکترون با رنگ آبی نمایش می دهند.
- (۳) در مولکول $Cl-Cl$ بر جفدهم گویند $Cl-H$ اتمال جفدهم رفته الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است و گویی بیشتر وقت خود را آنجا می گذرانند از اینرو اتمال جفدهم رفته در جفدهم ها یکسان و متقارن و در مولکول های ناقطبی
- (۴) در مولکول HCl اتمال جفدهم رفته های پیوندی در جفدهم ها یکسان و متقارن نیست لذا از نقش پتانسیل الکترواستاتیکی سمت کمر با رنگ آبی و چشم پر الکترون و سمت هیدروژن با رنگ قرمز و کم الکترون نشان می دهند .

۱۹- در نقش پتانسیل الکترواستاتیکی کدام یک رنگ قرمز آبی مجزا مت هده نمیشود ؟
 H, O, C, N, I, Br, S, F

(۱) HI (۲) H_2O (۳) NH_3 (۴) C_4H_6





۲۰- احتمال عطف رقت رکترون های پیوندی روی هسته ها در کدام نرنه یکسان و متفاوت است؟

- (۱) H_2 و Br_2 (۲) Cl_2 و F_2 (۳) H_2S و HCl (۴) O_2 و N_2

۲۱- آگ نرنه ها زیر نقشه پتانسیل اکندرات تیلی متفاوت دارند به جز ...

- (۱) He و N_2 (۲) CH_3Cl و PF_3 (۳) SO_2 و BeF_2 (۴) SiF_2

۲۲- کدام نرنه عبات رستی بیان نمی کند؟

- (۱) در موکدل خطی سه اتمی مانند BeF_2 و CO_2 و CS_2 هسته هر سه اتم سازنده آن بر روی یک خط قرار دارد.
- (۲) اگر توزیع رکترون بین اتم ها تشکیل دهنده موکدل متفاوت نباشد آن موکدل قطبی و دارای گشت در دو قطب نیز است.
- (۳) در موکدل سه اتمی و ناقص CO_2 تراکم بار کترگی بر روی اتم ها را لیثون و کترن به هم مساوی است.
- (۴) در موکدل CO_2 توزیع بار کترگی پیرامون اتم مرکزی متفاوت بوده، لذا موکدل ناقص و در نتیجه آن اتم مرکزی جهت گیری نمی کند. ولی در موکدل SO_2 با توجه به پیوند تراکم بار بیشتر روی هسته اتم اکترن این موکدل قطبی است.

۲۳- عبات رکت کدام است؟

- (۱) نقشه پتانسیل موکلی کربونیل سولفید (SO) چگونه است که گوشت رکتور و دارای $C=O$ با رشتی و $C=O$ آب رنگ و دارای ضربی با رشت است.
- (۲) در نقشه پتانسیل موکدل آئین (C_2H_2) سهت هیه دورنما یکی به هیست (رنگ آبی) و کترن ها یکی به رشتی (رکتور رنگ) نشان داده می شود و در میان آن سهت گیری می کند چوگشت و در دو قطب قرار دارد.
- (۳) موکدل SO_2 ناقص و ضربی با رشتی با رکت رکتور روی اتم مرکزی قرار دارد. به خلاف آمونیاک که قطبی است و تراکم بار رشت با رکت آب روی اتم مرکزی است. و گشت در دو قطب آن مخالف هم است.
- (۴) مایع کلروفرم $CHCl_3$ مانند رکت تراکریب CCl_4 ناقص بوده در مقابل رشت با رکت کتری بدون انحراف عبور میکند.

۲۴- عبات رکت نامرست را مشخص کنید.

- (۱) شاره یا بیال های موکلی ویونی می تواند برای تولید یونی کبار رزنه و عمل انتقال انرژگی برای باشد.
- (۲) خورشیه بزرگترین منبع جذب یونیر انرژگی است که انرژ خود را عبات گرما به سوس ماکیل میدارد.
- (۳) هر چه میزان بیشتر از انرژ خورشیه بهره ببریم، تعداد انرژگی وک بپ کاهش رپای رکت محلی خواهد شد.
- (۴) دانشندان برای استفاده بهینه از خورشیه، به دنبال فن آوری هستند که بتواند بخشی از انرژ خود را در دایان خورشیه را ذخیره و به انرژ کتری تبدیل کند.



- ۲۵ - چند عبارت در بربر است -
- * تبدیل پرل‌های خورشیدی به انرژی الکتریکی تنها در برخی کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود چون به دانش و فنّاوری پیشرفته نیازمند است .
 - * در فن آوری پیشرفته توسط آینه ها انرژی خورشید را بر روی شیشه مورد نظر متمرکز می‌کنند . تا آنجا گرم یا در کشتی ها به یونی با انرژی خورشید دوبسته ، حرارت حاصل را جهت تولید بخار آب و در چرخ توربین صرف میکنند .
 - * فاصله حرارتی یا گستره دمای مایع یون به تفاوت دما در دپ و جوشش سنگی دارد که به قدرت جاذبه بین مولکولی بستگی دارد .
 - * نسبت به NaCl و HF در گستره دمای کمتری به حالت مایع است .
 - * تفاوت دمای دپ و جوشش $\text{NaCl} < \text{HF} < \text{Ne}$ است .
 - * برای جذب انرژی گرمایی خورشید و انتقال آن به یونی از شیشه مولکولی مناسبتر است .

۳ (۲)

۵ (۳)

۶ (۲)

۷ (۱)

- ۲۶ - کدام فرضیه عبارت رستی بیان نمی‌کند .
- (۱) شاره یونی درگیرنده جرج توسط پرتهای خورشیدی متمرکز شده توسط آینه ها در دمای بالا مایع شده و این شاره داغ به منبع ذخیره انرژی گرمایی سرازیر شده حتی در روزهای ابری و شب هنگام ، انرژی لازم برای تبخیر آب فراختم می‌شود .
 - (۲) بخار آب داغ ، توربین را بواسطه تولید انرژی الکتریکی به حرکت در می‌آورد .
 - (۳) از آنجا که گستره دمای سیم کمریدنداب حدود $۱۳۵۰ - ۱۵۰۰$ است میدان از شاره کمریدنی نیز در صورت نبود NaCl حکم گرفت .
 - (۴) نیروی بین ذره ای در سیم کمرید پیوند قدر یونی و فاندرالین بوده است پس شعله ای از یون ها مشت و فنی است .

۲۷ - چند عبارت در بربر است ؟

- * در جادوات یونی شاد چینی زیبا و منظم و دو بعدی از یون های مثبت و یون های منفی هستیم .
- * هر ترکیب یونی دو تایی را می‌توان فرآورده وانش یک فلز با یک نافلز دانست . دانش همراه با دارنده متد
- * فنانش میثا Na و Al اولی با از دست دادن ۱ اکسید لایه با هوش حجم به کاتدی با Al ایش Ne و دومی با گرفتن آندون و افزایش حجم به آندونی با Ar ۱۸ با جاذبه آتکریج قدر بنام پیوند یون به هم متصل می‌شوند .
- * در ترکیبات یونی نیروی جاذبه و دفع به شمار می‌آید از یون ها هم در بوده که به ملول واهم به یونی را تشکیل می‌دهند .
- * وجود در سیم کمرید و سایر جادوات یونی در طبیعت نشان می‌دهد که نیروی جاذبه بین یون ها و هم بر نیروی جاذبه بین یون ها و هم غلبه دارد .

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)





۲۸- از واکنش ... با ... حاصل می شود سفید زنگی بر جوی میماند که محلول ... و فلز دیگری زیاد از واکنش در این واکنش نشان میدهد که ... است .
 (۱) سدیم - گاز کلر - نمک خوراکی - بیابانها
 (۲) گاز کلر - سدیم - سدیم کلرید - بهشت گرگان
 (۳) Zn با H_2SO_4 - روی سولفات - گراده
 (۴) تیاسیم - گاز کلر - تیاسیم کلرید - بهشت گرگان

۲۹- به شما نزدیکترین یون های نافهم موجود در پیرامون در شبکه بلور ... می گذرند به این عدد مربوط به ... است و رنگ طعم بر یون سدیم و کلرید ترتیب ... است .
 (۱) عدد کد رنگ دنیا یون - ترکیب یون - ۶ و ۶
 (۲) عدد کد رنگ دنیا یون - یون ها - ۶ و ۶
 (۳) ظرفیت یونی - ترکیب یون - ۱ و ۱
 (۴) ظرفیت اکسید و آلانسی - یون ها - ۱ و ۱
 ۳۰- برای کدام گزینه می توان از واژه های مانتد موکدول و فرمول مرکب لی استفاده کرد .



۳۱- کدام مقایسه در مورد شعاع درست انجام نشده است ؟



۳۲- کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند .

(۱) در هر دوره از جدول با افزایش عدد اتمی و ثابت ماندن تعداد لایه ها که از آن به سمت راست می رویم شعاع اتمی کاهش و جفت پذیری افزایش می یابد .
 (۲) در هر گروه از جدول با افزایش عدد اتمی و ثابت ماندن لایه ها که از آن به سمت راست می رویم شعاع اتمی افزایش می یابد .
 (۳) چون اتم فلزی با از دست دادن e^- به یون تبدیل می شود پس شعاع یون فلزی از اتم فلزی کوچکتر است .
 (۴) در $(A \rightarrow B)$ می توان گفت A یون نافلزی و B اتم نافلزی است .

۳۳- نسبت بار به شعاع یا جیاهی بارروری یون در کدام ذره بیشتر است ؟



۳۴- جیاهی بارروری کدام یون کمتر است ؟





۳۵- ترکیب یونی از K^+ و NO_3^- و F^- و Cl^- و Na^+ و Mg^{2+} و Al^{3+} و Fe^{3+} تولید
که جابجایی کاتیون را نیز در آن از هم قوی تر باشد ؟



۳۶- کدامیک شبکه بلوری مستحکمتری دارد .



۳۷- دمای ذوب کدامیک پایین تر و شبکه یونی آن سست تر است ؟



۳۸- گرمای مهار شده ضمن انجام کدام فرآیند برآیند شایسته فروپاشی شبکه یونی برابر است ؟



۳۹- کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند .

(۱) آنتالپی فروپاشی گرمای مصرف شده در فرآیند برای فروپاشی یک مول از شبکه یونی و تبدیل آن به یون های گازی سارنده است .

(۲) هرچه جیلی بار یون های سارنده یک جاده یونی کمتر باشد شبکه آن (سوار تر فروپاشیده می شود .

(۳) فلزها بر خلاف نافلزات عنصرهای شل نمیر با جلیلی زیرپا هستند .

(۴) با افزایش شعاع کاتیون فلزات قلیایی یا افزایش شعاع آنیون هالید آنتالپی فروپاشی تحت شبکه فلزات قلیایی کاهش می یابد .

۴۰- میان آنتالپی فروپاشی شبکه یونی با نقطه ذوب جاده های یونی رابطه و میان انرژی کاتیون و آنیون با آنتالپی فروپاشی شبکه یونی رابطه و بین حجم آنیون ها و کاتیون ها با دمای ذوب و آنتالپی فروپاشی رابطه وجود دارد .

(۲) مستقیم - مستقیم - مستقیم


(۱) مستقیم - مستقیم - وارونه

(۴) عکس - مستقیم - عکس

(۳) مستقیم - وارونه - وارونه



شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری



۴۱ - با توجه به نمودار مقابل می توان گفت :

- ۱) با افزایش شعاع کاتیون فلزهای قلیایی آنتالپی فروپاشی شبکه کاهش یافته است.
- ۲) با افزایش شعاع آنیون ها لید، آنتالپی فروپاشی شبکه کاهش یافته است.
- ۳) بهترین آنتالپی شبکه به F^- مربوط است.
- ۴) ضمن دانستن Br^- با Na^+ کمترین انرژی آزاد می شود.

۴۲ - چند عبارت زیر درست است ؟

- * مواد از جمله فلزها همواره برای زندگی انسان و دامنه آن ضروری و ارزشمند بوده اند به طوری که تمدن های آغازین نیز براساس گستره کاربری آن ها نام گذاری شده اند.
- * پس از دوره سنگی ، در دوره بزر و میتر آهن ، جوامع دچار درگیری و رشد چشمگیری شدند و این خود نشان از جایگاه برجسته فلزها در تمدن بشری دارد.
- * به بیشتر فلزها در صنعت پلیمرها از اهمیت این عناصر فلزی در گسترش و ارتقاء کیفیت زندگی به شدت گامته شده است .
- * افراد معدودی هنوز براین باورند که پایداری جامعه پیشرفته با فتادری کارآمد به گسترگی استفاده از عنصری فلزی وابسته است .
- * فلزها بخش عمده عنصری جدول دوره ای را تشکیل می دهند و درجه رسته s, p, d, f جای داشته و رفتار فیزیکی و شیمیایی کاملاً متفاوتی دارند .

۲۱۴

۳(۳)

۴۲۳

۵۱۱

۴۳ - کدام فرضیه به رفتار فیزیکی فلزات برگرد.

۴۴ (۴) برادر

- ۱) درشتن جلا ۲) رسانایی الکتریکی ۳) زیبایی برای شکل پذیری ۴) رسانایی

۴۴ - عبارت درست کدام است ؟

- ۱) واکنش پذیری و تنوع اعداد اکسایش از جمله رفتار شیمیایی فلزات است
- ۲) شبکه بلوری فلزات شامل یون مثبت فلز و دریا کاتیون است
- ۳) ساختار فلزها از این منظر از کاتیون ها در دو بعد در دریا کاتیون است
- ۴) مورد ۱ و ۲





۴۵ - عبارت ناریت کدام است ؟
 (۱) به علت شعله زرد و تند آتش در طرفین کم در فلزات ، آتش زردی لایه آفرین هدایت نامستقر آمده و به دلیل شبکه بلورین هدایت در یای آتش در تعلق دارد.
 (۲) یون مثبت فلز در دریا آتش در نامستقر لایه آفرین فلزی ، سنگ و برده و به دلیل یون مثبت با دریا آتش در ، پیوندهای گفندی شود.
 (۳) آتش زردی ' طرفین اتم فلزی در یای آتش در می سازند و به علت نامستقر بودن ، آتش زردی در یای آتش در را نمی توان اتم های متعلق دانست .

(۴) هر چه فلزی عجیب تر باشد ، در یای آتش در آن با کاتین فلز با دوقوسی تری برقرار کرده و پیوندهای فلزی حاصل قوسی تر است .

۴۶ - علت چکش خواری و رسانایی اکثر فلزات
 (۱) پیوندهای فلزی است . (۲) وجود در یای آتش در مستقر است . (۳) وجود در یای آتش در نامستقر است (۴) همبستگی با الکترون

۴۷ - فلزات ماسه ترکیبات یونیه به علت
 (۱) به علت فلزات آن ها ضمن عبور برقی تجزیه نمی شوند . (۲) و ماسه آن ها با عبور برقی تجزیه می شوند
 (۳) به علت فلزات آن ها ضمن عبور برقی گرم می شوند (۴) و ماسه آن ها به تدریج از دریا بیرون می کشند

۴۸ - خند عبارت در زیر چیست ؟
 * به مجموع آتش زردی نامستقر (آتش زردی طرفین) فلزات در یای آتش در گویند و عاملی است که چیدمان کاتین ها را در شبکه بلورین حفظ می کند .

* چکش خواری و رسانایی اکثر فلزات در فلزات با وجود در یای آتش در توجیه می شود .
 * هر چه شعله کاتین فلزی که خنجر و تند آتش در لایه آفرین یار تر باشد در یای آتش در غلیظ تر ، پیوندهای فلزی حاصل قوی تر و دمای ذوب فلز بیشتر می شود و بر این اساس دمای ذوب در گروه اول از بالا به پایین کمتر می شود .

* در تناوب سوم از چیدمان به دلیل افزایش قدرت پیوندهای فلزی ، سختی و دمای ذوب $Na < Mg < Al$ است .
 * افسس و درک رنگ به دلیل نورهای است که از محیط پیرامون به چشم ما میرسد ، و این نورها بخشی از پرتو آتش در متفاوتی هستند که طول موج آن ها در گستره 400 تا 700 نانومتر است و جسم ما آن ها را می بیند .
 * اگر در محیطی نور با طول موج 400 تا 700 نانومتر (نور مرئی) نباشد ، انسان قادر به دیدن محیط پیرامون خود نیست .





۴۹ - کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند ؟

- (۱) مواد رنگی بخشی از نور سفید تابیده شده را جذب و باقی مانده آن را عبور یا بازتاب میدهند.
- (۲) اگر یک نمونه ماده هم طول موج های مرئی را بازتاب کند به رنگ سیاه و اگر هم را جذب کند به رنگ سفید دیده میشود.
- (۳) چشم ما مواد رنگی را با طول موج های عبوری یا بازتاب شده از آن ها، یا رنگ مکمل نور جذب شده را می بیند.

(۴) رنگ دانه ماده اصلی سازنده یک ماده رنگی است، برای مثال TiO_2 و Fe_2O_3 و (دوده) (C) از جمله رنگ دانه های معدنی هستند که به ترتیب رنگ های سفید، قرمز و سیاه ایجاد می کنند.

۵۰ - رنگ های متنوعی که در عطر حاضر در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد از منابع طبیعی - پتاسیم

- (۱) گیاهی استخراج می شود (۲) به دست (۳) برخی کانی ها و سنتز شیمیایی (۴) ۴۲ درجه

۵۱ - از رنگ های ساختمانی به چه دردی - - - - استفاده می شود.

- (۱) صنایع غذایی (۲) صنایع نساجی (۳) صنایع ساختمانی (۴) ۴۲ درجه

۵۲ - علت استفاده از رنگ در صنایع گوناگون - - - -

- (۱) رقابت اقتصادی (۲) ارتقاء جنبه های علمی (۳) ارتقاء زیبایی شناسی (۴) ۴۲ درجه

۵۳ - کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند ؟

- (۱) رنگ هایی که برای پوشش سطح استفاده می شود، نوعی کلوئید (ماده پخش کننده) است.
- (۲) رنگ های لایه نازکی روی سطح ایجاد می شود، تا افزودن بر زیبایی، مانع خوردگی در برابر اکسیدان و در طبیعت و مواد شیمیایی گردند.

- (۳) عطر ۲۳۲ در ترکیبات مختلف رنگ کیسانی ایجاد می کند، و از آن بعد از رنگ دانه استفاده می کنند.
- (۴) تیتانیوم با ویژگی های باورکردنی، فلزی فلزات انتظام است.

۵۴ - کدام گزینه در مورد عطر واثاریم درست بیان شده است ؟

- (۱) در تناوب چه هم درده پنجم از فلزات واسطه با یکدیگر له جبه دل به پنج اکسیدان طرز است.
- (۲) محلول های رنگ و آن ریم (I) آبی رنگ است.
- (۳) محلول های رنگ و آن ریم (II) سبز رنگ است. و آن ریم ۲ در رنگ است.
- (۴) محلول های رنگ و آن ریم (III) به رنگ است. چون در سیر لای ۴ S (تقریبی ندارد).



۶۱ - کدام گزینه در مورد نیتروسل درست است ؟

- (۱) آلیاژی از نیترونیوم و نیکل است
(۲) آلیاژی از نیتروژن و مس است
(۳) درخت فرا درده ۶ صفتی و پخشگی کاربرد دارد.
(۴) ۲۴ سوار دارد.

۶۲ - از آلیاژ نیترونیوم رشت ... استفاده می شود.

- (۱) سازه ملزی در ارتقودشی (۲) استنت برای گر ها (۳) قاب عینک (۴) ۲۴ سوار دارد

۶۳ - غش که کدام گروه از واحدهای تجزایی نیم مرگدل تشکیل شده اند ؟ (در مگدل تک یا دو یا ضیاعی)

- (۱) ۱۶ (۲) ۱۲ (۳) ۱۷ (۴) ۱۸

۶۴ - غش که کدام گروه فبره در اکونولولانی هستند ؟

- (۱) ۱۳ (۲) ۱۴ (۳) ۱۵ (۴) ۱۱

۶۵ - عصبیت نامریت کدام است ؟

- (۱) عصبهای رسته که همگی بر طبقه عناصر رسته S و P همگی فلز هستند .

(۲) سیلیسیم کربید (SiC) جامد کوئندالانی است که بعد از آن نیتروژن در آفتیت در تهیه سنباده کاربرد می رود.

(۳) SiC از نظر سختی از آلومینا سیلیسیم سختی کمتری دارد . ولی طول پودنه آن بلندتر و انرژی پودنه و دمای ذوب آن کمتر است .

(۴) ترکیبات یونی در حالت جامد نامریت دارند . مذاب و مگدل رانی کمتر رسته بوده و ضمن عبور برقی بر طبقه فلزات تجزیه می شوند .

۶۶ - از نظر تنوع و شمار سوار ...

- (۱) مگدل < یون > کوئندالانی
(۲) مگدل < یون > کوئندالانی
(۳) یون < مگدل > کوئندالانی
(۴) یون < مگدل > کوئندالانی

۶۷ - کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند .

- (۱) گستره دمای یا تفاوت دمای ذوب و جوش در جامد کوئندالانی حد اکثر و در جامد یون حد اقل است
(۲) جامدات مگدلی به میل ، دمای ذوب و جوش کم و نیروی بین مگدل ضعیف در دما ذوب و جوش مایل به کاهش
(۳) از نظر دانسیته یونی ...
(۴) شماره یون NaCl در گستره دمای جوش کم است .

۲۲Ti > ۲۲V > ۱۹K
H₂O در دانه گرا / خط و به سرد از دست به دور .






۶۸ - کدام عنصر زیر اکسایش در آب محسوب نمی شود؟

(۱) سیلیسیم (۲) فوسفور (۳) طلا (۴) لوئور

۶۹ - کدام گزینه در طبیعت به شکل تک های اکسایش در یافت می شوند؟

(۱) سیلیسیم (۲) فوسفور (۳) گداز (۴) ۳۲ مترار





۷۰ - با توجه به ساختارهای زیر، با کدام ذره در آب متضاد نشده است؟ Si^{4+} ، P^{5+} ، As^{5+} ، S^{6+} 

$$c = -2, b = -2, a = -4 \quad (2)$$

$$c = -2, b = -3, a = -3 \quad (1)$$

$$c = 3-, b = 3-, a = 4- \quad (4)$$

$$c = 2-, b = 3-, a = 4- \quad (3)$$

۷۱ - ترکیب $\left[O - \overset{\overset{O}{\parallel}}{Si} - O \right]^a$ با یون سدیم و یون کلسیم را با آن فرمول ... و ... است؟۷۲ - فرمول ترکیب $\left[O - \overset{\overset{O}{\parallel}}{P} - O \right]^b$ با یون آلومینیم کدام است؟۷۳ - فرمول ترکیب یون $\left[O - \overset{\overset{O}{\parallel}}{S} - O \right]^a$ با یون روی و یون آلومینیم کدام است؟ Al^{3+} و SO_4^{2-} 

۷۴ - کدامیک در میان اکته یکی جهت گیر نمی کند؟

(۱) دی متیل اتر (۲) اتانول (۳) پروپان (۴) استون



۷۵ - نیروی بین مولکولی در کدامیک قوی تر و در کدامی اتفاق می تواند مایع باشد؟

(۱) متان (۲) دی متیل اتر (۳) اتان (۴) هیدروژن کلرید

۷۶ - جسم A سخت و شکسته نیست ، و در حالت جامد رسانای برقی بوده لذا جامد ... است ؟

(۱) فلزی (۲) مولکولی (۳) کوئوردانسی (۴) یونی

۷۷ - جسم B سخت و شکسته است ، در حالت مذاب رسانای برقی است لذا جامد ... است ؟

(۱) فلزی (۲) یونی (۳) مولکولی (۴) کوئوردانسی

۷۸ - جسم C سخت و شکسته است و در حالت مذاب رسانای برقی نیست ، لذا جامد ... است ؟

(۱) فلزی (۲) یونی یا کوئوردانسی (۳) شبکه یا کوئوردانسی (۴) شبکه یا واندر والسی

۷۹ - جسم D سخت و شکسته نیست و در حالت جامد رسانای الکتریسیته نیست لذا جامد ... است ؟

(۱) یونی (۲) فلزی (۳) مولکولی (۴) کوئوردانسی

۸۰ - در کدام گزینه به حالت جامد اتم ها با جاذبه های بسیار ضعیف لاندون حجم متخلخل ؟

(۱) هلیوم (۲) کلر (۳) متان (۴) آمونیاک سرد

نام :

نام خانوادگی :

مقطع / رشته :

شماره آزمون :

نام آزمون :

توجه : کل محل مورد نظر را با مداد مشکی نرم طوری پررنگ کنید که شماره داخل آن دیده نشود .

۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹

۱	۱	۲	۳	۴	۵۱	۱	۲	۳	۴	۱۰۱	۱	۲	۳	۴	۱۵۱	۱	۲	۳	۴	۲۰۱	۱	۲	۳	۴	۲۵۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴	۵۲	۱	۲	۳	۴	۱۰۲	۱	۲	۳	۴	۱۵۲	۱	۲	۳	۴	۲۰۲	۱	۲	۳	۴	۲۵۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴	۵۳	۱	۲	۳	۴	۱۰۳	۱	۲	۳	۴	۱۵۳	۱	۲	۳	۴	۲۰۳	۱	۲	۳	۴	۲۵۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴	۵۴	۱	۲	۳	۴	۱۰۴	۱	۲	۳	۴	۱۵۴	۱	۲	۳	۴	۲۰۴	۱	۲	۳	۴	۲۵۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴	۵۵	۱	۲	۳	۴	۱۰۵	۱	۲	۳	۴	۱۵۵	۱	۲	۳	۴	۲۰۵	۱	۲	۳	۴	۲۵۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴	۵۶	۱	۲	۳	۴	۱۰۶	۱	۲	۳	۴	۱۵۶	۱	۲	۳	۴	۲۰۶	۱	۲	۳	۴	۲۵۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴	۵۷	۱	۲	۳	۴	۱۰۷	۱	۲	۳	۴	۱۵۷	۱	۲	۳	۴	۲۰۷	۱	۲	۳	۴	۲۵۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴	۵۸	۱	۲	۳	۴	۱۰۸	۱	۲	۳	۴	۱۵۸	۱	۲	۳	۴	۲۰۸	۱	۲	۳	۴	۲۵۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴	۵۹	۱	۲	۳	۴	۱۰۹	۱	۲	۳	۴	۱۵۹	۱	۲	۳	۴	۲۰۹	۱	۲	۳	۴	۲۵۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴	۶۰	۱	۲	۳	۴	۱۱۰	۱	۲	۳	۴	۱۶۰	۱	۲	۳	۴	۲۱۰	۱	۲	۳	۴	۲۶۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴	۶۱	۱	۲	۳	۴	۱۱۱	۱	۲	۳	۴	۱۶۱	۱	۲	۳	۴	۲۱۱	۱	۲	۳	۴	۲۶۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴	۶۲	۱	۲	۳	۴	۱۱۲	۱	۲	۳	۴	۱۶۲	۱	۲	۳	۴	۲۱۲	۱	۲	۳	۴	۲۶۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴	۶۳	۱	۲	۳	۴	۱۱۳	۱	۲	۳	۴	۱۶۳	۱	۲	۳	۴	۲۱۳	۱	۲	۳	۴	۲۶۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴	۶۴	۱	۲	۳	۴	۱۱۴	۱	۲	۳	۴	۱۶۴	۱	۲	۳	۴	۲۱۴	۱	۲	۳	۴	۲۶۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴	۶۵	۱	۲	۳	۴	۱۱۵	۱	۲	۳	۴	۱۶۵	۱	۲	۳	۴	۲۱۵	۱	۲	۳	۴	۲۶۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴	۶۶	۱	۲	۳	۴	۱۱۶	۱	۲	۳	۴	۱۶۶	۱	۲	۳	۴	۲۱۶	۱	۲	۳	۴	۲۶۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴	۶۷	۱	۲	۳	۴	۱۱۷	۱	۲	۳	۴	۱۶۷	۱	۲	۳	۴	۲۱۷	۱	۲	۳	۴	۲۶۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴	۶۸	۱	۲	۳	۴	۱۱۸	۱	۲	۳	۴	۱۶۸	۱	۲	۳	۴	۲۱۸	۱	۲	۳	۴	۲۶۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴	۶۹	۱	۲	۳	۴	۱۱۹	۱	۲	۳	۴	۱۶۹	۱	۲	۳	۴	۲۱۹	۱	۲	۳	۴	۲۶۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴	۷۰	۱	۲	۳	۴	۱۲۰	۱	۲	۳	۴	۱۷۰	۱	۲	۳	۴	۲۲۰	۱	۲	۳	۴	۲۷۰	۱	۲	۳	۴
۲۱	۱	۲	۳	۴	۷۱	۱	۲	۳	۴	۱۲۱	۱	۲	۳	۴	۱۷۱	۱	۲	۳	۴	۲۲۱	۱	۲	۳	۴	۲۷۱	۱	۲	۳	۴
۲۲	۱	۲	۳	۴	۷۲	۱	۲	۳	۴	۱۲۲	۱	۲	۳	۴	۱۷۲	۱	۲	۳	۴	۲۲۲	۱	۲	۳	۴	۲۷۲	۱	۲	۳	۴
۲۳	۱	۲	۳	۴	۷۳	۱	۲	۳	۴	۱۲۳	۱	۲	۳	۴	۱۷۳	۱	۲	۳	۴	۲۲۳	۱	۲	۳	۴	۲۷۳	۱	۲	۳	۴
۲۴	۱	۲	۳	۴	۷۴	۱	۲	۳	۴	۱۲۴	۱	۲	۳	۴	۱۷۴	۱	۲	۳	۴	۲۲۴	۱	۲	۳	۴	۲۷۴	۱	۲	۳	۴
۲۵	۱	۲	۳	۴	۷۵	۱	۲	۳	۴	۱۲۵	۱	۲	۳	۴	۱۷۵	۱	۲	۳	۴	۲۲۵	۱	۲	۳	۴	۲۷۵	۱	۲	۳	۴
۲۶	۱	۲	۳	۴	۷۶	۱	۲	۳	۴	۱۲۶	۱	۲	۳	۴	۱۷۶	۱	۲	۳	۴	۲۲۶	۱	۲	۳	۴	۲۷۶	۱	۲	۳	۴
۲۷	۱	۲	۳	۴	۷۷	۱	۲	۳	۴	۱۲۷	۱	۲	۳	۴	۱۷۷	۱	۲	۳	۴	۲۲۷	۱	۲	۳	۴	۲۷۷	۱	۲	۳	۴
۲۸	۱	۲	۳	۴	۷۸	۱	۲	۳	۴	۱۲۸	۱	۲	۳	۴	۱۷۸	۱	۲	۳	۴	۲۲۸	۱	۲	۳	۴	۲۷۸	۱	۲	۳	۴
۲۹	۱	۲	۳	۴	۷۹	۱	۲	۳	۴	۱۲۹	۱	۲	۳	۴	۱۷۹	۱	۲	۳	۴	۲۲۹	۱	۲	۳	۴	۲۷۹	۱	۲	۳	۴
۳۰	۱	۲	۳	۴	۸۰	۱	۲	۳	۴	۱۳۰	۱	۲	۳	۴	۱۸۰	۱	۲	۳	۴	۲۳۰	۱	۲	۳	۴	۲۸۰	۱	۲	۳	۴
۳۱	۱	۲	۳	۴	۸۱	۱	۲	۳	۴	۱۳۱	۱	۲	۳	۴	۱۸۱	۱	۲	۳	۴	۲۳۱	۱	۲	۳	۴	۲۸۱	۱	۲	۳	۴
۳۲	۱	۲	۳	۴	۸۲	۱	۲	۳	۴	۱۳۲	۱	۲	۳	۴	۱۸۲	۱	۲	۳	۴	۲۳۲	۱	۲	۳	۴	۲۸۲	۱	۲	۳	۴
۳۳	۱	۲	۳	۴	۸۳	۱	۲	۳	۴	۱۳۳	۱	۲	۳	۴	۱۸۳	۱	۲	۳	۴	۲۳۳	۱	۲	۳	۴	۲۸۳	۱	۲	۳	۴
۳۴	۱	۲	۳	۴	۸۴	۱	۲	۳	۴	۱۳۴	۱	۲	۳	۴	۱۸۴	۱	۲	۳	۴	۲۳۴	۱	۲	۳	۴	۲۸۴	۱	۲	۳	۴
۳۵	۱	۲	۳	۴	۸۵	۱	۲	۳	۴	۱۳۵	۱	۲	۳	۴	۱۸۵	۱	۲	۳	۴	۲۳۵	۱	۲	۳	۴	۲۸۵	۱	۲	۳	۴
۳۶	۱	۲	۳	۴	۸۶	۱	۲	۳	۴	۱۳۶	۱	۲	۳	۴	۱۸۶	۱	۲	۳	۴	۲۳۶	۱	۲	۳	۴	۲۸۶	۱	۲	۳	۴
۳۷	۱	۲	۳	۴	۸۷	۱	۲	۳	۴	۱۳۷	۱	۲	۳	۴	۱۸۷	۱	۲	۳	۴	۲۳۷	۱	۲	۳	۴	۲۸۷	۱	۲	۳	۴
۳۸	۱	۲	۳	۴	۸۸	۱	۲	۳	۴	۱۳۸	۱	۲	۳	۴	۱۸۸	۱	۲	۳	۴	۲۳۸	۱	۲	۳	۴	۲۸۸	۱	۲	۳	۴
۳۹	۱	۲	۳	۴	۸۹	۱	۲	۳	۴	۱۳۹	۱	۲	۳	۴	۱۸۹	۱	۲	۳	۴	۲۳۹	۱	۲	۳	۴	۲۸۹	۱	۲	۳	۴
۴۰	۱	۲	۳	۴	۹۰	۱	۲	۳	۴	۱۴۰	۱	۲	۳	۴	۱۹۰	۱	۲	۳	۴	۲۴۰	۱	۲	۳	۴	۲۹۰	۱	۲	۳	۴
۴۱	۱	۲	۳	۴	۹۱	۱	۲	۳	۴	۱۴۱	۱	۲	۳	۴	۱۹۱	۱	۲	۳	۴	۲۴۱	۱	۲	۳	۴	۲۹۱	۱	۲	۳	۴
۴۲	۱	۲	۳	۴	۹۲	۱	۲	۳	۴	۱۴۲	۱	۲	۳	۴	۱۹۲	۱	۲	۳	۴	۲۴۲	۱	۲	۳	۴	۲۹۲	۱	۲	۳	۴
۴۳	۱	۲	۳	۴	۹۳	۱	۲	۳	۴	۱۴۳	۱	۲	۳	۴	۱۹۳	۱	۲	۳	۴	۲۴۳	۱	۲	۳	۴	۲۹۳	۱	۲	۳	۴
۴۴	۱	۲	۳	۴	۹۴	۱	۲	۳	۴	۱۴۴	۱	۲	۳	۴	۱۹۴	۱	۲	۳	۴	۲۴۴	۱	۲	۳	۴	۲۹۴	۱	۲	۳	۴
۴۵	۱	۲	۳	۴	۹۵	۱	۲	۳	۴	۱۴۵	۱	۲	۳	۴	۱۹۵	۱	۲	۳	۴	۲۴۵	۱	۲	۳	۴	۲۹۵	۱	۲	۳	۴
۴۶	۱	۲	۳	۴	۹۶	۱	۲	۳	۴	۱۴۶	۱	۲	۳	۴	۱۹۶	۱	۲	۳	۴	۲۴۶	۱	۲	۳	۴	۲۹۶	۱	۲	۳	۴
۴۷	۱	۲	۳	۴	۹۷	۱	۲	۳	۴	۱۴۷	۱	۲	۳	۴	۱۹۷	۱	۲	۳	۴	۲۴۷	۱	۲	۳	۴	۲۹۷	۱	۲	۳	۴
۴۸	۱	۲	۳	۴	۹۸	۱	۲	۳	۴	۱۴۸	۱	۲	۳	۴	۱۹۸	۱	۲	۳	۴	۲۴۸	۱	۲	۳	۴	۲۹۸	۱	۲	۳	۴
۴۹	۱	۲	۳	۴	۹۹	۱	۲	۳	۴	۱۴۹	۱	۲	۳	۴	۱۹۹	۱													



إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.... (سوره کهف، آیه ۷)

مسلماناً ما آنچه را روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدامشان در عمل نیکوترند.

پاسخ خودآزمایی‌ها، با هم بیندیشیم‌ها، کاوش کنید‌ها و تمرینات
دوره‌ای فصل سوم شیمی دوازدهم

خود را بیازمایید ص 67

خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است. جدول زیر درصد جرمی^۱ مواد سازنده نوعی خاک رس^۲ را نشان می‌دهد که از یک معدن طلا استخراج شده است.

ماده	SiO _۲	Al _۲ O _۳	H _۲ O	Na _۲ O	Fe _۲ O _۳	MgO	Au و دیگر مواد
درصد جرمی	۴۶/۲۰	۳۷/۷۴	۱۳/۳۲	۱/۲۴	۰/۹۶	۰/۴۴	۰/۱

۱- با توجه به داده‌های جدول به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

آ) نام شیمیایی هر یک از مواد موجود در این نوع خاک را بنویسید. **آهن(III) اکسید** : Fe_۲O_۳

سیلیسم دی اکسید : SiO_۲ **آب** : H_۲O **منیزیم اکسید** : MgO

آلومینیوم اکسید : Al_۲O_۳ **سدیم اکسید** : Na_۲O **Au و دیگر مواد** : طلا و مواد دیگر

ب) سرخ فام بودن این نوع خاک رس را به وجود کدام ماده نسبت می‌دهید؟

به دلیل وجود آهن (III) اکسید این خاک رس به رنگ سرخ است (سرخ فام است)

پ) پیش‌بینی کنید هنگام پختن سفالینه‌های تهیه شده از این نوع خاک رس، از جرم کدام

ماده به مقدار بیشتری کاسته می‌شود؟ چرا؟ **آب**

زیرا دمای تبخیر آب کمتر از دمای لازم برای ذوب، تبخیر ویا تجزیه بقیه مواد موجود




در این نوع خاک رس است

۲- اگر اجزای این مخلوط نخست جداسازی شده سپس خالص سازی شوند، پیش بینی کنید ساختار ذره‌ای هریک از این اجزا در حالت خالص و جامد (به جز SiO_2) با کدام الگوی

زیر همخوانی دارد؟ چرا؟
جامد یونی

جامد فلزی

جامد مولکولی



(پ) Au : طلا

طلا یک عنصر و از یک نوع اتم ساخته شده است

(ب) H_2O : آب

آب (یخ) یک ماده مولکولی است و از کنار هم قرار گرفتن مولکول ها ساخته شده است

(آ) MgO : منیزیم اکسید

Al_2O_3 : آلومینیوم اکسید

Na_2O : سدیم اکسید

زیرا این ترکیبات از کنار هم قرار گرفتن کاتیون ها آنیون ها در کنار هم ساخته شده اند

● پخته شدن نان سنگک بر روی دانه‌های درشت سنگ را می‌توان نشانه‌ای از مقاومت گرمایی سیلیس دانست.


۱- با توجه به شکل‌های زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.



(آ) از شیمی ۱ به یاد دارید که مواد مولکولی در ساختار خود مولکول‌های مجزا دارند. کدام ماده در شکل ۴ جزو مواد مولکولی است؟ **کربن دی اکسید از مولکول‌های مجزای CO_2 ساخته شده است**
 (ب) ماده کووالانسی مجموعه‌ای از اتم‌های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند.
 بر این اساس کدام ماده، کووالانسی است؟ **سیلیسم دی اکسید SiO_2 از اتصال بسیاری از اتم‌های سیلیسم و اکسیژن با پیوندهای کووالانسی به هم ساخته شده است**
 ۲- پیش‌بینی کنید کدام ماده:

(آ) سخت‌تر است؟ چرا؟ **سیلیسم دی اکسید: زیرا اتم‌های سیلیسم و اکسیژن با پیوند‌های محکم کووالانسی در تمام ساختار آن بهم متصل شده‌اند**
 (ب) نقطه ذوب پایین‌تری دارد؟ چرا؟ **کربن دی اکسید: زیرا از مولکول‌های مجزای CO_2 ساخته شده که بین این مولکول‌ها نیروی واندروالسی ضعیفی وجود دارد**

۱- گرافیت و الماس از جمله دگرشکل‌های طبیعی کربن بوده که جزو جامدهای کووالانسی هستند. با توجه به ساختارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.




Activ

- (آ) کدام ساختار، جامد کووالانسی با چینش دو بُعدی اتم‌ها و کدام یک، جامد کووالانسی با چینش سه بُعدی اتم‌ها را نشان می‌دهد؟
گرافیت ساختار لایه لایه با چینش دو بُعدی اتم‌ها در هر لایه و الماس چینش سه بُعدی
- (ب) با توجه به اینکه گرافیت موجود در مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا می‌گذارد، کدام ساختار با این ویژگی همخوانی دارد؟ توضیح دهید. از آن جاکه درگرافیت بین لایه‌ها نیروی واندرولسی وجود دارد بنابراین لایه‌ها به آسانی روی هم می‌لغزند و به گرافیت نرمی ویژه ای می‌دهند. لایه‌ها با جدا شدن از هم بر روی کاغذ اثر می‌گذارند
- (پ) چرا در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود؟
 به علت سختی بالای آن که ناشی از پیوندهای محکم کووالانسی بین اتم‌های کربن موجود در آن است
- (ت) کدام چگالی (۲/۲۷ یا ۳/۵۱ گرم بر سانتی متر مکعب) را به گرافیت می‌توان نسبت داد؟ چرا؟
چگالی کمتر یعنی ۲.۲۷ را به گرافیت می‌توان نسبت داد. زیرا در ساختار گرافیت بین لایه‌ها فضای خالی وجود دارد.
- ۲- با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

پیوند	C-C	Si-Si
میانگین آنتالپی (kJmol ⁻¹)	۳۴۸	۲۲۶

- (آ) اگر سیلیسیم خالص ساختاری همانند الماس داشته باشد، پیش‌بینی کنید نقطه ذوب الماس بالاتر است یا سیلیسیم؟ چرا؟
 الماس، زیرا برای ذوب کردن الماس و سیلیسیم باید به ترتیب پیوند های **C-C** و **Si-Si** شکسته شود از آن جاکه میانگین آنتالپی پیوند **C-C** بیشتر است پس نقطه ی ذوب الماس بالا تر است
- (ب) اگر آنتالپی پیوند Si-O بیشتر از پیوند Si-Si و ساختار Si(s) با SiO₂(s) مشابه باشد، توضیح دهید چرا سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نشده و به‌طور عمده به شکل سیلیس یافت می‌شود؟ زیرا آنتالپی پیوند Si-O از Si-Si بیشتر است پس به هنگام تشکیل سیلیس SiO₂(s) انرژی بیشتری آزاد شده و سطح انرژی ماده سیلیس پایین تر از سیلیسیم قرار می‌گیرد بنابراین پایدار تر است



درباره «رسانایی الکتریکی گرافن» کاوش کنید.

وسایل و مواد مورد نیاز: لامپ LED، باتری ۹ ولتی، سیم، سوکت، مقاومت ۳۳۰ اهمی، مداد و کاغذ.

۱- مداری مطابق شکل روبه‌رو بسازید.

۲- با یک مداد نرم، چهار گوشه‌ای ضخیم و تیره روی کاغذ بکشید، به طوری که حدود ۳ تا ۴ سانتی‌متر طول و حدود ۱/۵ سانتی‌متر عرض داشته باشد، سپس مستطیل را با مداد به طور کامل سیاه کنید.


۳- نوک فلزی دو سیم رابط را با مستطیل گرافیتی که ضخامتی در حدود چند نانومتر دارد تماس دهید سپس به لامپ نگاه کنید، چه رخ می‌دهد؟ **لامپ روشن می‌شود**

۴- دو نقطه اتصال را به هم نزدیک یا از هم دور کنید، چه تغییری در شدت روشنایی لامپ پدید می‌آید؟ **هر چه دو نقطه ی اتصال به هم نزدیک تر باشند شدت روشنایی لامپ بیشتر است. زیرا مقاومت کمتری در مسیر جریان الکتریکی قرار دارد**

۱- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

در ساختار یک جامد ~~کواالانسی~~، میان ~~مولکولی~~ همه اتم‌ها پیوندهای اشتراکی وجود دارد به همین دلیل چنین موادی دمای ذوب ~~بالایی~~ دارند و دیرگداز هستند.

۲- واژه‌های شیمیایی رایج مانند ماده مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی را برای توصیف کدام مواد زیر می‌توان به کار برد؟ چرا؟



از آن جاکه این مواد از واحد‌های مجزای مولکولی ساخته شده‌اند و بین مولکول‌های آن‌ها نیروهای بین مولکولی (واندروالسی یا هیدروژنی) برقرار است بنابراین می‌توان آن‌ها را ماده‌ی مولکولی نامید و واژه‌های فرمول مولکولی و نیروی بین مولکولی را به آن‌ها اختصاص داد.

$C(s)$ (گرافیت) جامد کواالانسی

$NaCl(s)$ جامد یونی

$SiO_2(s)$ جامد کواالانسی


۱- شکل زیر نقشه پتانسیل مولکول‌های کربونیل سولفید (SCO) و اتین (C_2H_2) را نشان می‌دهد. با توجه به آنها گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟



اتین: زیرا توزیع بار الکتریکی در مولکول اتین متقارن است. بنابراین گشتاور دو قطبی مولکول آن برابر صفر است

کربونیل سولفید

۲- با توجه به نقشه پتانسیل مولکول‌های آمونیاک و گوگرد تری اکسید به پرسش‌های پاسخ دهید.





آ) با بیان دلیل، هر یک از اتم‌ها را در نقشه‌های بالا با (δ^+) و (δ^-) نشان دار کنید.

ب) کدام مولکول قطبی و کدام ناقطبی است؟ چرا؟

آمونیاک قطبی: زیرا توزیع بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی (نیتروژن) نامتقارن است.

و گوگرد تری اکسید ناقطبی زیرا توزیع بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی (گوگرد) متقارن است.


۳- با توجه به شکل های زیر با دلیل پیش بینی کنید کدام مایع، کلروفرم (CHCl_3) و کدام یک کربن تتراکلرید (CCl_4) است؟



با توجه به ساختار مولکول دو ماده می توان استنباط کرد توزیع بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی کلروفرم نامتقارن، بنابراین مولکول آن قطبی و در میدان الکتریکی باریکه ی مایع کلروفرم انحراف پیدا می کند. همین طور می توان از ساختار لوئیس کربن تتراکلرید برداشت کرد که توزیع بار الکتریکی اطراف اتم مرکزی متقارن، بنابراین مولکول آن ناقطبی و در میدان الکتریکی باریکه ی مایع کربن تتراکلرید انحراف پیدا نمی کند

با هم بیندیشیم ص 76

شکل زیر شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی را نشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید.



- ۱- مشخص کنید هر یک از جمله های زیر، توصیف کدام بخش از این فناوری است؟
 - (آ) پرتوهای خورشیدی را روی برج گیرنده متمرکز می کنند. **آینه ها**
 - (ب) شاره ای بسیار داغ که باعث تولید بخار داغ می شود. **شاره A**
 - (پ) شاره ای که توربین را به حرکت در می آورد. **بخار داغ**

۲- با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

ماده	نقطه ذوب (°C)	نقطه جوش (°C)
N _۲	-۲۰۷	-۱۹۶
HF	-۸۳	۱۹
NaCl	۸۰۱	۱۴۱۳

ا) کدام ماده در گستره دمایی کمتری به حالت مایع است؟ چرا؟

دمای نقطه ی ذوب - دمای نقطه ی جوش = گستره ی دمای حالت مایع برای یک ماده

کمترین N_۲ برای $11C = (-207) - (-196)$

HF برای $102C = (-83) - 19$

NaCl برای $612C = 801 - 1413$

ب) کدام ماده را به جای شاره A پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟ سدیم کلرید: زیرا در گستره ی دمایی بیشتری به حالت مایع قرار دارد بنابراین بهتر می‌تواند انرژی پرتوهای خورشید را در خود حفظ کند.

۳- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، جمله زیر را کامل کنید.

مطابق یک قاعده کلی هر چه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص ~~بیشتر~~ باشد،

آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده و نیروهای جاذبه میان ذره‌های سازنده

مایع ~~ضعیف‌تر~~ قوی‌تر است.

ص 78

با هم ببیندیشیم

۱- توضیح دهید چرا برای توصیف ترکیب‌های یونی در منابع علمی معتبر هیچ‌گاه واژه‌هایی

مانند مولکول و فرمول مولکولی به کار نمی‌رود؟ شبکه بلور جامد های یونی از کنار هم قرار گرفتن یون های مثبت و منفی ساخته شده بنابراین واحد های مجزایی به نام مولکول ندارند بنابراین نمیتوان از کلمات مولکول و فرمول مولکولی برای آن ها استفاده کرد

۲- جدول زیر اندازه شعاع برخی یون های متداول را در مقایسه با اندازه اتم سازنده آنها نشان

می‌دهد. در مورد این جدول با یکدیگر گفت و گو کنید و روندهای موجود در آن را توضیح دهید.

در یک گروه از جدول تناوبی از بالا به پایین شعاع اتمی و شعاع یونی افزایش می‌یابد زیرا تعداد لایه های الکترونی افزایش می‌یابد

در یک دوره از جدول تناوبی شعاع اتمی از چپ به راست کاهش می‌یابد. همچنین از چپ به راست هر چه بار یون منفی‌تر شعاع آن بیشتر و هر چه بار یون مثبت‌تر شعاع آن کوچکتر است

دوره	گروه	۱۷	۱۶	۲	۱
دوم		F ۱- ۷۱.۱۳۳	O ۲- ۷۳.۱۴۰		Li ۱+ ۱۳۴.۶۸
سوم		Cl ۱- ۹۹.۱۸۱	S ۲- ۱۰۲.۱۸۴	Mg ۲+ ۱۳۰.۶۶	Na ۱+ ۱۵۴.۹۷

۳- اگر هریون را کره‌ای باردار در نظر بگیرید، چگالی بار هم‌ارز با نسبت بار به حجم آن است. کمیتی که می‌تواند برای مقایسه میزان برهم‌کنش میان یون‌ها به کار رود. نسبت ساده‌تری که می‌توان به کاربرد، نسبت مقدار بار یون به شعاع آن است. با این توصیف جدول زیر را کامل کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

کاتیون	شعاع (pm)	نسبت بار به شعاع	آنیون	شعاع (pm)	نسبت بار به شعاع
Na ⁺	۹۷	$1/03 \times 10^{-2}$	F ⁻	۱۳۳	7.52×10^{-3}
K ⁺	133.33	$7/5 \times 10^{-2}$	Cl ⁻	۱۸۱	5.52×10^{-3}
Mg ²⁺	66.00	$3/03 \times 10^{-2}$	O ²⁻	۱۴۰	1.43×10^{-2}
Ca ²⁺	۹۹	2.02×10^{-2}	S ²⁻	۱۸۴	$1/09 \times 10^{-2}$

آ) چگالی بار کدام کاتیون کمتر و کدام یک بیشتر است؟ چرا؟ یون پتاسیم کمترین و یون منیزیم بیشترین چگالی بار را در بین کاتیون‌ها دارند زیرا هرچه نسبت بار به شعاع یون کوچکتر باشد چگالی بار آن کمتر است و برعکس
 ب) چگالی بار کدام آنیون کمتر و کدام یک بیشتر است؟ چرا؟ آنیون اکسید بیشترین چگالی بار و آنیون کلرید کمترین چگالی بار را در بین آنیون‌ها دارند زیرا هرچه نسبت بار به شعاع یون کوچکتر باشد چگالی بار آن کمتر است و برعکس
 پ) پیش‌بینی کنید نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه قوی‌تر است؟ چرا؟ جاذبه بین یون منیزیم و اکسید از بقیه قوی‌تر است زیرا در بین کاتیون‌ها و آنیون‌ها بیشترین چگالی بار را دارند.
 ت) پیش‌بینی کنید نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه ضعیف‌تر است؟ چرا؟ نیروی جاذبه بین یون پتاسیم و کلرید از همه بقیه کمتر زیرا این دو یون در بین کاتیون‌ها و آنیون‌ها کمترین چگالی بار را دارند.

خود را بیازمایید ص 80

۱- در هر مورد با خط زدن واژه نادرست، هر یک از عبارت‌های زیر را کامل کنید.
 آ) آنتالپی فروپاشی، گرمای ~~آزاد~~ مصرف شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک ~~مول~~ گرم از شبکه یونی و تبدیل آن به ~~اتم‌های~~ یون‌های گازی سازنده است.
 ب) هر چه ~~بلر~~ چگالی بار یون‌های سازنده یک جامد یونی کمتر باشد، شبکه آن ~~آسان‌تر~~ دشوارتر فروپاشیده می‌شود.

۲- کدام آنتالپی فروپاشی شبکه را می توان به $KCl(s)$ نسبت داد؟ چرا؟

$$۷۱۷ \text{ kJ mol}^{-۱}, ۶۴۹ \text{ یا } ۱۰۳۷$$

با توجه به آنتالپی فروپاشی شبکه ی سدیم کلرید و پتاسیم برمید می توان به جواب رسید

$$\Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{NaCl}, s) = +۷۸۷ \text{ kJ mol}^{-۱}$$

$$\Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{KBr}, s) = +۶۸۹ \text{ kJ mol}^{-۱}$$


ابتدا مقایسه پتاسیم کلرید با سدیم کلرید: در آنیون هر دو مشترک هستند پس مقایسه را با کاتیون انجام می دهیم. کاتیون سدیم و کاتیون پتاسیم هر دو یک بار مثبت هستند. شعاع یون سدیم از یون پتاسیم کمتر است بنابراین چگالی بار یون سدیم بیشتر و انرژی فروپاشی شبکه سدیم کلرید بزرگتر از انرژی شبکه ی پتاسیم کلرید است

مقایسه پتاسیم برمید با پتاسیم کلرید: هر دو ترکیب در کاتیون مشترک هستند پس سراغ آنیون ها میرویم. برمید و کلرید هر دو تک بار منفی هستند، شعاع برمید از شعاع کلرید کمتر است، بنابراین چگالی بار برمید کمتر و آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم برمید از پتاسیم کلرید کمتر است

$$\Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{KBr}, s) < \Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{KCl}, s) < \Delta H_{\text{فروپاشی}}(\text{NaCl}, s)$$

$$698 < 717 < 787$$

۳- با توجه به نمودار زیر به پرسش ها پاسخ دهید.



آ) با افزایش شعاع کاتیون فلزهای قلیایی، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ توضیح دهید. **با افزایش شعاع کاتیون فلزات قلیایی آنتالپی فروپاشی شبکه کمتر می شود زیرا با افزایش شعاع، چگالی بار این کاتیون ها کمتر می شود**

ب) با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ توضیح دهید. **با افزایش شعاع یون هالید آنتالپی فروپاشی شبکه کمتر می شود زیرا هر چه شعاع بیشتر چگالی بار هالید کمتر**

۴- با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه را برای برخی ترکیب‌های یونی نشان

می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

↑ بار ↑ آنتالپی فروپاشی ↑ نقطه ذوب

آنیون \ کاتیون	F^-	O^{2-}
Na^+	۹۲۶	۲۴۸۸
Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸

(آ) درباره درستی جمله زیر گفت‌وگو کنید.

«آنتالپی فروپاشی شبکه با بار الکتریکی کاتیون و هم با بار الکتریکی آنیون رابطه مستقیم دارد».

درست: با توجه به جدول می‌توان استنباط کرد در شبکه یونی هر چه بار کاتیون‌ها و آنیون‌ها بیشتر باشد آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر خواهد بود

(ب) آیا می‌توان میان آنتالپی فروپاشی شبکه و نقطه ذوب جامدهای یونی رابطه‌ای در نظر

گرفت؟ توضیح دهید؟ بله: هر چه آنتالپی فروپاشی شبکه جامد یونی بیشتر باشد نقطه ذوب آن بالاتر است زیرا آنتالپی فروپاشی بیشتر یعنی جاذبه بیشتر بین یون‌ها و جاذبه بیشتر بین ذرات یعنی دمای ذوب بالاتر

ص 82

با هم بیندیشیم

۱- این شکل یک الگوی ساده از شبکه بلوری فلزها را نشان می‌دهد که برای توجیه برخی

رفتارهای فیزیکی آنها ارائه شده و به مدل دریای الکترونی معروف است.

بر اساس این مدل، ساختار فلزها آرایش منظمی از کاتیون‌ها در سه بعد است که در فضای

میان آنها سست‌ترین الکترون‌های موجود در اتم، دریایی را ساخته‌اند و در آن آزادانه جابه‌جا

می‌شوند. با این توصیف به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

(آ) پیش‌بینی کنید کدام الکترون‌ها (درونی - ظرفیت)، دریای الکترونی را می‌سازند؟ چرا؟
الکترون‌های ظرفیت: زیرا این الکترون‌ها سست‌ترین الکترون‌های فلزها هستند. بنابراین راحت‌تر می‌توانند در فضای بین کاتیون‌ها در شبکه یلور فلز جابه‌جا شوند


(ب) کدام ویژگی دریای الکترونی سبب می‌شود که هر الکترون موجود در آن را نتوان تنها

متعلق به یک اتم معین دانست؟
فلز آزادانه حرکت می‌کنند. بنابراین نمی‌توان آن‌ها را متعلق به یک اتم دانست


(پ) درباره درستی جمله زیر با یکدیگر گفت‌وگو کنید.

«دریای الکترونی عاملی است که چیدمان کاتیون‌ها را در شبکه بلوری فلز حفظ می‌کند».

درست: میان کاتیون‌ها در شبکه بلوری فلز نیروی دافعه وجود دارد که از آن‌جا که بین کاتیون‌ها دریای الکترون وجود دارد نیروی جاذبه بین کاتیون و دریای الکترون بر دافع بین کاتیون‌ها غلبه کرده و چیدمان فلز حفظ می‌شود



۲- با توجه به شکل های داده شده به پرسش ها پاسخ دهید.



آ) هر یک از شکل ها نشان دهنده کدام رفتار فیزیکی فلز است؟ 1: چکش خواری فلز (شکل پذیری)
2: رسانایی الکتریکی فلز


ب) رفتار فلز را در هر یک از این دو شکل با توجه به الگوی دریای الکترونی توجیه کنید.

1) در اثر ضربه به فلز کاتیون ها تغییر جایی دهند اما به دلیل جاذبه ی بین کاتیون ها و دریای الکترون شبکه ی بلوری فلز حفظ می شود

2) به علت حرکت آزادانه الکترون ها در دریای الکترون اگر در دو طرف یک قطعه از فلز به کمک یک منبع خارجی اختلاف پتانسیل ایجاد کنیم مطابق شکل الکترون ها از یک سمت به فلز وارد و از سمت دیگر خارج می شوند بنابراین فلزات رسانای الکتریسیته هستند

خود را بیازمایید ص 84

- شکل زیر پیشرفت واکنش فلز روی با محلول نمکی از وانادیم (V) را نشان می دهد.



محلولی از نمک وانادیم (V)

محلولی از نمک وانادیم (IV)

محلولی از نمک وانادیم (III)

محلولی از نمک وانادیم (II)

با توجه به شکل به پرسش های داده شده پاسخ دهید.

آ) آرایش الکترونی اتم وانادیم (۲۳V) را بنویسید. $[Ar] 3d^3 4s^2$

ب) آرایش الکترونی وانادیم را در حالت های اکسایش (II) و (III) بنویسید.

وانادیم (III): $[Ar] 3d^2$

وانادیم (II): $[Ar] 3d^3$

پ) توضیح دهید چرا در هر مرحله رنگ محلول متفاوت از دیگری است؟

زیرا در هر مرحله تعداد الکترون های ظرفیت یون وانادیم متفاوت است

ت) در این واکنش، وانادیم (V) کدام نقش را دارد (اکسنده یا کاهنده)؟ چرا؟

اکسنده: زیرا عدد اکسایش آن کاهش پیدا کرده است

عدد اکسایش آن پس از افزودن گرد روی از پنج به چهار، سپس سه و دو رسیده است

با هم بیندیشیم 85 و 86.....

جدول زیر برخی ویژگی های تیتانیم را در مقایسه با فولاد زنگ نزن نشان می دهد. با توجه

به جدول به پرسش های داده شده پاسخ دهید.

ویژگی	ماده	تیتانیم	فولاد
نقطه ذوب (°C)		۱۶۶۷	۱۵۳۵
چگالی (g mL ^{-۱})		۴/۵۱	۷/۹۰
واکنش با ذره های موجود در آب دریا		ناچیز	متوسط
مقاومت در برابر خوردگی		عالی	ضعیف
مقاومت در برابر سایش		عالی	عالی

آ) هنگامی که موتور جت کار می کند همه اجزای سازنده (ثابت و متحرک) دمای

بالایی دارند. تیتانیم بر اساس کدام ویژگی ها برای ساخت این موتور به کار رفته است؟

توضیح دهید. از آن جاکه دمای ذوب تیتانیم از فولاد زنگ نزن بیشتر است برای ساخت قطعاتی که

لازم است دمای بالایی را تحمل کنند می توان آن را به فولاد زنگ نزن ترجیح داد. همچنین قطعات ساخته

شده از تیتانیم سبک تر (با توجه به چگالی کمتر آن نسبت به فولاد زنگ نزن) و در برابر خوردگی مقاومت آن عالی است.

ب) توضیح دهید چرا امروزه در ساخت پروانه کشتی اقیانوس پیما به جای فولاد از تیتانیم

استفاده می کنند؟ از آنجا که مقاومت در برابر خوردگی تیتانیم عالی و مقاومت فولاد زنگ نزن ناچیز است

واکنش تیتانیم با ذره های موجود در آب دریا کمتر از فولاد است

پ) ساخت بناهای هنرمندانه، زیبا و ماندگار همانند موزه گوگنهایم با پوشش بیرونی

تیتانیم، از چه مزایایی برخوردار است؟ توضیح دهید.

مقاومت بالای تیتانیم در برابر خوردگی باعث افزایش ماندگاری این بناها می شود

۲- سیلیسیم کربید (SiC) یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می رود.

(آ) این ماده را در کدام دسته از مواد جای می دهید؟ چرا؟

از آن جا که این ماده ساختاری شبیه به الماس (تعداد بسیاری از اتم های کربن و سیلیسیم که با پیوند کوالانسی به هم متصل شده اند) دارد آن را در دسته جامد های کوالانسی قرار می دهیم

(ب) سختی آن را در مقایسه با الماس و سیلیسیم پیش بینی کنید.




با توجه به آنتالپی پیوند $C-C$ در الماس و $Si-Si$ در سیلیسیم و با توجه به شعاع اتم های کربن و سیلیسیم میتوان استنباط کرد میانگین آنتالپی پیوند $Si-C$ در سیلیسیم کربید عددی بین این دو عدد جدول باشد بنابراین برای سیلیسیم کربید در مقایسه با الماس سختی کمتر و در مقایسه با سیلیسیم سختی بیشتری انتظار می رود

مقایسه سختی : الماس < سیلیسیم کربید < سیلیسیم

پیوند	C-C	Si-Si
میانگین آنتالپی (kJmol ⁻¹)	۳۴۸	۲۲۶


۳- هر یک از شکل های زیر رفتاری از مواد یونی را نشان می دهد. در هر مورد آن رفتار را با دلیل توصیف کنید.

(آ)



مواد یونی در حالت جامد رسانای الکتریسته نیستند، زیرا در شبکه ی یونی کاتیون ها و آنیون هادر جایگاه های ثابتی هستند . اما در حالت مذاب یا محلول کاتیون ها و آنیون ها می توانند آزادانه حرکت کنند و سبب برقراری جریان

(ب)



جامد های یونی در اثر ضربه شکننده هستند ، زیرا به علت ضربه ذرات با بار هم نام در مجاورت یکدیگر قرار میگیرند و در اثر نیروی دافعه بین آن ها شبکه ی یونی شکسته و یا خورد می شود

۴- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیل بنویسید.

(آ) تنوع و شمار مواد مولکولی بیشتر از مواد یونی و آن هم بیشتر از مواد کووالانسی است.

اتم نافلزها به شکل‌های مختلف می‌توانند با یک دیگر پیوند داده مولکول‌های متنوعی را بسازند. در حالی که برای تشکیل ترکیبات یونی تعداد کاتیون‌ها و آنیون‌ها محدودتر است. و اتم‌هایی که قابلیت‌های لازم را برای تشکیل مواد کووالانسی داشته باشند هم بسیار کمتر از دو دسته‌ی اول (مولکولی و یونی) هستند. عناصر اصلی بیشتر ترکیبات کووالانسی شناخته شده کربن و سیلیسیم می‌باشند.

(ب) ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو مواد مولکولی به شمار می‌روند.

از آن‌جا که نیروهای بین مولکولی در مواد مولکول بسیار ضعیف‌تر از نیروی بین یون‌ها در شبکه‌ی یونی و یا پیوند‌های کووالانسی در شبکه‌ی کووالانسی است در دمای اتاق شمار زیادی از مواد مولکولی به حالت مایع هستند. در حالی که دمای ذوب ترکیبات یونی و جامد‌های کووالانسی با توجه به قوی بودن پیوند بین ذرات آنها بالا‌تر از دمای اتاق است (ب) ترتیب واکنش‌پذیری فلزهای پتاسیم، کلسیم و تیتانیم به صورت $K > Ca > Ti$ است.

خصیلت فلزی فلزات دسته‌ی از فلزات دسته هم دوره‌ی خود بیشتر است همچنین در یک دوره از جدول خصیلت فلزی فلزات قلیایی بیشتر از فلزات قلیایی خاکی هم دوره خود است بنا براین با توجه به خصیلت فلزی روند نوشته شده برای مقایسه واکنش‌پذیری صحیح است

(ر) روند خصیلت فلزی را می‌توان با توجه به شعاع و آرایش الکترونی این عناصر توجیه کرد

پتاسیم راحت‌تر یک الکترون از دست داده و به آرایش الکترونی گاز نجیب می‌رسد. در حالی که کلسیم باید دو الکترون از دست بدهد تا به آرایش گاز نجیب برسد. و تیتانیم قابلیت رسیدن به آرایش گاز نجیب را ندارد

۵- سیلیسیم، فسفر و گوگرد از جمله عنصرهای اکسیژن دوست هستند به طوری که در طبیعت به شکل نمک‌های اکسیژن دار یافت می‌شوند. با توجه به ساختار لوویس آنیون‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



(آ) هریک از ساختارهای لوویس را با جفت نقطه‌ها کامل کرده سپس بار الکتریکی هر آنیون را مشخص کنید.

مجموع الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی اطراف اتم‌ها - مجموع الکترون‌های ظرفیت اتم‌ها = بار آنیون

برای سیلیکات $= \{4(6) + 4\} - 32 = -4$

برای فسفات $= \{4(6) + 5\} - 32 = -3$

برای سولفات $= \{4(6) + 6\} - 32 = -2$

(ب) فرمول شیمیایی نمک حاصل از این آنیون‌ها را با یون سدیم سپس یون کلسیم بنویسید.

سدیم	Na_4SiO_4	Na_3PO_4	Na_2SO_4
کلسیم	Ca_2SiO_4	$Ca_3(PO_4)_2$	$CaSO_4$

۶- نقشه‌های پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دی‌متیل‌اتر با جرم مولی نزدیک به هم به صورت زیر است. با توجه به آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.

پروپان



دی‌متیل‌اتر




آ) کدام یک در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند؟ چرا؟
توزیع بار در مولکول پروپان یکنواخت می‌باشد اما در دی‌متیل‌اتر یکنواخت نیست.
بنابراین دی‌پروپان ناقطبی و در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند

ب) توضیح دهید کدام یک در دمای اتاق می‌تواند به حالت مایع باشد؟


دی‌متیل‌اتر به حالت مایع و پروپان در دمای اتاق به حالت گاز می‌باشد. در مورد ترکیبات مولکولی با جرم مولی نزدیک بهم می‌توان گفت نیروی بین مولکولی در مولکول‌های قطبی قوی‌تر از نیروی بین مولکولی بین مولکول‌های ناقطبی است بنابراین دمای جوش آن‌ها بالاتر است

۷- گروهی از دانش‌آموزان همه مواد خالص را به حالت جامد در نظر گرفته و آنها را بر اساس رفتار مطابق نمودار زیر دسته‌بندی کرده‌اند. با پر کردن جاهای خالی، نمونه‌ای برای هر جامد مثال بزنید.



شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر

فصل ۴



● ● ● وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (سورة النجم، آیه ۳۹) ● ● ●
و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره‌ای) نیست.

رشد و پیشرفت هر جامعه تنها در سایه تلاش هدفمند و آگاهانه افراد خبره، کاردان و ورزیده دست‌یافتنی است. در واقع برای بالا رفتن از نردبان پیشرفت، افزون بر انگیزه باید نخست تکیه‌گاه مناسبی برای آن یافت. این تکیه‌گاه دانش، توانایی، مهارت و زیرساخت‌های لازم است. با تأمین این شرایط برای دستیابی به هدفی معین، تلاش و پشتکار شرط کافی خواهد بود. آنچنان که تداوم و خستگی‌ناپذیری در این راه پیامدهایی فراتر از انتظار توأم با کسب افتخار به دنبال خواهد داشت. از جمله پیامدهای رشد و پیشرفت جامعه می‌توان دسترسی آسان و ارزان‌تر به فناوری نورانام برد. بهره‌گیری از مبدل کاتالیستی در خودرو و کود شیمیایی سبز و همچنین تبدیل مواد شیمیایی خام به مواد ارزشمند از جمله فناوری‌هایی به شمار می‌رود که در آنها دانش شیمی همراه با انگیزه و تلاش راهی را به سوی آینده‌ای روشن‌تر رقم می‌زند.

یکی از ویژگی‌های ذاتی انسان، کنجکاوی و پرسشگری اوست. از این‌رو، پیوسته در پی شناخت محیط پیرامون خود است. او همواره برای زندگی و ادامه آن با چالش‌ها و مشکلات گوناگونی روبه‌رو بوده است اما با بهره‌گیری از هوش، خرد و الهام از طبیعت توانسته برای هر پرسش در ذهن خود پاسخی بیابد. انسان همچنین برای حل مسئله در هر زمان و مکان، راهکاری عملی یافته است. هرچند که برخی پاسخ‌های ارائه شده و راهکارهای استفاده شده، ساده و برخی دیگر پیچیده‌اند، اما هر یک از آنها در جای خود نوآورانه و کارآمد بوده‌اند. مجموعه چنین تلاش‌هایی در گذر زمان منجر به تولید و انباشت دانش و فناوری شده است. یکی از آنها، دانش شیمی و فناوری‌های آن است که نقش پررنگی برای گذر از تنگناها و رسیدن به زندگی مدرن امروزی داشته است. شکل ۱ برخی از دستاوردهای مهم شیمی را در این راستا نشان می‌دهد.



فناوری شناسایی و تولید مواد بی‌حس‌کننده و آنتی‌بیوتیک، راه را برای جراحی‌های گوناگون هموار کرد.



فناوری تولید پلاستیک، صنعت پوشاک و صنعت بسته‌بندی (غذا، دارو و ...) را دگرگون ساخت.



فناوری تصفیه آب، مانع گسترش بیماری‌هایی از جمله وبا در جهان شده است.



گسترش فناوری صفحه‌های نمایشگر در وسایل الکترونیک، مدیون دانش شیمی است.



فناوری تولید بنزین به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل‌های کاتالیستی آلودگی ناشی از مصرف آن را کاهش داد.



فناوری‌های شناسایی و تولید کودهای شیمیایی مناسب، نقش چشمگیری در تأمین غذای جمعیت جهان دارد.


شکل ۱- برخی دستاوردهای شیمی در جهان

شواهد تاریخی در گذر زمان نشان می‌دهد که انسان به تدریج با مسائل پیچیده‌تری روبه‌رو شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود که در آینده چالش‌های تازه و حیاتی پیش‌رو داشته باشد. بدیهی است برطرف کردن و حل هر یک از آنها به دانش و فناوری‌های پیشرفته‌تری نیاز خواهد داشت (نمودار ۱).

آیا می دانید

شیمی دان ژاپنی برنده نوبل ۲۰۰۱،
ریوجی نویوری (Ryoji Noyori)
معتقد است:

شیمی آگاهی مورد نیاز برای
دستیابی به توسعه پایدار و حل
مسائلی که زندگی را روی زمین
تهدید می کند، فراهم می کند.



نمودار ۱- چند نمونه فرآورده حاصل از فناوری های شیمیایی در گذر زمان

باتوجه به کارآمدی علوم تجربی، بسیاری بر این باورند که این علوم و از جمله دانش شیمی و فناوری های آن می توانند آینده روشنی را برای جهان رقم بزنند. باید توجه داشت با اینکه استفاده بهینه و درست از دانش و فناوری، آسایش و رفاه را در زندگی تأمین می کند، اما استفاده نادرست از آن، آثار مخرب تر و زیانبارتری به دنبال خواهد داشت. در واقع نوع استفاده از دانش و فناوری دو روی یک سکه هستند. برای نمونه تولید سلاح های شیمیایی استفاده نادرست از دانش و فناوری را نشان می دهد.

در این فصل با سه نمونه از دستاوردهای شیمی برای کاهش آلودگی هوا، افزایش فرآورده های کشاورزی و افزایش بهره وری منابع شیمیایی آشنا خواهید شد.

به دنبال هوای پاک

تماشای آسمان آبی و تنفس در هوای پاک همیشه لذت بخش و شادی آفرین است آنچنان که سعدی، استاد سخن، می فرماید: «هر نفسی که فرو می رود مُمِدِّ حیات است و چون بر می آید مُفَرِّج ذات، ...». افسوس که با رشد دانش و فناوری، گسترش صنایع گوناگون و با رفتارهای نادرست، دسترسی به هوای پاک محدودتر شده است. شاید شما هم لایه قهوه ای روشن که سطح شهرهای بزرگ جهان و کشورمان را به ویژه در زمستان می پوشاند، دیده باشید. هوایی که نه تنها شادی آفرین نیست بلکه نفس کشیدن را دشوار کرده و مشکلات تنفسی ایجاد می کند (شکل ۲).



شکل ۲- یکی از چالش های مهم در جهان امروز داشتن هوای پاک است.

آیا می دانید

هر فرد روزانه به طور میانگین
۱۱۰۰۰ لیتر هوا تنفس می کند.


آیا می دانید

هوای آلوده شامل ترکیبات آلی
اکسیژن دار مانند اتانال است. این
مواد از واکنش هیدروکربن ها با
سایر گازهای موجود در هواکره
تشکیل می شوند.

هوای خشک و پاک مخلوطی از گازهای گوناگون است که به طور یکنواخت در هوا کره پخش شده‌اند. در حالی که هوای آلوده افزون بر آنها حاوی گازهای گوناگونی مانند CO ، NO_2 ، O_3 ، SO_2 ، NO ، ذره‌های معلق و مواد آلی فرار است. به دلیل وجود این آلاینده‌ها، هوای آلوده بوی بدی دارد، چهره شهر را زشت می‌کند، فرسودگی ساختمان‌ها و پوسیدگی خودروها را سرعت می‌بخشد و سبب ایجاد و تشدید بیماری‌های تنفسی از جمله برونشیت، آسم، سرطان ریه و حتی مرگ می‌شود.

خود را بیازمایید


۱- نمودار زیر غلظت برخی از این آلاینده‌ها را در نمونه‌ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد.



آ) مقدار این آلاینده‌ها بین چه ساعت‌هایی از شبانه‌روز به بیشترین حد خود می‌رسد؟ *اول صبح تا ۲ بعد از ظهر*

ب) چرا هوای آلوده به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود؟ *وجود NO_2*

پ) چرا با کاهش مقدار گاز NO_2 ، مقدار گاز O_3 ، رو به افزایش است؟ *$\text{NO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_3 + \text{NO}$ به سمت راست این واکنش*



آ) پیدایش گازهای کربن مونوکسید، گوگرد دی اکسید و نیتروژن مونوکسید را با نوشتن معادله شیمیایی موازنه شده توجیه کنید.

ب) دلیل وجود هیدروکربن‌ها در گازهای خروجی از اگزوز را توضیح دهید. *نبرد C_xH_y کافی، بخشی از سوخت (بنزین...) به صورت خام از موتور خودرو وارد می‌شود و مشتق هیدروکربن‌ها در بنزین وجود دارد. ج. آن‌ها از موتور قبل از سوختن به سمت موتور وارد می‌شوند.*

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان مقدار این آلاینده‌ها را در هوا کره کاهش داد یا آنها را حذف کرد؟ آشنایی با واکنش‌های شیمیایی و رفتار آلاینده‌ها، انرژی فعال سازی و نقش کاتالیزگر در واکنش‌های شیمیایی می‌تواند ما را در حل این مسئله یاری کند.

$$? \text{ ton} = 100 \times 1.6 \times \frac{50 \text{ km}}{\text{خودرو}} \times \frac{(5.99 + 1.67 + 1.04) \text{ g}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ ton}}{1000 \text{ g}} = 4.35 \times 10^{-4} \text{ ton}$$

آلاینده‌های نامرئی تغییر CO و NO_2 و SO_2 قرار دارند و در هوا می‌مانند. توسط کاتالیزگر در خروجی اگزوز خودروها NO به NO_2 و CO به CO_2 تبدیل می‌شود. همچنین در واکنش‌های شیمیایی SO_2 به SO_3 و به عبور از ابرها به CaSO_3 یا CaSO_4 به کربنات تبدیل می‌شود. NO_2 و SO_2 در هوا کره در نهایت با آب به اسید تبدیل می‌شود. HNO_3 و H_2SO_4 تشکیل باران اسیدی می‌دهند.

فرمول شیمیایی آلاینده	مقدار آلاینده به ازای طی یک کیلومتر (گرم)
CO	۵/۹۹
C_xH_y	۱/۶۷
NO	۱/۰۴

• حساب کنید روزانه چند تن آلاینده وارد هوا کره می‌شود؟ (فرض کنید روزانه صد میلیون خودرو در جهان به طور میانگین ۵۰ کیلومتر مسافت می‌پیمایند. پایین صفحه)



● دمای موتور خودروها بیشتر از 1000°C است.


انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی

در شیمی ۲ آموختید که واکنش های شیمیایی با سرعت های گوناگون انجام می شوند. برای نمونه واکنش زنگ زدن آهن کند، در حالی که واکنش سوختن متان، تند است. به راحتی چرا سرعت واکنش های شیمیایی با هم تفاوت دارند؟ همچنین می دانید که افزایش دما سبب افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شود؛ برای نمونه گاز نیتروژن با گاز اکسیژن در دمای اتاق واکنش نمی دهد اما درون موتور خودرو اندکی از آنها به نیتروژن مونوکسید تبدیل می شود. آیا می دانید چرا این واکنش در دمای اتاق انجام نمی شود؟



● هنگامی که نوک کبریت روی سطح زیر قوطی کبریت کشیده شود، گرما تولید می شود. این گرما انرژی فعال سازی واکنش شیمیایی انجام شده را تأمین می کند.

هر واکنش برای انجام شدن به حداقلی از انرژی نیاز دارد. در واقع برای اینکه یک واکنش شیمیایی آغاز شود باید واکنش دهنده ها مقدار معینی انرژی داشته باشند. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید شخصی می خواهد گلوله ای را از نقطه A به نقطه B منتقل کند (شکل ۳).



شکل ۳- عبور از سد انرژی برای جابه جایی گلوله


برای این منظور، او دست کم باید انرژی لازم برای رساندن گلوله به بالای قله را تأمین کند؛ زیرا از آن به بعد گلوله بر اثر نیروی گرانش روی سطح شیب دار به پایین سرازیر می شود. بدیهی است هر چه ارتفاع قله کمتر باشد، انتقال گلوله آسان تر و سریع تر انجام می شود (چرا؟). در واکنش های شیمیایی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. به طوری که برای آغاز هر واکنش شیمیایی نیز مقدار معینی از انرژی لازم است که به آن انرژی فعال سازی^۱ واکنش می گویند.

حرکت انرژی چگال شده و چگال گیر
برای شروع نیاز به یک حداقل
انرژی به نام انرژی فعال سازی
دارد. این انرژی صرف است
کردن پیوندها در مواد واکنش
دهنده می شود، انرژی فعال
سازی با سرعت واکنش رابطه
وارونه دارد.

یکی از روش‌های تأمین این انرژی، گرما دادن به واکنش‌دهنده‌ها است. جالب اینکه واکنش‌های شیمیایی صرف‌نظر از اینکه گرماده یا گرماگیر باشند، برای آغاز شدن به انرژی نیاز دارند؛ برای نمونه به واکنش سوختن متان (گاز شهری) در اجاق گاز توجه کنید.



هر چند این واکنش گرماده است اما برای آغاز شدن به جرقه یا شعله نیاز دارد. در واقع جرقه یا شعله فندک و کبریت، انرژی فعال‌سازی واکنش را تأمین می‌کند (نمودار ۲).



نمودار ۲- نمودار انرژی-پیشرفت واکنش سوختن متان

این نمودار نشان می‌دهد که واکنش‌دهنده‌ها برای آغاز واکنش باید حداقلی از انرژی را داشته باشند تا با عبور از سد انرژی به فراورده‌ها تبدیل شوند. فراورده‌هایی که در این واکنش پایدارتر از واکنش‌دهنده‌ها هستند. به دیگر سخن اگر انرژی فعال‌سازی این واکنش تأمین نشود، واکنش‌دهنده‌ها دست نخورده باقی می‌مانند.


بدیهی است که هرچه انرژی فعال‌سازی واکنشی بیشتر باشد، سرعت آن کمتر است. در نتیجه واکنش در شرایط دشوارتر و دمای بالاتری انجام می‌شود زیرا بزرگ بودن E_a نشان می‌دهد که واکنش‌دهنده‌ها برای عبور از این سد به انرژی بیشتری نیاز دارند. از این رو با افزایش دما، انرژی واکنش‌دهنده‌ها بیشتر می‌شود. به طوری که شمار ذره‌هایی که در واحد زمان می‌توانند به فراورده‌ها تبدیل شوند، افزایش یافته و در نتیجه سرعت واکنش افزایش می‌یابد. این توصیف کمک می‌کند تا بتوان با مقایسه E_a واکنش‌ها، درباره سرعت و شرایط آغاز آنها اظهار نظر کرد.

بسته به میزان انرژی فعال‌سازی لازم در یک واکنش، این انرژی را با تابش، جرقه، ضربه یا تغییر دما می‌توان گرما می‌ندان می‌کرد.



اگر مجموع آنتالپی پیوندها در مواد واکنش دهنده، از مجموع آنتالپی پیوندها در مواد واکنش پذیرنده بیشتر باشد، ΔH واکنش مثبت و غیر انرژی پذیرنده و سطح آنتالپی فراورده از واکنش دهنده را نمودار بالاتر قرار گرفته، واکنش گرماگیر است.

خود را بیازماید


با توجه به نمودارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.




نمودار انرژی واکنش
گرما دهنده




نمودار انرژی واکنش
گرما گیر




در واکنش گرماده سطح انرژی واکنش پذیرنده از واکنش دهنده پایین تر قرار گرفته و واکنش گرماگیر سطح انرژی واکنش پذیرنده از واکنش دهنده بالاتر قرار گرفته و واکنش گرماگیر سطح انرژی واکنش پذیرنده بالاتر قرار گرفته و واکنش گرماگیر سطح انرژی واکنش پذیرنده بالاتر قرار گرفته.



(۳) گرما دهنده



(۲) گرما گیر




(۱) گرما دهنده


کاتالیزگرها در واکنش شرکت می کنند؛ اما در پایان واکنش مصرف نشده باقی می ماند. از این رو، می توان آنها را بارها و بارها به کار برد. همچنین استفاده از کاتالیزگرها در صنایع گوناگون، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود. چرا؟

آ) گرما دهنده یا گرما گیر بودن هر یک از واکنش ها را مشخص کنید. پاسخ خود را توضیح دهید.

ب) کدام واکنش در شرایط یکسان سریع تر انجام می شود؟ چرا؟ (۳) E_a گرماگیر دارد
پ) فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد. با توجه به این واقعیت کدام نمودار به کدام واکنش مربوط است؟ چرا؟ (۲) انرژی فعال سازی لازم برای واکنش فسفر سفید با اکسیژن هوا، به حدی کم است که در دمای محیط تا بین می آید. لذا فسفر را زیر آب



(۲)






(۱)

آیا می دانید

در بدن انسان مجموعه ای از واکنش های پیچیده انجام می شود. همه این واکنش ها باید با سرعت های کنترل شده و دقیقی انجام شوند تا انسان رازنده نگهدارند. آنزیم ها برای کنترل این واکنش ها نقش حیاتی دارند. بیشتر آنزیم ها پروتئین هایی با مولکول های بزرگ هستند. هر واکنشی که در بدن انسان انجام می شود، آنزیم ویژه ای به آن سرعت می بخشد. نکته جالب این است که برخی آنزیم ها تنها تولید یک ماده خاص در یک واکنش ویژه را کنترل می کنند.

برخی واکنش ها در صنعت فقط در دما و فشار بالا انجام می شوند و تولید فراورده ها در آنها صرفه اقتصادی ندارد (چرا؟). از این رو شیمی دان ها در پی یافتن شرایط بهینه (دما و فشار پایین تر) برای انجام چنین واکنش هایی هستند. به نظر شما چگونه می توان واکنش هایی از این دست که انرژی فعال سازی زیادی دارند را در دما و فشار پایین با سرعت مناسب انجام داد؟ بدون تردید پاسخ شما، یافتن راهی برای کاهش انرژی فعال سازی است که با استفاده از کاتالیزگر امکان پذیر است. ماده ای که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می دهد، در حالی که خودش در پایان واکنش باقی می ماند. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟


* در نمودار تغییرات انرژی - پیشرفت واکنش، اختلاف انرژی واکنش دهنده ها تا نوک قله E_a و اختلاف سطح انرژی واکنش دهنده با فراورده ΔH واکنش است. اگر E_a خیلی بزرگ باشد، انجام واکنش به دمای بسیار بالایی نیاز دارد. بنابراین این دما مستلزم صرف انرژی زیاد است، و برای این انرژی هزینه زیادی باید صرف شود لذا اگر دما و هزینه اقتصادی ندارد.



در جاده توری پلاتینی به دن جرقه سده در سته

با جرقه بنفش سته این قندط صدها سال دست خنجره میاب

با هم بیندیشیم




• کاتالیزگر را می توان به تونلی در یک جاده کوهستانی تشبیه کرد. تونل با کوتاه کردن مسیر حرکت سبب می شود که مسافران زودتر به مقصد برسند، کاتالیزگر نیز با تغییر مسیر واکنش، انرژی فعال سازی را کاهش داده و سبب می شود واکنش دهنده ها سریع تر به فرآورده ها تبدیل شوند.

۱- جدول زیر برخی داده ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون نشان می دهد، با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

شرایط آزمایش	دما (°C)	سرعت واکنش	آنتالپی واکنش (kJ)
بدون حضور کاتالیزگر	۲۵	ناچیز	-۵۷۲
ایجاد جرقه در مخلوط	۲۵	انفجاری	-۵۷۲
در حضور پودر روی	۲۵	سریع	-۵۷۲
در حضور توری پلاتینی	۲۵	انفجاری	-۵۷۲

آ) توضیح دهید چرا این واکنش در دمای اتاق بدون حضور کاتالیزگر انجام نمی شود؟ در دمای اتاق
 ب) نقش جرقه در انجام واکنش چیست؟ E_a تأمین انرژی فعال سازی
 پ) نقش پودر روی و توری پلاتینی در این واکنش چیست؟ کاهش E_a و تسهیل کاتالیزگر
 ت) کدام کمیت برای این واکنش در هر شرایطی ثابت می ماند؟ ΔH یا گرمای آزاد شده در واکنش

۲- هر یک از نمودارها را به کدام شرایط واکنش می توان نسبت داد؟ توضیح دهید.





کاتالیزگرها در نمودار تغییر انرژی
 نوک قله را پایین آورده، تفاوت
 سطح انرژی واکنش دهنده و نوک
 قله یعنی E_a را کوچکتر کرده سبب
 افزایش سرعت واکنش و انجام
 واکنش در دمای پایین تر می شود
 ولی سطح انرژی واکنش دهنده
 و فرآورده را تغییر نمی دهند پس
 به مقدار عددی ΔH واکنش یا تغییر
 گرمایی یا گرمایی واکنش با اثرند
 ماته تبدیلی که میان قله راه می شود

۳- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت داده شده را کامل کنید.

کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با افزایش E_a واکنش را تسهیل می کند
 کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با کاهش E_a واکنش را تسهیل می کند
 می دهد، اما آنتالپی واکنش ثابت می ماند
 افزایش می یابد

میرا بخام واکنش به دن کاتالیزگر



آیا می دانید


گازهای خروجی از اگزوز تنها ۰/۴ ثانیه در تماس با کاتالیزگرهای مبدل کاتالیستی هستند.

پی بردید که انرژی فعال سازی واکنش را می توان با استفاده از گرما تأمین کرد یا با استفاده از کاتالیزگر کاهش داده تا واکنش ها را با سرعت دلخواه انجام داد. اینک زمان آن رسیده است که در نقش یک شیمی دان یا مهندس شیمی با تکیه بر دانش شیمی خود، راهکارهایی برای کاهش یا حذف آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها ارائه کنید. نکته شایان توجه این است که این آلاینده ها در کسری از ثانیه از موتور خودرو خارج و وارد هوا کره می شوند. همچنین دمای آنها در این زمان بسیار کوتاه به سرعت کاهش می یابد.


پس باید در زمان کوتاهی که هنوز دما بالا است و هنوز آلاینده ها از اگزوز خارج نشده اند واکنش تبدیل $NO \rightleftharpoons N_2$ و $CO \rightleftharpoons CO_2$ و $C_xH_y \rightleftharpoons CO_2$ و H_2O را به یک گام نه گزینش انجام دهیم.

با هم ببیندیشیم


۱- برای حذف آلاینده های موجود در اگزوز خودروها (CO و NO ، C_xH_y) قطعه ای را در مسیر خروج گازها قرار می دهند. با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید.




آ) هر آلاینده پس از عبور از قطعه A به چه فراورده ای تبدیل می شود؟
 ب) معادله شیمیایی حذف هر یک از آلاینده ها را بنویسید و موازنه کنید.



۲- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.



آ) چرا این واکنش ها در دماهای پایین انجام نمی شوند یا بسیار کند هستند؟
 ب) انرژی فعال سازی و آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید.



۳- جدول زیر مقدار این آلاینده‌ها را در حضور و غیاب قطعه A نشان می‌دهد. با توجه به آن پیش‌بینی کنید نقش این قطعه چیست؟ *دارای کاتالیزگر است. برای حذف آلاینده‌ها*


NO	C _x H _y	CO	فرمول شیمیایی آلاینده	
۱/۰۴	۱/۶۷	۵/۹۹	در غیاب قطعه A	مقدار آلاینده بر حسب گرم به ازای طی یک کیلومتر
۰/۰۴	۰/۰۷	۰/۶۱	در حضور قطعه A	

پ) تجربه نشان می‌دهد که کارایی قطعه A به نوع کاتالیزگرهای موجود در آن بستگی دارد. این قطعه محتوی سه نوع کاتالیزگر است. با این توصیف کدام عبارت زیر درست است؟ چرا؟
 آ) هر کاتالیزگر می‌تواند به همه واکنش‌ها سرعت ببخشد. *X*

ب) هر کاتالیزگر به شمار محدودی واکنش سرعت می‌بخشد. *✓*
هر کاتالیزگر به طور اختصاصی واکنش‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و در صورت نیاز به سرعت بیشتر به هم می‌زنند.

دریافتید که در مسیر گازهای خروجی از خودروها قطعه‌ای قرار می‌دهند که می‌تواند باعث حذف یا کاهش آلاینده‌ها شود. مبدل کاتالیستی^۱ نامی است که به آن نسبت می‌دهند. بر روی سطح این قطعه سرامیکی که به شکل توری به کار می‌رود، فلزهای رودیم (Rh)، پالادیم (Pd) و پلاتین (Pt) نشانده شده است. برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه)های ریز درمی‌آورند و کاتالیزگرها را روی سطح آن می‌نشانند (چرا؟) (شکل ۴).

افزایش سطح تماس



آیا می‌دانید

برای صنعت خودرو سازی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود $1/3 \times 10^5 \text{ kg Pd}$ ، $1/2 \times 10^5 \text{ kg Pt}$ و $2/6 \times 10^4 \text{ kg Rh}$ مصرف شده است.

شکل ۴- در سطح سرامیک‌ها درون مبدل کاتالیستی، توده‌های فلزی با قطر ۲ تا ۱۰ نانومتر وجود دارند

با اینکه مبدل کاتالیستی برای مدت طولانی کار می‌کند اما پس از مدت معینی کارایی آن کاهش می‌یابد و دیگر قابل استفاده نیست.

در میان تارنماها

با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی درباره اینکه «سوخت مناسب برای خودروهای مجهز به مبدل کاتالیستی، بنزین بدون سرب است» اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

۱- Catalytic Converter

کاتالیزورها انتخاب عمل می‌کنند، یعنی هر کاتالیزگر قادر است واکنش‌هایی خاص را افزایش دهد. همچنین کاتالیزورها نسبت به مواد شیمیایی و دما حساس هستند. لذا در انتخاب کاتالیزگر برای مبدل کاتالیستی باید به کاتالیزگری انتخاب کرد که حذف یا کاهش همه آلاینده‌ها NO، CO و C_xH_y را تحت تاثیر قرار دهد و در دمای بالا کاتالیزگر خود را حفظ کند.

خود را بیازمایید

۱- با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام روشن و

گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای CO ، NO ، C_xH_y بیشتری مشاهده می شود. *در روزهای سرد، EAC لازم فراموش نمی شود. می توان سیستم گرمایش را از روز قبل از روشن کردن موتور از طریق لایم فراگرفت.*


(آ) دلیل این پدیده را توضیح دهید.

ب) چه راهکاری برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می کنید؟

۲- درباره درستی جمله های زیر گفت و گو کنید.


- کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می کند. *هر کاتالیزگر خاص دانش یا دانش های خاص را تحت تاثیر قرار می دهد. یک کاتالیزگر نمی تواند همه دانش ها را سرعت بدهد.*
- در حضور کاتالیزگر نباید واکنش های ناخواسته دیگری انجام شود. *کاتالیزگر به سرعت انتخابی، دانش مورد نظر را تسهیل می کند و سایر واکنش های ناخواسته را کند می کند.*
- کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد. *کاتالیزگر به سرعت در دمای بالا و در حلقه های مختلف نقش کاتالیزگری خود را حفظ کند و خاصیت خود را از دست ندهد و بتواند از آن برای مدت طولانی استفاده کرد.*

پی بردید که با استفاده از مبدل کاتالیستی می توان از ورود آلاینده های تولید شده در خودروهای بنزینی به هوا کره جلوگیری کرد. اما بررسی ها نشان می دهد که با استفاده از این نوع مبدل ها نمی توان گازهای NO و NO_2 خروجی از خودروهای دیزلی را به گاز نیتروژن تبدیل کرد. بنابراین ضروری است برای حل این مسئله، مبدلی نو طراحی کرد. پژوهشگران و مهندسان برای خودروهای دیزلی مبدلی به شکل ۵ طراحی کرده اند.



شکل ۵- مبدل کاتالیستی در خودروهای دیزلی

در این مبدل با ورود آمونیاک و انجام واکنش زیر، گازهای NO و NO_2 به گاز N_2 تبدیل شده و تا حدود زیادی از ورود گازهای NO و NO_2 به هوا کره جلوگیری می شود.




در مبدل کاتالیستی برای خودروهای دیزلی حجمی ۸۵ و ۵۰ درصد مصرف شده است. اگر ۲۰ لیتر گاز N_2 با چگالی ۱٫۲۵ تولید شود، چقدر گرم آنرا در مصرف و خرد می توان تولید شده و چقدر بیش از ۸۵ با چگالی ۱٫۴۵ و چقدر ۸۵ مصرف شده است؟

تفکر نقادانه

می‌دانید که افزایش کربن دی‌اکسید سبب ایجاد اثر گلخانه‌ای و بالا رفتن دمای کره زمین شده است. در نتیجه یخ‌های قطبی در حال آب شدن هستند. این مسئله سبب خواهد شد تا رفت و آمد کشتی‌ها و همچنین حفاری در اعماق اقیانوس قطب شمال و استخراج سوخت‌های فسیلی آن منطقه آسان‌تر شود. بر این اساس عده‌ای معتقدند که نیازی به کنترل کربن دی‌اکسید هوا کره نیست. این دیدگاه را در کلاس نقد کنید.

اثر زیان‌بار و زیست محیطی آن به مراتب بیشتر از عواید اقله‌ای ناشی از آن است. یخ‌های قطب شمال و جنوب معجزه‌ای است در پایداری بزرگ نقش‌های در اعتدال دمای کره زمین و ادامه حیات جانوران ایفا می‌کنند.

* دانش‌آموزی برای دانش‌گوشته پر $aA \rightarrow bB$ که یک طرف در بسته به تعادل پیوسته، مدل زیر را ارائه می‌دهد، مقدار عددی K ثابت تعادل تنها نیز این پیشرفت واکنش را می‌پیماید، از روی آن قضاوت راجع به صحت خطا.



- ① مقدار عددی K که در این واکنش در تعادل است، چون هنگام تعادل قسمت کمی از واکنش دهنده به فراآورده تبدیل شده است، تعادل بر فراآورده می‌گردد.
- ② مقدار عددی K که در این واکنش در تعادل است، چون در تعادل مقدار زیادی از واکنش دهنده به فراآورده تبدیل شده و تعادل بر فراآورده می‌گردد.
- ③ مقدار عددی K که در این واکنش در تعادل است، چون در تعادل مقدار کمی از واکنش دهنده به فراآورده تبدیل شده و تعادل بر واکنش دهنده می‌گردد.
- ④ مقدار عددی K که در این واکنش در تعادل است، چون در تعادل مقدار کمی از واکنش دهنده به فراآورده تبدیل شده و تعادل بر واکنش دهنده می‌گردد.

نتیجه: واکنش سریع است که $K = K'$ و اگر واکنش در تعادل باشد، $K = K'$ و اگر واکنش در تعادل باشد، $K = K'$ و اگر واکنش در تعادل باشد، $K = K'$.

$$K \propto \frac{\text{غلظت فراآورده}}{\text{غلظت واکنش دهنده}}$$

آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی


آیا می‌دانید

برای تأمین غذا افزون بر کودهای شیمیایی مناسب، دانش و فناوری‌های دیگری از جمله شناسایی و تولید مواد شیمیایی برای کنترل آفت‌ها، به‌کارگیری دانش شیمی خاک، فراوری فراورده‌های کشاورزی و ... نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. برای نمونه تنظیم pH خاک در رشد گیاه مؤثر است.

نام گیاه	گستره pH مناسب برای رشد
گندم	۶/۸ - ۷/۵
جو	۵/۷ - ۷/۵
ذرت	۵/۷ - ۶/۸
یونجه	۶/۸ - ۷/۵

می‌دانید که غذا به‌عنوان محور رشد و سلامتی، یکی از ضرورت‌های زندگی برای ادامه آن به‌شمار می‌رود. اما محدودیت منابع و روند رو به افزایش جمعیت سبب شده تا تأمین غذا به یکی دیگر از چالش‌های زندگی تبدیل شود. بهترین راه‌حل برای این مسئله، افزایش بهره‌وری در تولید فراورده‌های کشاورزی است. در این راستا شناسایی، تولید و افزودن کودهای شیمیایی مناسب به خاک راهگشا خواهد بود.

گیاهان با جوی سرشار از گاز نیتروژن احاطه شده‌اند اما نمی‌توانند این عنصر ضروری برای رشد خود را به‌طور مستقیم از هوا جذب کنند. از این‌رو باید نیتروژن را به شکل ترکیب‌های نیتروژن‌دار از جمله آمونیاک و اوره به خاک افزود (شکل ۶).



- گیاهان برای رشد افزون بر کربن دی‌اکسید و آب به عنصرهایی مانند S، N، P، K و ... نیاز دارند.


شکل ۶- در برخی کشورها برای افزایش بازده فراورده‌های کشاورزی، آمونیاک مایع را به‌عنوان کود شیمیایی به‌طور مستقیم به خاک تزریق می‌کنند.



از شیمی ۱ به یاد دارید که در دمای اتاق، واکنش میان گازهای نیتروژن و هیدروژن حتی در حضور کاتالیزگر یا جرقه پیش نمی‌رود (چرا؟). از سوی دیگر این واکنش، برگشت‌پذیر است و می‌تواند در شرایط مناسب به تعادل برسد. تعادلی که در دمای معین، مخلوطی از گازهای واکنش‌دهنده و فراورده با غلظت ثابت است.


خود را بیازمایید

با توجه به معادله واکنش تعادلی تولید گاز آمونیاک و عبارت ثابت تعادل آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



$$K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$$

آ) توضیح دهید چگونه می‌توان از روی معادله یک واکنش، عبارت ثابت تعادل را برای آن نوشت؟
ب) جدول صفحه بعد غلظت تعادلی گونه‌ها را در دمای معینی برای این واکنش نشان




پیش‌زمینه: H_2 و N_2 در دمای اتاق به‌خوبی با هم واکنش نمی‌دهند. اما در دمای بالا و تحت فشار، واکنش زیر به تعادل می‌رسد:
$$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$$

* هر چه مقدار عددی K برای یک واکنش تعادلی عدد بزرگتری باشد به این معنی است که مقدار نر با نترسی از واکنش دهنده ها به فرآورده تبدیل شده اند و پس سال نه به تعادل رسیده است. ممکن است این اتفاق در زمان کوتاهی و به علت زیاد و زیاد شدن طولانی و به علت کم صورت گرفته باشد، پس K میزان پیشرفت واکنش را تا برقراری تعادل مشخص کننده بودن ذکر زمان و مقدار گذشتن در مورد سرعت یا مقایسه سرعت دو واکنش و واکنش از روی مقدار عددی K آن واکنش ها حفظ فرمایید است. مدل منم ۱۰۰

می دهد. با محاسبه K، مشخص کنید میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است یا زیاد؟ چرا؟ چون مقدار عددی K در این دما عدد کوچکی است. پس واکنش به میزان کمی از چپ به راست پیش می رفته

$[NH_3]$	$[H_2]$	$[N_2]$	K
۰/۰۲	۰/۵	۰/۴	$K = \frac{(0.02)^2}{(0.5)^2(0.4)} = 8 \times 10^{-3}$


تولید فرآورده بیشتر در شرایط معین، به میزان پیشرفت واکنش در آن شرایط بستگی دارد. به دیگر سخن هر چه میزان پیشرفت واکنش بیشتر باشد، درصد بیشتری از واکنش دهنده ها به فرآورده ها تبدیل می شوند. از این رو شیمی دان ها به دنبال یافتن شرایطی هستند که در آن، واکنش دهنده ها تا حد ممکن به فرآورده ها تبدیل شده باشند. فریتس هابر برای یافتن چنین شرایطی، این واکنش را بارها و بارها در شرایط گوناگون انجام داد و سرانجام موفق شد شرایط بهینه واکنش را بیابد.



به راستی او بر چه اساسی واکنش را در این شرایط طراحی کرد؟ چگونه میزان پیشرفت واکنش تعادلی را با تغییر شرایط افزایش داد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها باید درباره واکنش های تعادلی بیشتر بیاموزید.

با هم ببیندیشیم

در محفظه ای به حجم یک لیتر، تعادل زیر در دمای $200^\circ C$ برقرار است.





شکل زیر افزودن مقداری نیتروژن را به این سامانه در دمای ثابت نشان می دهد. با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید.

سرعت یک واکنش میزان پیشرفت آن واکنش را در واحد زمان نشان می دهد. E را به واسطه انرژی در نظر بگیرید.

K ثابت تعادل یک واکنش میزان پیشرفت آن واکنش را در طول واکنش در دمای معینی می باشد.

$$K = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$



افزایش N_2 طبق اصل لوشاتلیه سامانه تعادلی تولید NH_3 را در جهت مفروض پیش می راند. N_2 اضافه شده پیش می برد، یعنی در اینجا از چپ به راست (در جهت رفت) در نتیجه از تعداد مول H_2 ۶ شده ۵ و به تعداد مول NH_3 اضافه می شود و K ثابت می ماند چون دما ثابت است.

۱۰۲

اصل لوشاتلیه: طبق این اصل هرگاه یک سامانه تعادلی (واکنش برگشت پذیر) در یک طرف رفته در دمای معین سرعت رفت و برگشت آن مساوی شده است (تغییری اعمال کنیم سامانه در جهت جابجایی شود تا تعادل را برقرار نگه داریم) اثر آن تغییر را از بین برده و تعادل جدیدی برقرار کند، و جابجایی را ثابت باشد K بدون تغییر میماند.

۱- جدول زیر را کامل کنید.

کمیت	$[NH_3]$	$[H_2]$	$[N_2]$	K
تعادل				
۱	۰.۱۴	۰.۵۰	۰.۰۷	۲.۲۴
۲	۰.۱۶	۰.۴۷	۰.۱۱	۲.۲۴

- ۲- غلظت کدام مواد در تعادل (۲) در مقایسه با تعادل (۱) افزایش یافته است؟ NH_3 و N_2
- ۳- با افزودن $N_2(g)$ به تعادل (۱) واکنش در چه جهتی پیش رفته است تا به تعادل جدید برسد؟ چرا؟ **چپ به راست در جهت مصرف بخشی از N_2 اضافه شده**
- ۴- K در این آزمایش چه تغییری کرده است؟ از این ویژگی چه نتیجه ای می گیرید؟ **بدون تغییر K با تغییر غلظت تغییر نمی کند. به شرط آنکه دما ثابت باشد.**
- ۵- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.


هنگامی که در دمای ثابت، غلظت یکی از مواد شرکت کننده در سامانه تعادلی **کاهش** یابد، واکنش در جهت **تولید** آن تا حد امکان پیش می رود تا به تعادل **آغازی** جدید برسد.

پی بردید که واکنش تعادلی با افزایش غلظت یکی از مواد شرکت کننده در دمای ثابت، در جهتی پیش می رود که تا حد امکان مقداری از آن را مصرف کند و به تعادل جدید برسد اما در این جابه جایی، K ثابت می ماند.

بدیهی است که با **کاهش غلظت** هر ماده شرکت کننده، واکنش تا حد امکان در جهت تولید آن ماده پیش خواهد رفت. این ویژگی نشان می دهد که اگر تغییری سبب به هم خوردن یک سامانه تعادلی شود، تعادل در جهتی جابه جا می شود که تا حد امکان اثر آن تغییر را جبران کند. این توصیف، بیانی از **اصل لوشاتلیه** است.



خود را بیازمایید

واکنش تعادلی زیر در سامانه ای با حجم و دمای ثابت برقرار است. با هر یک از تغییرهای زیر تعادل در چه جهتی جابه جا می شود؟ چرا؟



- (رفت)
- آ) خارج کردن مقداری گاز آمونیاک از سامانه **در جهت تولید NH_3 از چپ به راست**
- ب) وارد کردن مقداری گاز هیدروژن در سامانه **در جهت مصرف H_2 از چپ به راست**
- و اما صد بار با گاز H_2 مصرف کنند. و اما این تغییر را به واکنش از بین می برد. (برگشت)

۱- Le Chatelier's Principle



تغییر غلظت: اگر غلظت یکی از اجزاء سامانه تعادلی را کم کنیم، واکنش در جهت تولید آن در جهت غلظت گونه ای را افزایش دهیم سامانه تعادلی در جهت مصرف آن جابجا می شود. (کم یا زیاد کردن ماده حاصل یا مایع تعادل را جابجا نمی کند)

تغییر فشار یا حجم: افزایش فشار یا کاهش حجم سامانه های تعادلی را به طرف تولید تعداد مول گاز کمتر جابجا می کند، و کاهش فشار یا افزایش حجم یا کاهش فشار را به طرف تولید تعداد مول گاز بیشتر جابجا می کند.

تغییر دما: اگر دما را افزایش دهیم سامانه تعادلی در جهت مصرف واکنش یعنی انجام واکنش گرمایش میبرد و اگر دما را کاهش دهیم سامانه تعادلی در جهت تولید گرمای جابجا می شود. اگر واکنش گرماگیر باشد با افزایش دما K نیز افزایش می دهد و اگر واکنش گرماگیر باشد با افزایش دما K کاهش می دهد.

تغییر دما: اگر دما را افزایش دهیم سامانه تعادلی در جهت تولید گرمای جابجا می شود. اگر واکنش گرماگیر باشد با افزایش دما K نیز افزایش می دهد و اگر واکنش گرماگیر باشد با افزایش دما K کاهش می دهد.

* خلطت مواد مملول (aq) یا (sol)

چون مواد حل شده، فضای مملول

را اشغال می کنند برای می خلطت

یا مولاریته آن ها کافی است

مول جسم حل شده را به حجم مملول

بر حسب لیتر تقسیم کنیم. لذا افزودن

آب به نقطه مملول سبب افزایش حجم

مملول و کاهش خلطت جسم حل شده


میشود.

$$\text{تعداد مول جسم حل شده} = \frac{\text{تعداد مول}}{\text{لیتر مملول}}$$


تغییر حجم سامانه در تعادل های گازی

با اثر تغییر غلظت یکی از مواد شرکت کننده بر تعادل گازی در دمای ثابت آشنا شدید. دریافتید که در دما و حجم ثابت با افزایش شمار مول های یکی از مواد شرکت کننده، غلظت آن افزایش می یابد و مطابق اصل لوشاتلیه واکنش تعادلی تا حد امکان در جهت مصرف آن جابه جا می شود.

برای تغییر غلظت مواد شرکت کننده می توان از روش دیگری نیز بهره برد. روشی که در آن حجم سامانه در دمای ثابت تغییر می کند. برای نمونه اگر تعادل:




در سیلندری مجهز به پیستون روان (شکل ۷-آ) برقرار باشد، با افزایش فشار بر روی پیستون می توان حجم چنین سامانه ای را در دمای ثابت کاهش داد (شکل ۷-ب).



شکل ۷- کاهش حجم سامانه تعادلی در دمای ثابت

افزایش فشار (افزودن گاز بیشتر به جبهه)

یافته های تجربی نشان می دهد که کاهش حجم این سامانه سبب می شود تعادل در جهت رفت جابه جا شود، به طوری که در تعادل جدید (شکل ۸-پ) شمار مول های آمونیاک افزایش یافته و شمار مول های نیتروژن و هیدروژن کاهش می یابد اما ثابت تعادل تغییری نمی کند (شکل ۸).



شکل ۸- برقراری تعادل جدید برای کاهش اثر فشار

این جابه جایی نشان می دهد که کاهش حجم سامانه گازی در دمای ثابت، تعادل را در جهت مول های گازی کمتر جابه جا می کند.

* خلطت مواد گازی (g)

لذا آنجا که جسم گازی شکل فضای

حجم ظرفی را که در آن قرار گرفته است

مکیند، لذا برای می خلطت مول

بر لیتر گاز کافی است تعداد مول

گاز درون ظرف را به حجم آن ظرف

بر حسب لیتر تقسیم کنیم.

پس برای مواد گازی افزایش

فشار یا کاهش حجم به معنی

افزایش خلطت است و عکس

کاهش فشار یا افزایش حجم

به معنی کاهش خلطت است.

$$\text{تعداد مول گاز} = \frac{\text{تعداد مول}}{\text{حجم ظرف بر حسب لیتر}}$$

هر عددی در [] قرار گرفت

باید دارای یکای mol.L^{-1} باشد

- (I) برای گاز کاهش حجم به معنی افزایش فشار و افزایش خلطت است.
- (II) برای گاز افزایش حجم به معنی کاهش فشار و کاهش خلطت است.
- (III) برای گاز افزایش مول گاز در حجم ثابت سبب افزایش خلطت می شود.

خود را بیازمایید

۱- اگر در سامانه (آ) شکل ۷، پیستون بیرون کشیده شود تا در دمای ثابت حجم آن افزایش



یابد:


(آ) پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابه جا می شود؟ چرا؟ **بیشتر سمت چپ یا برگشت**
(ب) با این تغییر، شمار مول های آمونیاک چه تغییری می کند؟ **کاهش می یابد**

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که در دمای ثابت، فشار بر یک تعادل گازی ^{افزایش} ~~کاهش~~ می یابد، واکنش در جهت

شمار مول های گازی ^{کمتر} ~~بیشتر~~ پیش می رود تا به تعادل ^{جدید} ~~اولیه~~ برسد.

۳- پیش بینی کنید در دمای ثابت با افزایش فشار بر سامانه تعادلی زیر:



(آ) شمار مول های هر یک از مواد شرکت کننده چه تغییری می کند؟ چرا؟ **بدون تغییر چون مول گاز**

(ب) غلظت مولی هر یک از مواد شرکت کننده چه تغییری می کند؟ چرا؟ **چپ در راست برابر است**

افزایش بر مایه بر مایه (جسم ظرف = غلظت مایه گاز) و افزایش فشار به سبب کاهش حجم می شود.

پی بردید که کاهش حجم یک سامانه محتوی تعادل گازی یا افزایش فشار بر این سامانه در دمای ثابت سبب می شود که تعادل در جهت شمار مول های گازی کمتر جابه جا شود زیرا هر چه شمار مول های گاز موجود در یک سامانه کمتر باشد، شمار برخورد مولکول ها به دیواره ها کمتر و در نتیجه فشار گاز کمتر خواهد شد. بدیهی است که افزایش فشار بر یک واکنش تعادلی با شمار مول های گازی برابر در دو سوی معادله واکنش، تأثیری بر جابه جایی تعادل نخواهد داشت.

دما، عاملی برای جابه جایی تعادل و تغییر K

با رفتار تعادل گازی در برابر تغییر غلظت مواد شرکت کننده و تغییر فشار وارد بر سامانه در دمای ثابت آشنا شدید، رفتاری که با اصل لوشاتلیه توجیه می شود.

عامل دیگری که افزون بر جابه جا کردن تعادل، توانایی تغییر K را نیز دارد، دماست. در واقع هنگامی که دمای یک سامانه محتوی تعادل گازی تغییر می کند، پس از رسیدن به تعادل جدید افزون بر تغییر غلظت مواد شرکت کننده، K نیز تغییر خواهد کرد.

جالب اینکه اثر تغییر دما بر تعادل های گوناگون، یکسان نیست و به گرماده یا گرماگیر بودن آنها بستگی دارد.

افزایش دما، سامانه های تفارقی را در جهت انجام واکنش گرماگیر (منفی Q) کاهش دما، سامانه تفارقی را در جهت انجام واکنش گرماگیر (مثبت Q) جابه جا می کند. رطوبتی که واکنش گرماگیر باشد (مثلاً $2H_2O \rightleftharpoons 2H_2 + O_2$) با افزایش دما مقدار عددی K ثابت تعادل واکنش نه برتری شود و برعکس...

با هم بیندیشیم

۱- جدول داده شده اثر دما را بر ثابت تعادل زیر نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.



دما (°C)	۲۵	۲۲۵	۴۳۵
K	$2/5 \times 10^{-25}$	4×10^{-11}	4×10^{-5}

$$K = \frac{[\text{SO}_3]^2 [\text{O}_2]}{[\text{SO}_2]^2}$$

(آ) عبارت ثابت تعادل را برای آن بنویسید.

(ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟ 4×10^{-5} چون مقدار K بزرگتر است.


(پ) با افزایش دما K چه تغییری کرده است؟ این تغییر، جابه جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می دهد؟ **افزایش دما یافته در جهت رفت یا چپ است و نسبت غلظت فرآورده ها به واکنش ها کمتر می شود.**

(ت) اگر برای این واکنش $\Delta H > 0$ باشد، جابه جا شدن تعادل و افزایش K را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنید. **افزایش دما سامانه را در جهت انجام واکنش گرماگیر معرفی می کند و در این جهت پیش برده است و K بزرگتر می شود.**

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.


هنگامی که دمای یک سامانه تعادلی افزایش می یابد، واکنش در جهت **مصرف** گرما پیش می رود، اگر این واکنش گرماگیر باشد مقدار **فرآورده ها** واکنش دهنده ها کاهش می یابد.

۳- نمودار زیر درصد مولی آمونیاک را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.



* با افزایش دما این سامانه تعادلی در جهت مصرف گرما، از راست به چپ (برگشت) جابه جا شده و مقدار عددی K و درصد مولی NH_3 کاهش می یابد.

* در سامانه های تعادلی Q یا گرما اغلب سمت مول "کمزحمتراست".



شرایط بهینه برای تولید آمونیاک بیشتر

۱) افزایش دما به جهت غلظت N_2 و H_2 و کاهش

تدریجی غلظت NH_3 از طریق سرد کردن مخلوط واکنش و با وجود NH_3 مایع.

۲) کاهش دما تا حدود 450°C و استفاده

از کاتالیز مناسب (Fe) و افزایش

فشار تا حدود 150 atm تا کاهش سرعت

در اثر کاهش دما را جبران کند. با این وجود

درصد تولید آمونیاک حدود ۲۸٪ است و سامانه

چون تداوم آن هرگز واکنش

رهنده به طور کامل مصرف

نمی شود.

آ) با افزایش دما درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می کند؟ *کمتر شود*
 ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ *گرماده، چون با افزایش دما مقدار NH_3 کم شده پس از آن به جابجایی پس ۹ سمت راست و واکنش بوده است.*
 پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای ۲۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس به صورت زیر است.

$$K_1 = 6/2 \times 10^{-4} \quad K_2 = 0/65 \quad K_3 = 6/0 \times 10^{-5}$$

کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می دهد؟ توضیح دهید. *۲۵°C چون واکنش گرماگیر است پس با افزایش دما K کمتر شود.*
۴۰۰°C چون واکنش در جهت معکوس ۹ یعنی برگشت به جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.


آیا می دانید

ساخت تجهیزات لازم برای تولید آمونیاک به روش هابر مدیون مهندسی کارل بوش است. او کسی بود که مهندسی تجهیزات تولید آمونیاک را گسترش داد. از این رو، گاهی از فرایند هابر به عنوان فرایند هابر-بوش نام برده می شود.



فریتس هابر شیمی دان مشهور آلمانی و همکارش کارل بوش برای تلاش در تهیه آمونیاک از واکنش گازهای نیتروژن و هیدروژن، جایزه نوبل دریافت کردند.

تاکنون آموختید که با تغییر غلظت، فشار و دما می توان سامانه های تعادلی را در جهت دلخواه جابه جا کرد. فریتس هابر نیز انتظار داشت که با تغییر این عوامل بتواند مقدار آمونیاک را در مخلوط تعادلی افزایش دهد. او می دانست که با افزایش دما و تأمین انرژی فعال سازی، سرعت واکنش افزایش خواهد یافت. از این رو واکنش را در دماهای بالاتر بررسی کرد. دماهایی که در آنها واکنش با سرعت چشمگیری انجام می شد، اما با پیشرفت کمی به تعادل می رسید به طوری که سامانه محتوی مخلوطی از هر سه گاز بود. جالب اینکه او هر چه دما را بالاتر می برد، درصد مولی آمونیاک در مخلوط کاهش می یافت (چرا؟). هابر دریافت که افزایش دما نمی تواند برای تولید آمونیاک بیشتر ثمربخش باشد. او با استفاده از کاتالیزگر توانست واکنش را در دماهای پایین تر با سرعت مناسب انجام دهد، هر چند که هنوز هم درصد مولی آمونیاک در مخلوط مطلوب نبود. او برای رفع این مشکل، از افزایش فشار بر سامانه بهره برد (نمودار ۳).



نمودار ۳- در دمای ثابت، با افزایش فشار درصد مولی آمونیاک در سامانه افزایش می یابد.

به این ترتیب هابر توانست شرایط بهینه برای تولید آمونیاک را بیابد. شرایطی که در آن، تنها ۲۸ درصد مولی مخلوط را آمونیاک تشکیل می دهد. در پایان برای جداسازی آمونیاک از مخلوط واکنش، از تفاوت آشکار در نقطه جوش آمونیاک با دو گاز دیگر استفاده کرد.

افزایش دما در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.
افزایش فشار در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.
افزایش دما در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.
افزایش فشار در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.
افزایش دما در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.
افزایش فشار در جهت معکوس ۹ جابجایی پس ۹ سمت راست NH_3 کم می شود.

ارزش فناوری‌های شیمیایی


آیا می‌دانید



● با وجود کشف منابع شیمیایی گوناگون، نفت هنوز مؤثرترین و مهم‌ترین ماده برای اقتصاد جهان است. بر همین اساس دانشمندان کشورهای گوناگون در جست‌وجوی منابع جدید این ماده شگفت‌انگیز حتی در شمالگان و جنوبگان هستند.




نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و معادن مس، آهن، طلا، مرمر و فیروزه از جمله منابع شیمیایی ارزشمندی هستند که به‌طور یکسان در جهان توزیع نشده‌اند. به‌همین دلیل برخی کشورها صادرکننده این منابع و برخی دیگر واردکننده آنها هستند. در واقع برخی کشورهای دنیا با کسب درآمد از فروش منابع خود زمینه آسایش، رشد و توسعه را فراهم می‌کنند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از کشورها منابع طبیعی خود را کم و بیش بدون فراوری و به همان صورتی که از طبیعت به‌دست می‌آید، به فروش می‌رسانند. فرایندی که به خام‌فروشی منابع معروف است. روش دیگر این است که به کمک فناوری‌های شیمیایی مواد خام و اولیه را به فرآورده‌های دیگر تبدیل کرد تا بتوان به قیمت بالاتری به فروش رساند. برای نمونه فروش نفت خام ساده‌ترین راه بهره‌برداری از این منبع طبیعی است و راه دیگر آن، پالایش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های پتروشیمیایی مانند آمونیاک، سولفوریک اسید، متانول، بنزین و... است. خام‌فروشی برای منابع معدنی مانند سنگ معدن آهن، مس، روی و حتی منابع کشاورزی مانند پنبه نیز صادق است. برای نمونه قیمت یک تن مس خالص در بازارهای جهانی به هزاران برابر قیمت یک تن سنگ معدن مس می‌رسد. این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که دانش و فناوری استخراج و خالص‌سازی تا چه اندازه ارزشمند است (شکل ۹).



شکل ۹- مس، از سنگ معدن تا فلز (مس سرچشمه کرمان)

در شیمی ۲ با درصد خلوص مواد شیمیایی آشنا شدید، کمیتی که بر روی قیمت تمام‌شده آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. هر چه درصد خلوص ماده شیمیایی بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. برای نمونه قیمت فلز مس با خلوص ۹۹/۹ درصد نسبت به فلز مس با خلوص ۹۶ درصد به‌طور چشمگیری بیشتر است. به‌همین دلیل فناوری‌های جداسازی و خالص‌سازی مواد یکی از فناوری‌های پیشرفته، گران، پرکاربرد و در عین حال کارآفرین و درآمدزا به‌شمار می‌رود.



خود را بیازمایید

با توجه به شکل زیر که قیمت تقریبی نفت خام و چند فراورده نفتی را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید.



ریال $1L = 10000$



ریال $159L = 2940000$



ریال $1Kg = 60000$



ریال $1L = 405000$



ریال $1ton = 2940000$



ریال $1L = 60000$

آ) جدول زیر را کامل کنید.

نام ماده	نفت خام	بنزین	متانول	اتیلن گلیکول	پلی اتن	اتانول
قیمت ۱۵۹ لیتر یا کیلوگرم (ریال)	۲.۹۴۰.۰۰۰	۱۵۹.۰۰۰	۲.۹۴۰.۰۰۰	۲.۹۴۰.۰۰۰	۲.۹۴۰.۰۰۰	۲.۹۴۰.۰۰۰

ب) درباره جمله زیر گفت‌وگو کنید.

«به کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره‌وری

اقتصاد یک کشور می‌شود.» به تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور می‌توان برادارایی بسیاری از صنایع را در داخل همان کشور تولید را از بیابانی از هزینه‌های واردات و حمل و نقل و ... هزینه‌های مورد تحقیق فناوری تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور به علت افزایش اشتغال‌زایی و عدم وابستگی به دیگر کشورها هم می‌تواند فناوری را می‌توان به کار بردن دانش برای حل یک مسئله در صنعت یا زندگی روزانه

برای رسیدن به هدفی خاص دانست. فناوری ارتباطات، کشاورزی، غذایی، نظامی، دارویی، الکترونیکی و آموزشی از جمله فناوری‌هایی هستند که بشر امروزی از آنها برای حل مسائل خود بهره می‌برد. فناوری همواره با ساخت یا استفاده از یک وسیله همراه است. برای نمونه دانشمندان و مهندسان با استفاده از دانش مواد و دانش الکتریسته و مغناطیس، وسایلی

● مواد خام و اولیه، موادی مانند نمک، سنگ معدن، نفت خام و هوا هستند که فراوری نشده‌اند و با استفاده از آنها می‌توان مواد شیمیایی جدید تولید کرد.

مانند تلفن و رایانه همراه و بی‌سیم طراحی و تولید می‌کنند، وسایلی که مشکل برقراری ارتباط را برطرف می‌سازند. شیمی‌دان‌ها نیز با استفاده از دانش شیمی، مواد جدیدی می‌سازند یا روشی برای ساخت آسان‌تر و با صرفه‌تر آنها ارائه می‌کنند. آنها همچنین به دنبال یافتن روش، طراحی و ساخت دستگاه‌هایی برای شناسایی دقیق ساختار مواد هستند. هریک از این موارد بیانی از فناوری شیمیایی است (شکل ۱۰).




در این درس به بررسی فناوری ساخت مواد شیمیایی جدید خواهیم پرداخت. اینکه شیمی‌دان‌ها چگونه و با چه روشی یک ماده شیمیایی را می‌سازند؟ بر چه اساسی مواد اولیه را انتخاب می‌کنند؟

گروه عاملی، کلید سنتز مولکول‌های آلی

● سنتز یک فرایند شیمیایی هدفمند است که در آن با استفاده از مواد ساده‌تر، مواد شیمیایی دیگر را تولید می‌کنند.

یکی از لذت‌بخش‌ترین فناوری‌های شیمیایی، سنتز مواد نو از جمله رنگ‌دانه‌ها، خوشبوکننده‌ها، داروهای ضدسرطان، الیاف، سوخت‌های دوستدار محیط زیست و مواد هوشمند است. در واقع سنتز را می‌توان کانون بسیاری از پژوهش‌های شیمیایی دانست که منجر به طراحی و تولید مواد جدید می‌شود.

می‌دانید که اغلب مواد آلی شامل گروه‌های عاملی گوناگون هستند. گروه‌هایی که خواص و رفتار مواد آلی را تعیین می‌کنند. تولید یک ماده آلی جدید می‌تواند با تغییر ساختار یا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه باشد. شیمی‌دان‌ها به کمک دانش مربوط به ساختار و رفتار گروه‌های عاملی و دانستن شرایط و عوامل مؤثر بر انجام واکنش‌های شیمیایی از مواد خام یا اولیه در دسترس، ماده‌ای نو برای کاربردی معین سنتز می‌کنند. در این فرایندها، شیمی‌دان‌ها با استفاده از مواد شیمیایی گوناگون، گروه‌های عاملی موجود در یک ماده آلی را تغییر داده و به گروه عاملی دیگر تبدیل می‌کنند. برای نمونه در شیمی ۲ آموختید که برای سنتز یک استر می‌توان از واکنش یک اسید آلی با یک الکل در شرایط مناسب بهره برد.



هیدروکربن‌های سیر نشده:

هیدروکربن‌هایی که در ساختار خود

پیونده سیر نشده $C=C$ ماده


اتن و یا سیر نشده $C\equiv C$

دارند ماده اتین، این هیدروکربن


از نظر بیایی فعال و واکنش پذیر هستند.

خود را بیازمایید

در نمودار زیر جاهای خالی را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.




اینک می‌پذیرید که می‌توان از گاز اتن مواد آلی گوناگون پرمصرف و ارزشمند تهیه کرد. این گاز یکی از مهم‌ترین خوراک‌ها در صنایع پتروشیمی است. به همین ترتیب با استفاده از مواد مناسب و واکنش‌های شیمیایی می‌توان مواد آلی گوناگون را به یکدیگر تبدیل کرد (نمودار ۴).



بدیهی است هرچه نوع و تعداد گروه‌های عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد، ساخت آن دشوارتر بوده و به دانش پیشرفته‌تر و فناوری کارآمدتری نیاز دارد. توجه داشته باشید که بازده واکنش، هزینه مواد و انرژی مصرف شده برای تولید ماده هدف به نوع واکنش و فناوری به کاررفته بستگی دارد. از این رو شیمی‌دان‌ها در پی یافتن مواد مناسب، ارزان و دوستدار محیط زیست، همچنین واکنش‌های شیمیایی آسان و پربازده هستند تا هزینه تمام شده تولید یا سنتز را کاهش دهند. در گام بعد دانش مهندسی برای تولید صنعتی آن ماده، فناوری لازم را طراحی و اجرا می‌کند.

آیا می‌دانید

سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد بطری پلاستیکی در سرتا سر جهان برای تأمین، نگهداری و بسته‌بندی آب و نوشیدنی‌های گازدار تولید می‌شود.




ساخت بطری آب

سالانه شمار بسیار زیادی بطری پلاستیکی برای نگهداری و بسته‌بندی آب آشامیدنی تولید می‌شود. بطری آب از پلیمری به نام پلی اتیلن ترفتالات (PET) ساخته می‌شود. برای ساخت این بطری، نخست پلیمر آن را تهیه می‌کنند. سپس این پلیمر را به همراه برخی افزودنی‌ها در قالب‌های ویژه‌ای می‌ریزند تا به شکل بطری مورد نظر درآید.

خود را بیازمایید

فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آیا می‌دانید

تریلن نام تجاری و قدیمی پلی اتیلن ترفتالات است. این نام از مونومرهای این پلیمر، ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول گرفته شده است. البته نام تجاری امروزی این پلیمر، پت است.



PET


۱- Poly Ethylene Terphetalate



۱-۲- اتیلن گلیکول
۳- بنزویک اسید (ترفتالیک اسید)
۴- بنزویک اسید

۱-۲- اتیلن گلیکول
۳- بنزویک اسید (ترفتالیک اسید)
۴- بنزویک اسید

با توجه به آنچه که آموخته‌اید برای سنتز این پلیمر چه پیشنهادی دارید؟ پاسخ شما درست است، از واکنش مونومرهای سازنده این پلیمر یعنی اتیلن گلیکول (الکل دوعاملی) با ترفتالیک اسید (اسید دوعاملی) در شرایط مناسب می‌توان پلی اتیلن ترفتالات را سنتز کرد. شکل ۱۱، الگوی تشکیل این ماده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱- الگوی تولید PET

اما مسئله این است که اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید در نفت خام وجود ندارند. به دیگر سخن، به طور مستقیم نمی‌توان آنها را از نفت خام به دست آورد. پس چه باید کرد؟ در اینجا، با بهره‌گیری از دانش شیمی می‌توان این مواد را با استفاده از مواد خام و اولیه که از نفت خام جداسازی می‌شوند، سنتز کرد.

اکنون باید در نقش یک شیمی‌دان، مواد اولیه و در دسترس را بررسی و براساس آموخته‌های خود، مواد مناسب برای سنتز ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول را انتخاب کرد. سپس مواد اولیه انتخاب شده را در شرایط مناسب واکنش داده و به ماده مورد نظر تبدیل نمود.




آیا می‌دانید

یکی از مراحل مهم در تهیه یک ماده، جداسازی و خالص‌سازی آن است. واکنش پارازایلن با پتاسیم پرمنگنات در محیط بازی را در نظر بگیرید. پس از انجام واکنش مخلوطی به دست می‌آید که شامل، پتاسیم پرمنگنات اضافی، منگنز (IV) اکسید، آب، پارازایلن و واکنش نداده، ترفتالیک اسید و مواد دیگر است. اکنون باید با استفاده از دانش شیمی، ترفتالیک اسید (فرآورده مورد نظر) را از مخلوط واکنش جداسازی کرد. بدیهی است درصد خلوص ترفتالیک اسید به دانش و فناوری به کار رفته بستگی دارد.



با هم بیندیشیم

۱- بررسی‌ها نشان می‌دهند که از تقطیر نفت خام می‌توان مواد زیر را به دست آورد.



افزودن $\text{H}-\text{OH}$ به پیوندهای $\text{C}=\text{C}$ در آئین‌ها در حقیقت، آب‌افزودن نامیب (HBrO₄) تریه الکل KMnO_4 الکل آرام آلوده به آلوده (اگر OH الکل نیز بخیر) یا به تندن (اگر OH نیز بخیر) نبسته تبدیل می‌شود. ضایع آلوده به آلوده نیز به ترفتالیک اسید تبدیل می‌شود.


آیا می دانید

در یک واکنش شیمیایی فرآورده‌هایی ایجاد می‌شوند که دلخواه ما نیستند و پسماند واکنش محسوب می‌شوند. این پسماندها، گاهی سمی و آلاینده بوده و برای محیط زیست زیان آورند. بر همین اساس شیمی‌دان‌های دوستدار محیط زیست رشته‌ای دانشگاهی به نام شیمی سبز با راهکارهای زیر راه‌اندازی کرده‌اند.



شیمی سبز با طراحی مواد و فرایندهای شیمیایی مناسب سبب حذف یا کاهش مواد زیان‌آور و سمی و حرکت در مسیر توسعه پایدار می‌شود. توسعه پایدار به معنی بهره‌برداری هوشمندانه و مناسب از منابع برای تأمین نیازهای امروز بدون تحمیل هزینه به آیندگان تعریف می‌شود.

با بررسی فرمول‌های ساختاری زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.




آ) برای تهیه تریتالیک اسید از پاراازایلن، چه تغییری باید در ساختار پاراازایلن ایجاد کرد؟
دور کردن متیل CH3 به گروه عاملی کربوکسیل -COOH تبدیل شود.

ب) عدد اکسایش اتم‌های کربن ستاره دار را در این دو ترکیب تعیین کنید. -3 و $+3$ در $-COOH$ و $-CH3$.
 پ) با توجه به آموخته‌های خود درباره واکنش‌های اکسایش - کاهش، برای تبدیل پاراازایلن به تریتالیک اسید کدام دسته از مواد زیر را مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید. *کربن با برآز است. دارن ۶۴ شش به آلاینده فرد.*

○ کاهنده‌ها


○ اکسنده‌ها

۲- پتاسیم پرمنگنات اکسنده‌ای است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب پاراازایلن را با بازده نسبتاً خوب به تریتالیک اسید تبدیل می‌کند.




آ) در این واکنش یون پرمنگنات به منگنز (IV) اکسید تبدیل می‌شود. تغییر عدد اکسایش اتم منگنز در این واکنش چند است؟ (عدد اکسایش اتم منگنز در یون پرمنگنات برابر با $+7$ است).

ب) انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟




نیاز به یون با گرما و انرژی در واکنش بیشتر گرفته است. در درجه بالا به یون در واکنش متغیر - ذره - پارا است. پس می‌تواند E با لایه آن لب را در پی بردید که یون پرمنگنات گونه‌ای اکسنده است و سبب اکسایش گونه‌های دیگر می‌شود.

با وجود غلظت بالای آن، باز هم شرایط تبدیل پاراازایلن به تریتالیک اسید تأمین نمی‌شود. مگر آنکه دمای مخلوط واکنش افزایش یابد. با افزایش دما اگرچه شرایط انجام واکنش تأمین شده است اما بازده همچنان مطلوب نیست. همه اینها نشان می‌دهد که اکسایش پاراازایلن به تریتالیک اسید دشوار است. از این رو شیمی‌دان‌ها در پی یافتن شرایطی آسان‌تر برای انجام این واکنش با بازده بالا هستند. آنها با پژوهش‌های فراوان دریافته‌اند که استفاده از اکسیژن هوا و کاتالیزگرهای مناسب می‌تواند راهگشا باشد. البته پژوهش‌ها برای یافتن واکنشی پربازده و باصرفه اقتصادی همچنان ادامه دارد.




برای تعیین عدد اکسایش پیوندها را به یون فرض کرده و اکسید دین می‌کنیم. به اتم تا کمتر از اکسید دین شده که بیشتر منتقل می‌شود.




تاکنون تهیه یکی از واکنش دهنده‌های مورد نیاز برای سنتز پلیمر به کار رفته در بطری آب را فرا گرفتید. هرچند انجام این واکنش در مقیاس صنعتی بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از آن چیزی است که روی کاغذ نوشته می‌شود.

اینک دومین واکنش دهنده (اتیلن گلیکول) را باید تهیه کرد. برای سنتز اتیلن گلیکول، باید گاز اتن را با یک ماده شیمیایی مناسب و مؤثر واکنش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گاز اتن در اثر واکنش با محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات در شرایط مناسب به اتیلن گلیکول تبدیل می‌شود.



اکنون می‌توان با انجام واکنش اتیلن گلیکول با ترفتالیک اسید (مونومرهای سازنده پلیمر) پلی اتیلن ترفتالات را سنتز کرد (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- فرایند کلی سنتز PET

این پلیمر همانند پلیمرهای سنتزی ماندگاری زیادی دارد و در طبیعت به کندی تجزیه می‌شود. به همین دلیل پسماند آنها تهدیدی جدی برای زندگی روی کره زمین به شمار می‌آید. بنابراین ضروری است بازیافت پلاستیک‌ها را به‌طور دقیق بررسی کنیم تا با نقش فناوری شیمیایی در بازیافت آنها آشنا شویم.

در میان تارنماها

در شیمی ۲ با پلیمرهای سبز که زیست تخریب پذیرند آشنا شدید. با مراجعه به منابع علمی معتبر، گزارشی از این پلیمرها در مقایسه با پلیمرهای حاصل از مواد نفتی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی تهیه و در کلاس ارائه کنید.

بازیافت PET

آیا می دانید


سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد کیلوگرم پلاستیک وارد اقیانوس‌های می‌شوند. این مواد افزون بر ماده پلیمری شامل مواد شیمیایی گوناگونی نیز مانند نرم‌کننده‌ها، رنگ‌دانه‌ها و پایدارکننده هستند که برای جانداران مضرند و سامانه عصبی آنها را مختل می‌کنند.



سالانه تعداد زیادی از جانوران دریایی در دام پلاستیک‌ها می‌افتند و می‌میرند.



پلاستیک‌ها را می‌توان یکی از نتایج خلاقیت و نوآوری بشر دانست. این مواد به دلیل ویژگی‌هایی مانند چگالی کم، نفوذناپذیری نسبت به هوا و آب، ارزان بودن و مقاومت در برابر خوردگی، کاربردهای وسیعی در زندگی پیدا کرده‌اند؛ به طوری که امروزه سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن از این مواد در جهان تولید می‌شود و این روند روبه افزایش است (نمودار ۵).




نمودار ۵- روند تولید پلاستیک از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ میلادی

استفاده بی‌رویه و بیش از حد این مواد در صنایع گوناگون به همراه زیست تخریب‌ناپذیری آنها سبب شده که در جای جای کره زمین یافت شوند. از این رو بازیافت آنها اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مواد پلاستیکی قابل بازیافت، پلی اتیلن ترفتالات است. برای این منظور، باید آنها را جداگانه جمع‌آوری و سپس با انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به مواد قابل استفاده تبدیل کرد.


یکی از راه‌های بازیافت این است که آنها را پس از شست‌وشو و تمیز کردن، ذوب کرده و دوباره از آنها برای تولید وسایل و ابزار دیگر استفاده می‌کنند.

البته پس از شست‌وشو مواد پلاستیکی می‌توان آنها را خرد کرده و به تکه‌های کوچک به نام پُرک تبدیل و در تولید مواد پلاستیکی دیگر استفاده کرد. اما راه دیگری نیز وجود دارد که در آن این پسماندها را به مونومرهای سازنده یا مواد اولیه مفید و ارزشمند تبدیل می‌کنند. باید توجه داشت که سطح فناوری هر کشور یا گروه صنعتی است که تعیین می‌کند کدام راه را باید انتخاب کرد. زیرا برگرداندن پسماندها به مونومرهای سازنده کاری پس دشوار است. از آنجا که سالانه حجم انبوهی از پسماندهای این پلیمر تولید می‌شود، بازیافت شیمیایی آن بسیار ضروری و ارزشمند است. در شیمی ۲ آموختید که پلی استرها قابل تبدیل به مونومرهای سازنده هستند. شیمی‌دان‌ها با بررسی‌های فراوان پی بردند که PET نیز در شرایط مناسب با متانول واکنش می‌دهد و به مواد مفیدی تبدیل می‌شود. موادی که می‌توان آنها را برای تولید پلیمرها به کار برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالانه به مقدار زیادی متانول در مقیاس صنعتی نیاز است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان در مقیاس صنعتی متانول تولید کرد؟

متانول مایعی بی‌رنگ، بسیار سمی و ساده‌ترین عضو خانواده الکل‌ها است که می‌توان آن را از چوب تهیه کرد. از آنجا که این الکل کاربردهای زیادی در صنایع گوناگون دارد باید آن را در مقیاس صنعتی تولید کرد. در صنعت گاز کربن مونوکسید را با گاز هیدروژن در شرایط مناسب و در حضور کاتالیزگر واکنش می‌دهند. معادله شیمیایی این واکنش به صورت زیر است:



مواد واکنش‌دهنده برای این واکنش در دسترس نیستند از این رو نخست باید آنها را تولید و سپس به متانول تبدیل کرد. برای تهیه گازهای کربن مونوکسید و هیدروژن می‌توان از واکنش گاز متان با بخار آب در حضور کاتالیزگر بهره برد.



گاز متان سازنده اصلی گاز طبیعی است که در میدان‌های نفتی به فراوانی یافت می‌شود. در این میدان‌ها برای افزایش ایمنی، بخشی قابل توجهی از آن را می‌سوزانند. گاز متان واکنش‌پذیری بسیار کمی دارد (چرا؟) و تبدیل آن به متانول فرایندی دشوار است که انجام

آیا می‌دانید

فقط ۱۸ درصد پلاستیک‌های تولیدشده در جهان بازیافت می‌شود!!!



● صنعت بازیافت به یکی از کلیدی‌ترین صنایع در قرن آینده تبدیل خواهد شد. بدیهی است هر کشوری که از دانش و فناوری پیشرفته‌تری برخوردار باشد سهم قابل توجهی از این بازار جهانی را به خود اختصاص خواهد داد.


آیا می‌دانید

سالانه حدود ۷۰ میلیون تن متانول در سرتاسر دنیا تولید می‌شود. از متانول برای تولید فرمالدهید، استیک اسید، سوخت و ... استفاده می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی ایران نیز سالانه مقدار قابل توجهی متانول تولید می‌کنند، به‌طوری که کشور ایران به یکی از صادرکنندگان متانول تبدیل شده است.

۱۱۸

× با ۲۵۰۰ تن ۶٪ متان که ۸۰ درصد آن ضایعات دارد. ضایعات متانول می‌تواند تهیه در این مخزن به ۵۰۰ kg کربن مونوآکسید معروف می‌شود (بازده ۵۰ درصدی واکنش ۱۸ است)

آن به دانش و فناوری پیشرفته نیازمند است. به دلیل اهمیت متانول در صنایع گوناگون از یک سو و ارزان بودن گاز متان از سوی دیگر، پژوهش‌های شیمیایی زیادی در حال انجام است تا بتوان روشی برای تبدیل گاز متان به متانول پیدا کرد (نمودار ۶).



نمودار ۶- روش‌های تولید متانول. تولید مستقیم متانول از متان چه مزیتی دارد؟


آب مصرف نمی‌شود، انرژی کمتری نیاز دارد. انرژی کمتری مصرف می‌شود.

آیا می‌دانید


سالانه ۱۴۰ میلیارد متر مکعب گاز متان در میدان‌های نفتی در سرتاسر دنیا سوزانده می‌شود.



۱- در هر یک از واکنش‌های زیر مشخص کنید کدام گونه اکسایش و کدام کاهش یافته است؟



۲- شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش‌هایی با کمترین آسیب به محیط زیست و بیشترین بازده است. معادله‌های شیمیایی موازنه نشده زیر تهیه ماده A را به دو روش نشان می‌دهد.



در این واکنش‌ها X و Y پسماند هستند، اما Z یک حلال صنعتی است.


آ) در کدام واکنش، همه اتم‌های مواد واکنش‌دهنده، به مواد ارزشمند تبدیل شده‌اند؟

چرا؟ ii) چون هر دو فرآورده قابل استفاده هستند. و ماده A محصول ناخالص است.

ب) بر اساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟

ii) چون تمام اتم‌های واکنش‌دهنده به فرآورده سودمند تبدیل شده‌اند. و پسماندی تولید نشده که به محیط زیست آسیب بزند.

• یک واکنش شیمیایی هنگامی از دیدگاه اتمی به صرفه‌تر است که شمار بیشتری از اتم‌های واکنش‌دهنده به فرآورده‌های سودمند تبدیل شود.



تمرین های دوره ای

۱- برای هر یک از جمله های زیر دلیلی بنویسید. استفاده از کاتالیزگر در واکنش در دما پایین تر می شود. استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می شود. واکنش ها که در دما پایین تر می شود.


(ب) در تعادل های گازی گرماگیر با افزایش دما در فشار ثابت، K افزایش می یابد. چون واکنش طبق اصل لوشاتلیه در جهت معکوس گرماگیر است. هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن دار از یک هیدروکربن تولید می شود، واکنش اکسایش - کاهش است.

چون ضمن تشکیل پیوندهای C-H و C-O، عدد اکسایش کربن بزرگتر شده و لذا با مقدار اکسیدان و کاهش دهنده بزرگتری مواجه می شود.

۲- در کدام سامانه تعادلی زیر، کاهش حجم سامانه در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده ها می شود؟ توضیح دهید.

کاهش حجم یا افزایش فشار طبق اصل لوشاتلیه برای کاهش فشار به سمت مول گاز کمتر
جای می شود. در اینجا واکنش ۱ را از چپ به راست در جهت فشار آورده بیشتر پیش می رود.
افزایش فشار واکنش ۲ را از راست به چپ در جهت حجم کمتر آورده جای می گیرد.
افزایش فشار واکنش ۳ به اثر است چون مول گاز چپ و راست برابر است.

۳- شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گاز بی رنگ N_2O_4 به گاز قهوه ای رنگ NO_2 را با گذشت زمان در دمای ثابت نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.



(آ) آیا واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید. بی - پس از مدتی رنگ ثابت شده یعنی غلظت NO_2 به سه برابر غلظت N_2O_4 رسیده است. واکنش دهنده و فرآورده به نسبت ۱:۲ ثابت شده اند.

(ب) اگر حجم سامانه ۲ لیتر و هر ذره هم ارز با ۰.۱ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را در این دما حساب کنید.



$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

$$K = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$$

$$K = \frac{[2 \times 0.1]^2}{[0.1 \times 0.1]} = 1.39 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\begin{cases} [NO_2] = \frac{2 \times 0.1 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ [N_2O_4] = \frac{0.1 \times 0.1 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{cases}$$


۴- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی هر واکنش را روی نمودار مشخص کنید.

ب) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟ **واکنش (۱) یا (۲)؟** **چون به انرژی فعال‌سازی بیشتری نیاز دارد.** **سرعت واکنش (۲) به انرژی فعال‌سازی کمتری نیاز دارد.**


۵- با توجه به ساختار ترکیب‌های آلی زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) عدد اکسایش هر یک از اتم‌های کربن ستاره‌دار را تعیین کنید.

ب) در تبدیل ترکیب (۲) به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش کدام اتم ستاره‌دار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید. **کربن کمره‌شکل با ۰** **بهینه رده عدد اکسایش آن بزرگ‌ترین مقدار از -۳ به +۳ افزایش می‌یابد.**

پ) روش تهیه یک دی‌استر از مواد (۱) و (۲) را با نوشتن معادله‌های شیمیایی موازنه شده نشان دهید.



واژه‌نامه

الکتروود	Electrode	۴	میله یا تیغه‌ای که رسانای جریان برق است.
آنتالپی شبکه	Lattice energy	۵۵	به مقدار انرژی آزاد شده در فشار ثابت به هنگام تشکیل یک مول جامد یونی از یون‌های گازی سازنده آن گفته می‌شود.
برقکافت (الکترولیز)	Electrolysis	۴	تجزیه یک ماده به کمک جریان برق در حالت محلول یا مذاب.
پیوند کووالانسی ناقطبی	Non - polar covalent bond	۷۰	نوعی پیوند کووالانسی است که در آن الکترون‌های پیوندی تقریباً به طور یکنواخت روی اتم‌های درگیر در پیوند توزیع شده‌اند.
پیوند یونی	Ionic bond	۵۳	به نیروی جاذبه الکتروستاتیکی موجود میان یون‌های با بار الکتریکی مخالف پیوند یونی می‌گویند.
ترکیب یونی دوتایی	Binary ionic compound	۵۷	ترکیبی است که از یون دو عنصر مختلف تشکیل شده است.
ترکیب یونی	Ionic compound	۵۴	یک ترکیب شیمیایی است که یون‌های مثبت و منفی، ذره‌های سازنده آنها هستند. در این ترکیب‌ها هیچ واحد مولکولی مشخصی وجود ندارد.
ترکیب مولکولی	Molecular compound	۶۷	ترکیبی که از مولکول‌های جدا از هم تشکیل شده است.
جامد کووالانسی	Covalent solid	۹۵	ماده جامدی است که در آن همه اتم‌های سازنده با پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصل شده است و در مجموع شبکه‌ای دو یا سه بعدی ایجاد می‌کند.
جفت الکترون پیوندی	Bonding electron pair	۷۰	جفت الکترونی است که میان هسته دو اتم قرار دارند و پیوند شیمیایی را به وجود می‌آورند.
جفت الکترون ناپیوندی	Non- bonding electron pair	۷۳	جفت الکترونی است که به یک اتم تعلق دارند و در تشکیل پیوند شیمیایی شرکت نمی‌کنند.
شبکه بلور	Crystal lattice	۵۵	آرایش سه‌بعدی و منظم و تکرارشونده ذره‌های (اتم‌ها، یون‌ها و مولکول‌ها) سازنده یک بلور است.
عدد اکسایش	Oxidation number	۸۰	به بار الکتریکی نسبی اتم یک عنصر در مولکول یک ترکیب گفته می‌شود که از آن برای ردیابی الکترون‌ها طی واکنش‌های شیمیایی استفاده می‌شود.
آبکاری	Electroplating	۱۱۳	پوشاندن سطح یک جسم با لایه نازکی از یک فلز به کمک یک سلول الکترولیتی.
آند	Anode	۱۰۰	الکترودی که در سطح آن عمل اکسایش رخ می‌دهد.
اسید	Acid	۶۰	ماده‌ای که مزه ترش داشته باشد و در واکنش با بازها نمک تولید کند.
اسید آرنیوس	Arrhenius acid	۶۱	ماده‌ای که با حل شدن در آب غلظت یون هیدرونیوم (H_3O^+) را افزایش می‌دهد.
اسید تک‌پروتون‌دار	Monoprotic acid	۶۷	اسید لوری - برونستدی که پس از حل شدن در آب یک پروتون آزاد کند.
اسید چرب	Fatty acid	۸۵	کربوکسیلیک اسیدی که شامل زنجیرهای ۱۴ تا ۱۸ کربنی سیر شده یا سیر نشده بدون شاخه است.
اصل لوشاتلیه	Le Chatelier's principle	۴۸	اگر عاملی حالت تعادلی یک سامانه را برهم بزند، سامانه برای رسیدن دوباره به تعادل در جهتی جابه‌جا می‌شود که تأثیر عامل یادشده را به کمترین میزان خود برساند.

اکسایش	۹۳	Oxidation	فرایندی که طی آن اتم‌ها، یون‌ها یا مولکول‌ها الکترون از دست می‌دهند.
اکسنده	۹۳	Oxidant	گونه‌ای است که در یک واکنش اکسایش - کاهش گونه دیگر را اکسید می‌کند.
الکتروود	۹۹	Electrode	رسانای الکترونی در یک سلول الکتروشیمیایی که جریان برق را به الکترولیت وارد یا از آن خارج می‌کند.
الکتروود استاندارد هیدروژن	۱۰۱	Standard hydrogen electrode	تیغه پلاتین پوشیده شده از گرد بسیار نرم پلاتین در محلول یک مولار هیدروکلریک اسید که گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر در پیرامون آن وجود دارد.
الکتروشیمی	۹۲	Electrochemistry	علم استفاده از انرژی الکتریکی برای انجام تغییر شیمیایی یا تولید انرژی الکتریکی از انجام واکنش شیمیایی است.
انرژی فعال‌سازی	۱۶	Activation energy	حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش شیمیایی
باز	۶۰	Base	ماده‌ای تلخ مزه که بر اثر واکنش با اسیدها، نمک تولید می‌کند.
باز آرنیوس	۶۱	Arrhenius base	ماده‌ای که با حل شدن در آب غلظت یون هیدروکسید (OH) را افزایش می‌دهد.
پتانسیل الکتروودی	۹۹	Electrode potential	اختلاف پتانسیلی که بین تیغه فلزی (الکتروود) و محلول آبی دارای یون فلزی (الکترولیت) به وجود می‌آید.
پتانسیل الکتروودی استاندارد	۱۰۱	Standard electrode potential	اختلاف پتانسیلی است که میان تیغه فلزی (الکتروود) و محلول آبی دارای یون فلزی (الکترولیت) با غلظت یک مولار در دمای ۲۵°C (شرایط استاندارد) وجود دارد و نسبت به نیم‌سلول استاندارد هیدروژن سنجیده می‌شود.
پتانسیل کاهش استاندارد	۱۰۲	Standard reduction potential	پتانسیل الکتروودی استاندارد که برای فرایند کاهش (گونه کاهنده $\rightleftharpoons ne^+$ گونه اکسنده) گزارش می‌شود.
تبادل	۳۱	Equilibrium	حالتی در فرایندهای برگشت‌پذیر که سرعت فرایندهای رفت و برگشت با هم برابر است.
تبادل شیمیایی	۳۲	Chemical equilibrium	حالتی در یک واکنش شیمیایی برگشت‌پذیر که در دمای ثابت سرعت واکنش‌های رفت و برگشت با یکدیگر برابر می‌شود.
ثابت تعادل	۳۵	Equilibrium constant	عدد ثابتی است که از جایگزین کردن غلظت‌های تعادلی مواد شرکت‌کننده در واکنش، در عبارت ثابت تعادل به دست می‌آید.
ثابت یونش اسیدی	۶۶	Acid ionization constant (K_a)	مقدار ثابت تعادل برای یونش یک اسید در محلول آبی در دمای معین است.
ثابت یونش باز	۷۹	Base ionization constant (K_b)	مقدار ثابت تعادل برای یونش یک باز در محلول آبی در دمای معین است.
حفاظت کاتدی	۱۰۸	Cathodic protection	حفاظت یک فلز در برابر خوردگی از راه اتصال فلز به یک قطعه فلز با E° منفی‌تر
خوردگی	۱۰۷	Corrosion	فرایندی است که در آن یک فلز بر اثر یک واکنش اکسایش - کاهش تخریب می‌شود.
رسانای الکترونی	۹۹	Electronic conductor	ماده‌ای که جریان برق را به کمک جریان الکترون‌ها از خود عبور می‌دهد.
رسانای یونی	۹۹	Ionic conductor	ماده‌ای که جریان برق را به کمک حرکت یون‌ها از خود عبور می‌دهد.
سری الکتروشیمیایی	۱۰۲	Electrochemical series	فهرستی که در آن فلزها به ترتیب کاهش پتانسیل کاهش استاندارد مرتب شده‌اند.
سلول الکترولیتی	۱۰۴	Electrolytic cell	نوعی سلول الکتروشیمیایی است که با عبور جریان برق (انرژی الکتریکی) از آن یک تغییر شیمیایی روی می‌دهد.
سلول سوختی	۱۱۵	Fuel cell	نوعی سلول گالوانی نوع اول است که انرژی الکتریکی از اکسایش یک سوخت گازی شکل مانند هیدروژن یا متان به دست می‌آید.

سلول گالوانی	Galvanic cell	۱۰۴	نوعی سلول الکتروشیمیایی که طی یک واکنش شیمیایی انرژی الکتریکی تولید می کند.
شناساگر	Indicator	۷۳	ماده ای شیمیایی است که بر اثر تغییر pH در یک محلول آبی دچار تغییر رنگ می شود.
عبارت ثابت تعادل	Equilibrium constant expression	۳۵	رابطه ای ریاضی است که نسبت حاصل ضرب غلظت تعادلی فراورده (ها) به توان ضریب استوکیومتری آن (ها) به حاصل ضرب غلظت تعادلی واکنش دهنده (ها) به توان ضریب استوکیومتری آن (ها) را در دمای معین نشان می دهد.
کاتالیزگر	Catalyst	۱۹	ماده ای که بر سرعت واکنش های شیمیایی می افزاید.
کاتد	Cathode	۱۰۵	الکترودی که در سطح آن عمل کاهش رخ می دهد.
کاهش	Reduction	۹۳	فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون دریافت می کنند.
کاهنده	Reductant	۹۳	گونه ای است که در یک واکنش اکسایش - کاهش گونه دیگر را کاهش می دهد.
نیروی الکتروموتوری	Electromotive force	۱۰۳	اختلاف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی
نیم سلول	Half-cell	۹۹	نیمی از یک سلول الکتروشیمیایی که الکتروود و الکترولیت را شامل می شود.
نیم واکنش	Half-reaction	۹۳	واکنشی است که در یک نیم سلول رخ می دهد.
واکنش اکسایش - کاهش	Oxidation - reduction reaction	۹۳	واکنشی که در آن یک یا چند الکترون از گونه ای به گونه دیگر منتقل می شود.
واکنش الکترودی	Electrode reaction	۹۹	واکنش اکسایش یا کاهش که در مرز میان رسانای الکترونی و رسانای یونی رخ می دهد.
صابون	Soap	۱۰۲	به نمک سدیم، پتاسیم و آمونیوم، اسیدهای چرب گفته می شود.
پاک کننده غیر صابونی (مواد مؤثر سطحی)	Detergent (Surfactant)	۱۰۳	ترکیب هایی که کشش سطحی آب را کاهش می دهند و به ایجاد کلویید چربی در آب کمک می کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به‌عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه‌اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهونقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب شیمی ۳ - کد ۱۱۲۲۱۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	شمسی حیدری	کرمانشاه	۳۲	محمدامین نظامی	منطقه ۲
۲	جمشید لطفیان	قزوین	۳۳	اورنگ باقی	گیلان
۳	مسیب حسینی	فارس	۳۴	صبح شیری	ایلام
۴	سوسن نادری	مرکزی	۳۵	رامین عسگری کیا	همدان ناحیه ۱
۵	مریم قربانی	خراسان شمالی	۳۶	مهناز خراشادی زاده	خراسان جنوبی
۶	فاطمه شفاهی	سمنان	۳۷	علیرضا بادینی	سیستان و بلوچستان
۷	ژیلا توتونچی	آذربایجان شرقی	۳۸	احمد سلیمانخانی	ایلام
۸	هما غفاری	کردستان	۳۹	محمدعلی اسلامی نیا	کرمان
۹	منور احمدی	قزوین	۴۰	غلام حسن روحی	اردبیل
۱۰	نادر منصوری	خراسان شمالی	۴۱	حسن کاشی	اصفهان
۱۱	آریتا معصوم پور	سمنان	۴۲	داریوش نژادی سلامی	گیلان
۱۲	مرتضی فتاحی راد	ایلام	۴۳	رقیه پور قبادی	لرستان
۱۳	وحید اسدی	قزوین	۴۴	مرتضی زارعی	بندرعباس ناحیه ۱
۱۴	فریبا مرسلی	آذربایجان شرقی	۴۵	علی مویدی	تهران (شهرستان‌ها)
۱۵	مریم خزاعی	خراسان جنوبی	۴۶	زهره شمالی	زنجان
۱۶	احسان غفوری	اراک ناحیه ۱	۴۷	علیرضا حنفی	گلستان
۱۷	راضیه اکبری منبع	کبودرآهنگ	۴۸	ناهید احمدی	زنجان
۱۸	پژمان حبیبی	کردستان	۴۹	زهرآرزانی	کرج، ناحیه ۲
۱۹	فریده سلطانی اصل	تهران (شهرستان‌ها)	۵۰	محمد قادر پناه	لرستان
۲۰	ولی خوبان	قزوین	۵۱	فرهنگ حامدی	اهواز، ناحیه ۱
۲۱	محمدعلی رضایت	فارس	۵۲	حسن متقی	اصفهان
۲۲	سیده لیلا فانی	یزد	۵۳	مسعود راستیانی منش	کهگیلویه و بویراحمد
۲۳	یحیی حمید	خوزستان	۵۴	حسین موحدی نیا	بندرعباس ناحیه ۱
۲۴	شهلا مهدوی	اصفهان	۵۵	صابر رجائی	اردبیل
۲۵	فیض الله کریمی	اهواز ناحیه ۲	۵۶	سمانه کیانی	کرمانشاه
۲۶	طوبی زارع	مازندران	۵۷	عبدالمحمد محسنی	بوشهر
۲۷	ملیحه خباز	خراسان رضوی	۵۸	حجت اله پاک فطرت	خراسان رضوی
۲۸	مژگان حسین پور	گیلان	۵۹	مژگان آبی	شهر تهران
۲۹	منوچهر اسماعیل زاده	کرمان	۶۰	عباسعلی صمدی	گلستان
۳۰	مهری طاهری	هرمزگان	۶۱	فرشاد صیرفی زاده	تهران
۳۱	جهان پناه حاتمی	قزوین	۶۲	سعید همایونی	شیراز



۱- چند عبارت از زیر درست است ؟

- * رشد پیشرفت هر جامعه اغلب در پی تلاش هدفمند آگاهانه افراد تجربه ، کاردان و وزیر به دست یافتنی است .
 - * دانش ، توانایی ، مهارت و زیر ساخت های لازم به تنه تکلیف گاهی مناسب برای نردبان پیشرفت است .
 - * از جمله پیامدهای رشد پیشرفت جامعه می توان دسترسی آسان و ارزانه تر به فناوری نو را نام برد .
 - * دانش شیمی همراه با انگیزه و تلاش بعبه بهره گیری از مبدل کاتالیزنی در خود و کولوشیمیایی سبزه همچنین تبدیل مواد شیمیایی خام به مواد ارزشمند شده که راهی به سوی آینده ای روشن تر را رقم می زند
 - * از آنجا که یکی از ویژگی های آلتیابی انسان نجنگاوی و پرستگری اوست ، پیوسته در پی شناخت محیط پیرامون خود است
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۲- چند مورد زیر بعنوان دستاوردهای مهم شیمی و فناوری های آن جهت گذر از گدنها و رسیدن به زندگی مدرن امروز می باشد

- * فناوری تصفیه آب
- * فناوری تولید پلاستیک
- * فناوری شناسایی و تولید مواد بی حس کننده و آنتی بیوتیک
- * فناوری شناسایی و تولید کودهای شیمیایی مناسب
- * فناوری تولید نیرین
- * گسترش فناوری صنوف های نایشگر در دلیل اکثر زندگی

(۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۳

۳- چند عبارت از زیر درست است ؟

- * فناوری تولید نیرین ، یا عبت نخشیدن به محل و نقل ، نقش مبدل های کاتالیزنی در کاهش آلدری را فختنی برد
- * جراحی های گونه گون مدیون تولید مواد بی حس کننده و آنتی بیوتیک ها است .
- * اگرچه فن آوری تولید پلاستیک به آلدری محلی کمک کرد ولی صرفاً در صنعت پدشاک رفع مشکل نمود .
- * فناوری تصفیه آب مانع گسترش بیماری های از جمله وبا در جهان شد .
- * فناوری شناسایی و تولید کودهای شیمیایی سبب کاهش لیفیت این مواد و آلدری آب های زیرزمینی شد .

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۵

۴- کدام گزینه عبارت درستی بیان نمی کند -

- (۱) نوعی استفاده از دانش و فن آوری دوروی یک هستند
- (۲) تولید سلاج شیمیایی استفاده نابیت از فن آوری است
- (۳) اغلب استفاده دست و پینه از دانش و فن آوری به آیش و نه گنج می کند
- (۴) شیمی در کاهش آلدری مواد افزاینش مواد و گشت ذری و افزاینش بهره وری منابع شیمیایی ، دستاورد های مهمی دارد



شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

۵- ایجاد رنگ قهوه ای در آسمان کلان شهرها در بعضی از روزهای زمستان به گاز
 SO_2 (۱) NO_2 (۲) CO (۳) NO (۴) مربوط است .

۶- کدام گزینه عبارت رستی بیان می کند ؟
 (۱) نفس کشیدن در هوا همواره شادمانی آفرین است .
 (۲) هوای خشک و پاک فوایدی از گازهای گوناگون است که بخورن همگوار و تمکین شده اند .
 (۳) هوای آلوده ، گازهای SO_2 ، O_3 ، NO_2 ، CO و NO علاوه بر گازهای معمول هوا ، به همراه دارند .
 (۴) بوی بد هوای آلوده منحصراً به ذره های معلق و مازاد آلی در در هوا مربوط می شود .

۷- چند عبارت در زیر درست است ؟

- * بین ساعت ۸ تا ۱۰ صبح آلاینده های هوا به بیشترین حد خود می رسد .
 - * علت رنگ قهوه ای هوای آلوده به گاز نیتروژن دی اکسید بر می گردد .
 - * اگر میزان NO_2 افزایش یابد ، مقدار گاز اوزن هم بیشتر می شود .
 - * آلاینده های فوری از آلوده خود در هوا C_nH_y و CO است .
 - * تمکین موکدول های هییدروکربن در بنزین و بنزین آکیشن کافی ، دلیل وجود هییدروکربن در گاز فوری از آلوده است .
- ۴ (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴)

مقدار آلاینده به ازای هر کیلوگرم	فرمول شیمیایی آلاینده
۵/۹۹	a
۱/۶۷	C_nH_y
۱/۰۴	b

۸- با توجه به جدول مقابل می توان گفت :

- (۱) a گاز NO و b گاز CO است .
- (۲) بیشترین آلاینده ای از سوخت خود در هوا به گاز NO مربوط است .
- (۳) گاز CO به سبب تشکیل باران اسیدی می شود .
- (۴) در اثر جابجایی ۱۰ خود در بنزین km ۵ ، در روز ، روزانه ۴۳۵۰ تن آلاینده وارد هوا کرده می شود .

۹- کدام گزینه به کاهش یا حذف آلاینده ها در هوا کره کمک می کند ؟

- (۱) آشنایی با دانش های شیمیایی و رفتار آلاینده ها
- (۲) آشنایی با انرژی های خفایازی
- (۳) آشنایی با نقش گاز گلخانه ها
- (۴) ۲۶ متر در روز .





۱۰ - علت تفاوت سرعت واکنش های شیمیایی به مربوط است ؟

- (۱) نوع مواد واکنش دهنده
- (۲) تفاوت در انرژی فعالی
- (۳) تفاوت در ΔH واکنش ها
- (۴) مورد ا و ب

۱۱ - کدام واکنش زیر در دمای اتاق پیش نمی رود ؟

- (۱) واکنش گاز نیتروژن با گاز اکسیژن
- (۲) واکنش سوختن متان
- (۳) زنگ زدن آهن
- (۴) اکسایش فلز منیزیم

۱۲ - کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند ؟

- (۱) دمای موتور خودروها بیش از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد است .
- (۲) در دمای موتور قسمت محمده N_2 و O_2 به گاز NO تبدیل می شود .
- (۳) هر واکنش برای شروع به حداقلی از انرژی نیاز دارد .
- (۴) برای آغاز هر واکنش شیمیایی به مقدار معینی انرژی که به انرژی فعالی می سرود است نیاز می باشد .

۱۳ - کدام گزینه با میزان پیشرفت واکنش در واحد زمان (سرعت) رابطه دارد ؟


- (۱) دما
- (۲) کاتالیزور
- (۳) انرژی فعالی
- (۴) واکنش پذیری

۱۴ - کدام گزینه می تواند انرژی فعالی واکنش را تأمین کند ؟

- (۱) گرما
- (۲) تابش
- (۳) تغییرات دما یا فشار
- (۴) کاتالیزور

۱۵ - برای واکنش $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ کدام گزینه درست است ؟

- (۱) واکنش با آزاد شدن انرژی همراه است
- (۲) چون پشت گرهاده است انرژی فعالی نیاز ندارد .
- (۳) نسبت ضریب CO_2 به O_2 پس از موازنه $\frac{1}{3}$ است .
- (۴) ΔH واکنش عددی مثبت است .



۱۶ - بازوبه به نمودار فوق کدام حرف درست معرفی نشده است ؟

- (۱) ΔH واکنش = d
- (۲) E_a تبدیل A به B = c

(۴) $a =$ انرژی

(۳) b = پیشرفت واکنش





۱۷- کدام گزینه در مورد واکنش $2NO_2 \rightarrow N_2O_4 + O_2$ درست است؟

- (۱) E_a واکنش رفت نیز کمتر از E_a واکنش برگشت است.
- (۲) واکنش برگشت برخلاف واکنش رفت به انرژی فعال‌تری نیاز دارد.
- (۳) فرآورده‌های واکنش پایدارتر از واکنش دهنده‌ها هستند.
- (۴) سرعت واکنش تجزیه NO در طرفی جداگانه از سرعت تبدیل NO از N_2 و O_2 در شرایط یکسان کمتر است.

۱۸- چند عبارت زیر درست است؟

- * هرچه انرژی فعال‌تری واکنش زیاده‌تر باشد، واکنش در شرایط دما و دمای بالاتری انجام می‌شود.
- * هرچه ΔH واکنشی منفی‌تر باشد یعنی واکنش دهنده کم‌تری برای عبور از سد انرژی، به انرژی زیاده‌تری نیاز دارند.
- * با افزایش دما، انرژی واکنش دهنده‌ها، به انرژی فرآورده‌ها نزدیک‌تر شده و سرعت واکنش بیشتر می‌شود.
- * در دمای بالاتر، شمار ذره‌هایی که در واحد زمان می‌توانند به فرآورده‌ها تبدیل شوند، افزایش یافته و واکنش بیشتر می‌شود.
- * هرچه پیوندها در مواد اولیه مستحکم‌تر، سطح انرژی مواد اولیه بالاتر و E_a کمتر و سرعت واکنش زیاده‌تر است.
- * هرچه پیوندها در مواد فرآورده قوی‌تر، سطح انرژی فرآورده پایین‌تر و پایداری آن‌ها بیشتر و ΔH واکنش منفی‌تر می‌شود.


۳ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۶ (۱)

۱۹- کدام یک در شرایط یکسان سریع‌تر انجام می‌شود؟



۲۰- انرژی فعال‌تری کدام واکنش در دمای اتاق تأمین واکنش پیشرفت می‌کند؟
 (۱) فسفر سفید با آلومین (۲) O_2 با H_2 (۳) N_2 با H_2 (۴) گلوکز با آلومین

۲۱- از جمله واکنش‌هایی که در صنعت در مداخله با بالا انجام می‌شود در تداوم واکنش ... یاد کرد.

- ۱- تجزیه بنت‌آهک ($CaCO_3$)
- ۲- تشکیل آمونیاک از گازهای O_2 و H_2
- ۳- تشکیل دوده از CH_4
- ۴- تهیه آمونیاک از گازهای N_2 و H_2

۲۲- استفاده از ... به بابت انجام واکنش‌های با انرژی فعال‌تری زیاد در مداخله با پایین می‌شود.
 (۱) تغییر حالت فیزیکی (۲) کاتالیزگر (۳) واکنش دهنده‌های گازی (۴) ساینه بسته





۲۳ - کدام ویژگی در مورد کاتالیز درست بیان نشده است ؟

- ۱ - انرژی فعال‌ری و آنتالپی کاهش میدهد
- ۲ - سرعت دانش را افزایش و در پایا بدون تغییر می‌ماند.
- ۳ - میزان فرآورده نهایی را در زمان کمتر تولید می‌کند.
- ۴ - میزان گرمایی دانش را افزایش میدهد.

۲۴ - عبارت غلط است ؟

۱) کاتالیزورها بدون شرکت در دانش، سرعت را افزایش و در پایا دست نخورده باقی می‌مانند.

۲) کاتالیزورها می‌توانند با کاهش انرژی محلیت را کاهش دهد.

۳) کاتالیزورها دانش خاصی را سرعت میدهد و باید پایداری حرارتی و شیمیایی مناسبی داشته باشد.

۴) در دانش H_2 ، O_2 ، پورروری و تدریس پلاستیکی کاتالیزورها و تدریس پلاستیکی H_2 را بیشتر از O_2 کاهش میدهد.

۲۵ - در دمای $25^\circ C$ آنتالپی دانش H_2 با O_2 به اندازه 572 کیلوژول بر ماله و در حفره ... به تغییر انجام می‌شود.

- ۱) جرقه و پودر آهن ۲) پورروری و جرقه
- ۳) تدریس پلاستیکی و جرقه
- ۴) تیغه آهنی

۲۶ - کدام فریه در حفره کاتالیزور بدون تغییر می‌ماند .

- ۱) سطح انرژی دانش دهنده و فرآورده و بازده دانش
- ۲) تلفات سطح انرژی دانش دهنده و فرآورده

(ع) مورد ۲۱

۳) انرژی فعال‌ری و سرعت دانش

۲۷ - فرآورده حاصل از کدام آلاینده ضمن عبور از مبدل کاتالیتی در خودرو در دست گرفته نشده است ؟



(ع) مورد ۲ و ۳



۲۸ - در هر دانش کاتالیزور با ... انرژی فعال‌ری ، سرعت دانش را ... می‌دهد ، اما آنتالپی دانش ...

۱) کاهش - کاهش - افزایش می‌ماند

۲) کاهش - کاهش - ثابت می‌ماند

۳) کاهش - افزایش - ثابت می‌ماند

۴) افزایش - کاهش - کاهش می‌ماند


۲۹ - کدام فریه در یک دانش خاص سبب کاهش انرژی فعال‌ری و رسیدن به سرعت دانش دهنده و فرآورده می‌شود ؟

۱) افزایش فشار

۲) تغییر دما

۳) افزایش غلظت





۳۰- کدام گزینه در مورد واکنش با نمودار مقابل درست نیست ؟

- (۱) ΔH واکنش ۵۶۶ - کیلوژول است .
- (۲) انرژی فعالش واکنش ۳۳۴ کیلوژول است .
- (۳) A گاز CO_2 است .

(۴) مجموع ضرایب در واکنش خوانده شده ۷ است .

۳۱- ضده عبارت زیر درست است ؟

- * مقدار آلایندگی خودی از موتور خود را و عبارت $CO < C_nH_y < NO$ است .
- * هر کاتالیزگر می تواند به شمار معدودی واکنش سرعت بخشد .
- * چون زمان گذرانی آلایندگی با مبدل کاتالیستی در تماس بوده و دمای آن به سرعت کاهش می یابد ، مبدل کاتالیستی باید هر چه بیشتر به موتور خود را نزدیک باشد .
- * گاز NO در حفره کاتالیزگر طی واکنش انرژی خواه به گاز N_2 و O_2 تبدیل و از درون NO چهارم جدا می شود .
- * چون کاتالیزگر برآنتالپی واکنش دهنده و مقادیر اثر است بر میزان ΔH یا آنتالپی واکنش بی تأثیر است .

(۴) ۱

(۳) ۳

(۲) ۴

(۱) ۵

۳۲- کدام ملکز عنوان مبدل کاتالیستی ، بررسی صفت سرامیکی به شکل توری در میان دارند ؟

- (۱) رودیم (Rh) ۱۲ پالادیم (Pd) ۳ پلاتین (Pt) ۴ هوم

۳۳- کدام گزینه از ویژگی های یک کاتالیز خوب نیست ؟

- (۱) تا حد امکان اقتصاد و انتخابی عمل کند
- (۲) در مقابل گرما خاصیت خود را حفظ کند .
- (۳) بتواند همزمان واکنش های مختلفی را صورت دهد
- (۴) در محیط واکنش گرما خاصیت انتخابی خود را حفظ کند .

۳۴- مبدل کاتالیستی در خودروهای دیزلی نمی تواند نام دارد به حوازه شود ؟

- (۱) NO و NO_2 (۲) CO و NO (۳) C_nH_y و CO (۴) مورد ۱ و ۳

۳۵- از خودروهای دیزلی مبدلی طراحی شده که با درون گازهای NO و NO_2 را به گاز N_2 تبدیل کرده و از ورود گازهای NO و NO_2 به حوازه جلوگیری می شود .

(۱) کاتالیزور پلاتین - تا حدود زیادی

(۲) آمونیاک - تا حدود زیادی

(۳) آمونیاک - به طور کامل





۳۶- واکنش زیر به جابجایی از درون NO و NO_2 تبدیل کاتالیتی در موتورهای دیزلی، به هواگرم مربوط است در آن A ... است و پس از موازنه محضه ضرایب ... است.



(۱) NH_3 و ۹ (۲) H_2 و ۹ (۳) NH_3 و ۷ (۴) H_2 و ۸

۳۷- چند عبارت در زیر درست است؟

- * غذای انسان محدود رشد سلافتی، یکی از ضرورت های زندگی برای ارگانیسمان به شمار می رود.
- * بعلت محدودیت منابع و دروند و به افزایش جمعیت، تأمین غذای یکی از چالش های زندگی است.
- * افزایش بهره وری در تولید فراآورده های کث و زنی بهترین راه حل رفع کمبود غذا است.
- * شناسایی، تولید و افزودن کودهای شیمیایی مناسب به خاک تنها راه حل برای رفع کمبود غذا است.
- * اغلب گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را مستقیماً از گاز نیتروژن هواگرم جذب می کنند.
- * آمونیاک و اوره از جمله ترکیب های نیتروژن داری است که شیمی دانان برای جذب نیتروژن توسط گیاه به کار می برند.
- * به دلیل قدرت پودمان بالا در غفر نیتروژن گیاهان قادر به استفاده مستقیم از نیتروژن هواگرم نیستند.

(۱) ۷ (۲) ۶ (۳) ۵ (۴) ۴

۳۸- گیاهان برای رشد افزودن بکربن دی اکسید و آب را گرم در بدن هم ... نیز نیاز دارند.

(۱) نیتروژن (۲) پتاسیم (۳) فسفر (۴) آمونیاک

۳۹- به دلیل انرژی فعال داری ... واکنش گاز N_2 با H_2 ، این واکنش در دمای اتاق ...

(۱) کم - پیش می رود - تا کامل شود (۲) کم - پیش می رود - تا به تعادل برسد

(۳) بالا - در حفره کاتالیزور یا جرقه پیش می رود تا به تعادل برسد (۴) بالا - در حفره کاتالیزور یا جرقه پیش می رود

۴۰- گزنه نیتروژن کدام است؟

- (۱) واکنش N_2 با H_2 حتی با جرقه و کاتالیزور در دمای اتاق پیش رفتی ندارد.
- (۲) واکنش N_2 با H_2 در ظرف دربسته و در دمای بالا، برگشت پذیر بوده و در شرایط مناسب به تعادل می رسد.
- (۳) واکنش نیتروژن آمونیاک از N_2 و H_2 برگشت پذیر و ساده و در شرایط مناسب تعادلی است.
- (۴) در سامانه تعادلی $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ ، غلظت گازهای واکنش دهنده و فراورده با خلقت ثابت و با بزرگ ۷۸ در صد وجود دارد.





۴۱ - گزینه درست کدام است.

- ۱) مقدار عددی K ثابت تعادل نسبت به جابجایی غلظت فراورده ها به واکنش دهنده که در لحظه از واکنش را نشان میدهد.
- ۲) هم مقدار عددی K ثابت تعادل واکنش عدد برگشتی باشد ، میزان پیشرفت آن واکنش در واحد زمان بیشتر است.
- ۳) هم میزان پیشرفت یک واکنش در نهایت بیشتر باشد مقدار عددی K آن واکنش نیز بیشتر است.
- ۴) مقدار عددی K ثابت تعادل علاوه بر نوع واکنش (دهنده ها و فراورده ها به فشار ، دما و غلظت نیز بستگی دارد).

۴۲ - شرایط بهینه برای تولید آمونیاک از ترکیب مستقیم N_2 و H_2 در صنعت چیست ؟ (ردش هاجم)

- ۱) استفاده از کاتالیزور Fe
- ۲) رساندن فشار به 200 atm
- ۳) رساندن دما به $450.^\circ C$
- ۴) $400^\circ C$ برادر


۴۳ - طبق اصل ... هرگاه تغییری بپوشد هم خوردن یک سامانه تعادلی بشود ، تعادل در جهت جابجایی شود که تا حد امکان اثر آن تغییر را جبران کند و به تعادل ... برسد .

- ۱) لوشاتلیه - ادلیه
- ۲) لوشاتلیه - هاجم
- ۳) هونده - هاجم
- ۴) هونده - هاجم

۴۴ - سامانه تعادلی تولید آمونیاک به روش هاجم در ظرفی در بسته و دمای ثابت برقرار است . کدام گزینه در مورد آن درست بیان نشده است ؟

$$9 \text{ H}_2 + 3 \text{ N}_2 \rightleftharpoons 2 \text{ NH}_3 + 9 \text{ H}_2$$

- ۱) خارج کردن کمی از آمونیاک از سامانه بپوشد جابجایی آن را از چپ به راست و برقرار می ماند تعادل جابجایی میشود.
- ۲) وارد کردن مقدار کمی گاز هیدروژن به آن بپوشد جابجایی تعادل در جهت رفت و افزایش غلظت آمونیاک میشود.
- ۳) افزایش فشار این سامانه تعادلی را در جهت رفت جابجایی کرده تعادلی جابجایی با K بزرگتر برقرار می شود.
- ۴) اگر سامانه تعادلی را از طرف ۲ لیتری به ۳ لیتری منتقل کنیم ، در زمان جابجایی مول NH_3 کاهش و مول H_2 و N_2 افزایش می یابد .



۴۵ - نمودار مقابل به سامانه تعادلی هاجم مربوط است . با توجه به آن چه تغییری بر تعادل آغازی اعمال شده است .

- ۱) افزایش فشار یا کاهش حجم در دمای ثابت .
- ۲) تزریق کمی گاز آمونیاک در دمای ثابت .
- ۳) تزریق کمی H_2 در دمای ثابت .
- ۴) انتقال سامانه در حجم ثابت از دمای $450.^\circ C$ به $550.^\circ C$



- ۴۶ - کدام گزینه مقدار عددی K ثابت تعادل دانش $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ را تغییر میدهد؟
 (۱) تغییرات ریاجم (۲) تغییر غلظت NO (۳) تغییر دما (۴) توزیع O_2 به طرف
- ۴۷ - کدام گزینه برای ایجاد شرایط بهینه در تولید آمونیاک بیشترین تاثیر دارد؟
 (۱) کاهش دما و افزایش فشار (۲) افزایش دما و کاهش فشار (۳) کاهش دما و افزایش فشار (۴) افزایش دما و کاهش فشار



- ۴۸ - سامانه گازی $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ با ۴ مول N_2 و ۷ مول H_2 و ۵۰ درصد H_2 در تعادل آغازی است. اگر در همان دما به آن ۵ مول N_2 اضافه کنیم کدام گزینه مقدار مول NH_3 و N_2 و H_2 را به ترتیب از راست به چپ در تعادل جدید نشان میدهد؟

- (۱) ۴۷ ، ۱۶ و ۱۱
 (۲) ۱۶ ، ۱۱ و ۴۷
 (۳) ۳۳ ، ۱۵ و ۰۸
 (۴) ۵۴ ، ۱۸ و ۱۶

- (۱) ۴۷ ، ۱۶ و ۱۱
 (۲) ۱۶ ، ۱۱ و ۴۷
 (۳) ۳۳ ، ۱۵ و ۰۸
 (۴) ۵۴ ، ۱۸ و ۱۶

- ۴۹ - سامانه گازی در دمای ثابت با ... تعادل را در جهت ... تغییر می دهد؟
 (۱) افزایش حجم - مول های گازی کمتر - تغییر نمیدهد
 (۲) کاهش حجم - مول های گازی کمتر - تغییر نمیدهد
 (۳) کاهش حجم - مول های گازی کمتر - کاهش میدهد
 (۴) کاهش فشار - مول های گازی کمتر - تغییر نمیدهد

- ۵۰ - کدام گزینه در مورد سامانه تعادلی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ درست نیست؟
 (۱) تغییرات ریاجم بر جای این سامانه بی اثر است
 (۲) کاهش حجم باعث افزایش دما و تغییر در جهت تعادل است
 (۳) انتقال سامانه از دما ۴۰۰ به ۴۵۰ درجه سانتیگراد باعث افزایش K می شود
 (۴) افزودن I_2 به سامانه مول H_2 را کاهش میدهد
- ۵۱ - افزایش فشار در دمای ثابت باعث افزایش فراوانی کدام فرنی می شود؟



- ۵۲ - تریقی گاز HCl به سامانه تعادلی $HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$ بابت تغییرات زیر می شود به جز ...

- (۱) کاهش pH و افزایش غلظت H^+
 (۲) کاهش pH و کاهش غلظت F^-
 (۳) افزایش غلظت H^+ و HF
 (۴) افزایش غلظت F^- و HF

- (۱) کاهش pH و افزایش غلظت H^+
 (۲) کاهش pH و کاهش غلظت F^-
 (۳) افزایش غلظت H^+ و HF
 (۴) افزایش غلظت F^- و HF

- ۵۳ - کدام فرنی علاوه بر جای کردن تعادل را توانایی تغییر K را نیز دارد؟
 (۱) تغییر دما (۲) تغییرات ریاجم (۳) تغییر غلظت (۴) استفاده از کاتالیزور






- ۵۴ - چند عبارت در زیر درست است ؟
- * اثر تغییر دما بر تعادل های گوناگون یکسان نیست و به گرماده یا گرماگیر بودن آن ها بستگی دارد.
 - * با تغییر دما هم سانه جابجایی شود و هم مقدار عددی K نیز کمتر می شود.
 - * در دانش $2A \rightleftharpoons B + 9$ ، افزایش دما باعث رسیدن به تعادل و مقدار عددی K می شود هم تغییر می کند.
 - * برای دانش $2B \rightleftharpoons C + 5H_2$ ، افزایش دما باعث رسیدن به تعادل و مقدار عددی K هر دو کاهش می یابند.
 - * در سانه ها گرماگیر ، افزایش دما مقدار عددی K نیز کمتر و نسبت غلظت فرآورده ها به دانش دهنده کمتری شود.
 - * مقدار عددی K به دما و دما به برارای یکبار $mol \cdot L^{-1}$ است.

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)




۵۵ - اگر نمودار مقابل به فرآیند های مربوط باشد a کدام است ؟

(۱) F_2

(۲) دما

(۳) غلظت H_2 یا N_2



۵۶ - اگر نمودار مقابل که به فرآیند های مربوط است ، a کدام است ؟

(۱) دما

(۲) F_2

(۳) a تا b تا c

(۴) حجم ظرف دانش

(۵) a تا b تا c

(۶) a تا b تا c

(۷) a تا b تا c

(۸) a تا b تا c

(۹) a تا b تا c

(۱۰) a تا b تا c

(۱۱) a تا b تا c

(۱۲) a تا b تا c

(۱۳) a تا b تا c

(۱۴) a تا b تا c

(۱۵) a تا b تا c

(۱۶) a تا b تا c

(۱۷) a تا b تا c

(۱۸) a تا b تا c

(۱۹) a تا b تا c

(۲۰) a تا b تا c

(۲۱) a تا b تا c

(۲۲) a تا b تا c

(۲۳) a تا b تا c

(۲۴) a تا b تا c

(۲۵) a تا b تا c

(۲۶) a تا b تا c

(۲۷) a تا b تا c

(۲۸) a تا b تا c

(۲۹) a تا b تا c

(۳۰) a تا b تا c

(۳۱) a تا b تا c

(۳۲) a تا b تا c

(۳۳) a تا b تا c

(۳۴) a تا b تا c

(۳۵) a تا b تا c

(۳۶) a تا b تا c

(۳۷) a تا b تا c

(۳۸) a تا b تا c

(۳۹) a تا b تا c

(۴۰) a تا b تا c

(۴۱) a تا b تا c

(۴۲) a تا b تا c

(۴۳) a تا b تا c

(۴۴) a تا b تا c

(۴۵) a تا b تا c

(۴۶) a تا b تا c

(۴۷) a تا b تا c

(۴۸) a تا b تا c

(۴۹) a تا b تا c

(۵۰) a تا b تا c

(۵۱) a تا b تا c

(۵۲) a تا b تا c

(۵۳) a تا b تا c

(۵۴) a تا b تا c

(۵۵) a تا b تا c

(۵۶) a تا b تا c

(۵۷) a تا b تا c

(۵۸) a تا b تا c

(۵۹) a تا b تا c

(۶۰) a تا b تا c

(۶۱) a تا b تا c

(۶۲) a تا b تا c

(۶۳) a تا b تا c

(۶۴) a تا b تا c

(۶۵) a تا b تا c

(۶۶) a تا b تا c

(۶۷) a تا b تا c

(۶۸) a تا b تا c

(۶۹) a تا b تا c

(۷۰) a تا b تا c

(۷۱) a تا b تا c

(۷۲) a تا b تا c

(۷۳) a تا b تا c

(۷۴) a تا b تا c

(۷۵) a تا b تا c

(۷۶) a تا b تا c

(۷۷) a تا b تا c

(۷۸) a تا b تا c

(۷۹) a تا b تا c

(۸۰) a تا b تا c

(۸۱) a تا b تا c

(۸۲) a تا b تا c

(۸۳) a تا b تا c

(۸۴) a تا b تا c

(۸۵) a تا b تا c

(۸۶) a تا b تا c

(۸۷) a تا b تا c

(۸۸) a تا b تا c

(۸۹) a تا b تا c

(۹۰) a تا b تا c

(۹۱) a تا b تا c

(۹۲) a تا b تا c

(۹۳) a تا b تا c

(۹۴) a تا b تا c

(۹۵) a تا b تا c

(۹۶) a تا b تا c

(۹۷) a تا b تا c

(۹۸) a تا b تا c

(۹۹) a تا b تا c

(۱۰۰) a تا b تا c

(۱۰۱) a تا b تا c

(۱۰۲) a تا b تا c

(۱۰۳) a تا b تا c

(۱۰۴) a تا b تا c

(۱۰۵) a تا b تا c

(۱۰۶) a تا b تا c

(۱۰۷) a تا b تا c

(۱۰۸) a تا b تا c

(۱۰۹) a تا b تا c

(۱۱۰) a تا b تا c

(۱۱۱) a تا b تا c

(۱۱۲) a تا b تا c

(۱۱۳) a تا b تا c

(۱۱۴) a تا b تا c

(۱۱۵) a تا b تا c

(۱۱۶) a تا b تا c

(۱۱۷) a تا b تا c

(۱۱۸) a تا b تا c

(۱۱۹) a تا b تا c

(۱۲۰) a تا b تا c

(۱۲۱) a تا b تا c

(۱۲۲) a تا b تا c

(۱۲۳) a تا b تا c

(۱۲۴) a تا b تا c

(۱۲۵) a تا b تا c

(۱۲۶) a تا b تا c

(۱۲۷) a تا b تا c

(۱۲۸) a تا b تا c

(۱۲۹) a تا b تا c

(۱۳۰) a تا b تا c

(۱۳۱) a تا b تا c

(۱۳۲) a تا b تا c

(۱۳۳) a تا b تا c

(۱۳۴) a تا b تا c

(۱۳۵) a تا b تا c

(۱۳۶) a تا b تا c

(۱۳۷) a تا b تا c

(۱۳۸) a تا b تا c

(۱۳۹) a تا b تا c

(۱۴۰) a تا b تا c

(۱۴۱) a تا b تا c

(۱۴۲) a تا b تا c

(۱۴۳) a تا b تا c

(۱۴۴) a تا b تا c

(۱۴۵) a تا b تا c

(۱۴۶) a تا b تا c

(۱۴۷) a تا b تا c

(۱۴۸) a تا b تا c

(۱۴۹) a تا b تا c

(۱۵۰) a تا b تا c

(۱۵۱) a تا b تا c

(۱۵۲) a تا b تا c

(۱۵۳) a تا b تا c

(۱۵۴) a تا b تا c

(۱۵۵) a تا b تا c

(۱۵۶) a تا b تا c

(۱۵۷) a تا b تا c

(۱۵۸) a تا b تا c

(۱۵۹) a تا b تا c

(۱۶۰) a تا b تا c

(۱۶۱) a تا b تا c

(۱۶۲) a تا b تا c

(۱۶۳) a تا b تا c

(۱۶۴) a تا b تا c

(۱۶۵) a تا b تا c

(۱۶۶) a تا b تا c

(۱۶۷) a تا b تا c

(۱۶۸) a تا b تا c

(۱۶۹) a تا b تا c

(۱۷۰) a تا b تا c

(۱۷۱) a تا b تا c

(۱۷۲) a تا b تا c

(۱۷۳) a تا b تا c

(۱۷۴) a تا b تا c

(۱۷۵) a تا b تا c

(۱۷۶) a تا b تا c

(۱۷۷) a تا b تا c

(۱۷۸) a تا b تا c

(۱۷۹) a تا b تا c

(۱۸۰) a تا b تا c

(۱۸۱) a تا b تا c

(۱۸۲) a تا b تا c

(۱۸۳) a تا b تا c



۶۰ - از جمله منابع طبیعی شیمیایی ارزشمند که به لحاظ زمینشناسی در جهان توزیع نشده اند ... است

(۱) نفت خام و گاز طبیعی (۲) زغال سنگ (۳) معادن مس، آهن، طلا، پیریت و ... (۴) تمام موارد

۹۱ - چند عبارت زیر درست است ؟
 * به علت توزیع نامتوازن منابع شیمیایی برخی کشورها به واسطه دارا شدن این منابع هستند و تجارت جهانی شکل گرفته است.
 * برخی کشورهای دنیا با کسب درآمد از فروش منابع خود، زمینه آسایش رشد و توسعه را فراهم می کنند.
 * هرچه شوری منابع طبیعی بیشتری به فروش برساند (نمک یا خاوری شده) درآمد بیشتری کسب کرده مردم آن در رفاهتر و آن کشور توسعه یافته تر است.
 * به کمک فناوری های شیمیایی می توان جای حدود مواد کم ارزش تر، مواد کم کمتری را قرار داد و به قیمت بالاتری فروخت.
 * فروش نفت خام به ترش و بلاایش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده های پتروشیمیایی مانند آمونیاک و متانول و نترنی و سولفوریک اسید و ... راهی دیگر به هنرم اقتصاد می نماید.
 * اصطلاح خام فروشی ویژه منابع شیمیایی معدنی است. و می توان از آن برای مواردی مانند پنبه بابر برد.

(۴) ۳

(۳) ۶

(۲) ۵

(۱) ۴

۹۲ - کدام گزینه عبارت درستی بیان نمی کند .

(۱) قیمت یک تن مس خالص در بازار جهانی، هزاران برابر قیمت یک تن سنگ معدن مس است.
 (۲) تفاوت فاحش میان عنصر فلزی و سنگ معدن آن عموماً از نظر قیمت نشان دهنده نقش ارزشمند دانش و فناوری استخراج و فرآوری است.
 (۳) هرچه در صند خلوص ماده شیمیایی بیشتر باشد، هزینه استخراج آن نیز بیشتر خواهد بود.
 (۴) فن آوری های جداسازی و فرآوری مواد یکی از فن آوری های پیشرفته و گران و پیرکاربرد و در عین حال کارآفرین و درآمدزا به شمار میرود.

۹۳ - چند عبارت زیر درست است ؟

* میان قیمت عنصر مس با خلوص ۹۹٫۹ درصد، نسبت به عنصر مس با خلوص ۹۹ درصد تفاوت خیلی وجود ندارد.
 * با کارگیری فناوری تبدیل مواد خام به مواد فرآوری شده، برب رشد و بهره وری اقتصادیک صورت می گیرد.
 * ارزش پولی هر لیتر، اینیلین (طیکول) اتانول کمتر است.
 * فناوری در واقع، دانش به کار رفته برای حل یک مسئله در صنعت یا زندگی روزانه برای رسیدن به هدفی خاص است.
 * امروزه آن از فناوری ارتباطات، کت و نوری، غذایی، نظامی، دارویی، اکسایش و آلودگی بهره می گیرند.
 * بطور خاص وسیله های مانند تلفن و رایانه همراه و بیسیم نمونه از دانش کمتریست و مفیدترین استفاده شده است.

(۴) ۲

(۳) ۴

(۲) ۵

(۱) ۶






شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

۶۴ - کدام گزینه به فن آوری شیمیایی مربوط می شود.

- (۱) ساخت مواد جدید
(۲) ابداع روش جدید برای ساخت آب نان ترو با هزینه کمتر
(۳) یافتن روش، طراحی ساخت دستگاهی برای تشخیص دقیق ساقه ریزه
(۴) ۱۴ تا ۲۴ موارد

۶۵ - در زیر روند کلی افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های شیمیایی داده شده ، کدام گزینه برای تکمیل آن مناسب است ؟



- (۱) A : انرژی و آب و فن آوری شیمیایی و نیروی انسانی B : مواد اولیه مهم و پیرکاربرد در صنایع دیگر و $A = C$
 (۲) A : مواد اولیه مهم و پیرکاربرد در صنایع دیگر B : انرژی و آب و فن آوری شیمیایی و نیروی انسانی و $A = C$
 (۳) A : استخراج B : فرآوری C : انبار
 (۴) A : کشف B : استخراج C : ذخیره سازی

۶۶ - کدام گزینه عبارت رستی بیان نمی کند ؟

- (۱) سنتز یک فراپایه شیمیایی هدفمند است که در آن ، استفاده از مواد ساده تر، مواد شیمیایی دیگر را تولید می کنند
 (۲) گروه عاملی اتم یا گروهی از اتم ها است که به یک خانواده الی خواص ویژه ای میدهد و تولید سنتز مولکول های آلی است
 (۳) سنتز قانون بسیاری از پژوهش های شیمیایی است که منجر به طراحی و تولید مواد جدید می شود
 (۴) هر ماده آلی الزاماً دارای یک یا چند گروه عاملی است که خواص و رفتار آنرا تعیین می کند .

۶۷ - تولید یک ماده آلی جدید می تواند با ... همراه باشد .

- (۱) تولید یا مصرف انرژی (۲) تغییر فشار (۳) ایجاد یک یا چند گروه عاملی (۴) ۱۴ تا ۲۴ موارد

۶۸ - کدام گزینه درست نیست ؟

- (۱) شیمی دان ها به کمک دانش مربوط به ساختار و رفتار گروه های عاملی و دانستن شرایط و عوامل مؤثر بر انجام واکنش های شیمیایی از مواد خام یا اولیه در دسترس ، ماده ای نو برای کاربرد مشخصی تولید می کنند
 (۲) شیمی دان ها با استفاده از مواد شیمیایی خاص ، گروه های عاملی موجود در یک ماده آلی را به گروه عاملی جدید تغییر می دهند
 (۳) در سنتز یک استر در شرایط مناسب گروه عاملی الکحل و گروه عاملی اسید آلی با حذف H_2O چنانچه استر تغییر می کنند
 (۴) پلی اریل ها از گاز های پر مصرف و ارزشمند بعد از نفت و گاز ، در صنایع پتروشیمی برای تولید ، اتان ، متان ، اتانول و ... پلی اتن ، گاز اتن است .



۶۹ - کدام فرآورده یا واکنش دهنده برای مصرف مردم در واکنش های زیر درست معرفی نشده است .

- ۱) $C_2H_4(g) + A \rightarrow C_2H_6$ $A=H_2$ و $B=C_2H_4$ و $C=B$ و $D=$ اشیب اسید و $E=HCl$ (۱)
 ۲) $nB \xrightarrow{\text{دیاقف}} \text{پلی اتن}$ $A=H_2$ و $B=$ اتن و $C=C_2H_2$ و $D=$ اشیب اسید و $E=HCl$ (۲)
 ۳) $C + H_2O \rightarrow \text{اتانول}$ $A=H_2$ و $B=C=C_2H_2$ و $D=E=CH_3COOH$ (۳)
 ۴) $\text{اتانول} + D \rightarrow CH_3-C(=O)-O-CH_2-CH_3$ $A=H_2$ و $B=C=C_2H_4$ و $D=E=HCl$ (۴)
 ۵) $C_2H_4 + E \rightarrow$ افشانده بی حس کننده موضعی $D=E=HCl$ و $B=C=C_2H_4$ و $A=H_2$ (۵)
 ۷۰ - فرآورده کدام واکنش درست درسته نشده است ؟

- ۱) بسپارش یا پلیمریزاسیون اتن ، پلی اتن ، سازه نه اصلی برخی پلاستیک ها
 ۲) واکنش گاز اتن با گاز هیدروژن کلازید ، کلرداتان لعبدان افشانده بی حس کننده موضعی
 ۳) اتانولیک اسید یا جوهر کبر با اتانول که ماده از خند غندی نشده است ، اتیل انشاد که حاصل چوب است
 ۴) اتن با آب ، انیلین ، گلیکول یا خند نخ تولید می کنند

۷۱ - کدام دسته از محلی نیست ؟

- ۱) تبدیل آلکن به آلکل با ایجاد گروه عاملی $-OH$
 ۲) تبدیل آلکل به کربوکسیلیک اسید با تغییر گروه عاملی به $-COOH$
 ۳) تبدیل آلکل به آمین با تغییر گروه عاملی به $-NH_2$
 ۴) تبدیل آمین به کتون با تغییر گروه عاملی به $-CHO$

- ۷۲ - اگر $R-OH$ یا $R-C(=O)H$ یا $R-C(=O)R'$ تبدیل شود به ... تبدیل می شود
 ۱) آلکل - کتون - آلدئید
 ۲) آلکل - آلدئید - کتون
 ۳) آلکل - آلدئید - ائیدی
 ۴) آلدئید - کتون - کربوکسیلیک اسید

۷۳ - نوع واکنش و فناوری به کار رفته در سنتز یا تولید ماده هدف بر ... مؤثر است ؟

- ۱) بازده واکنش
 ۲) هزینه مواد و انرژی مصرف شده
 ۳) تعداد و نوع گروه های عاملی در ماده هدف
 ۴) تعداد مواد

۷۴ - در تشکیل هر مول انیل استات از اتانول و کبر (اکیک اسید) تا گاز نیتروژن زیر درست است ...

- ۱) فرآورده ای حاصل ۱۸ گرم بر مول ۶۶ گرم حجم نسبت به مواد اولیه دارد
 ۲) گروه عاملی $-OH$ و $-COOH$ به گروه عاملی $-C(=O)O-$ یا استری تغییر می کنند
 ۳) مجموع پیوندها در مواد واکنش دهنده دو تا بیشتر از مجموع پیوندها در فرآورده ای حاصل است
 ۴) دمای جوش فرآورده ای حاصل از دمای جوش واکنش دهنده ها بیشتر است



- ۷۵ - مراحل علمی که یک شیمی دان برای ساخت ماده هدف طی می کند به ترتیب عبارتند از ...
- (۱) یافتن مواد مناسب و اذعان و دستدار محلی زیست ← یافتن واکنش های شیمیایی آن در برابر ماده
 - (۲) کاهش هزینه تولید ← طراحی فناوری لازم برای تولید صنعتی آن ماده
 - (۳) تهیه ماده - مناسب ← طراحی فناوری مناسب ← انجام دانش ← تولید ماده هدف


(۴) مورد ۱ و ۲ اهمیت قدری

- ۷۶ - کدام گزینه در مورد PET درست بیان شده است؟
- (۱) مخفف نام پلیمری به نام پلی اتیلن ترفتالات است.
 - (۲) در ساخت پلیمری های نگهدارنده بسته بندی آب آت سیدنی کاربرد می برد.
 - (۳) در ساخت آن گروه عاملی $-OH$ و $-COOH$ - فرادانی کاربرد دارد.
 - (۴) نوعی پلی استر سنتزی است که به همراه برخی افزودنی ها در قالیچه ها و فرش های بسیار زیاده کاربرد دارد.

۷۷ - ساختار $\left[-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-C_6H_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-CH_2-CH_2-O- \right]_n$ به ... معروف است و واحدهای سازنده آن عبارتند از ... و ... است.

(۱) C_4H_5COOH و C_2H_5OH و PET


(۲) $HO-CH_2-CH_2-OH$ و $COOH-C_6H_4-COOH$



(۳) CH_3-CH_2-OH و CH_3-CH_2-COOH

(۴) $HO-C(=O)-C_6H_4-C(=O)-OH$ و CH_3-CH_2-OH

۷۸ - فرآورده واکنش خنثی سازی چیست؟



(۱) PET یا $\left[-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-C_6H_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-O-CH_2-CH_2-O- \right]_n$

(۲) PET یا $HO-C(=O)-C_6H_4-C(=O)-O-CH_2-CH_2-OH$



(۳) پلی ترفتالات یا $\left[-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-C_6H_4-CH_2-CH_2-O- \right]_n$

(۴) پلی ترفتالات بنزول یا $\left[-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-C_6H_4-CH_2-CH_2-O- \right]_n$





۷۹ - کدام ترتیب درست نام گذاری شده ...



۸۰ - از تغییر نفت خام هم مواد زیر برای تان بدست آورده جز ...

(۱) تترافتالیک اسید (۲) اتیلن (اتن) (۳) متیلن (۴) پارازایلین


۸۱ - ضمن تبدیل پارازایلین به تترافتالیک اسید ...

- (۱) عدد اکسایش هراتم کربن در گروه متیل ۶ درجه افزایش می یابد . و ۶ پیوند C-H کم می شود .
- (۲) گروه متیل به گروه عاملی کربوکسیل COOH - اکسید می شود . لذا به عامل الکنده نیاز است .
- (۳) به حجم مولی آن 90.1 g/mol افزوده می شود و دو پیوند سبز شده جدید حاصل می شود .
- (۴) ۲۶ دارد .

۸۲ - برای تبدیل پارازایلین به تترافتالیک اسید ... بصورت ... با بهره نشناختن خاصیت ...

(۲) نیاسیم پرکسیدات - غلط
(۴) متیلنر (IV) - غلط

(۱) نیاسیم پرکسیدات - رقیق
(۳) متیلنر (IV) - رقیق




- (۱) A پارازایلین است . است . و این واکنش با معرفت و با بهره کم پیش می رود .
- (۲) Mn^{+7} در اینج پرکسیدات کاهش می یابد . برای با بردن بازو این واکنش از کاتالیزور اکسید کننده می گیرند .
- (۳) انرژی فاس می این واکنش به حد زیاد است که با حرارت واکنش پیش می رود .
- (۴) خواص و درجه عمل تترافتالیک اسید ماده اولیه سنتز پلیمری معروف به PET است در ساخت بطری کاربرد دارد .

۸۴ - کدام گزینه درست بیان نشده است ؟

- (۱) اتیلن گلیکول اصلی ده عاملی و ماده اولیه سنتز PET است .
- (۲) برای سنتز اتیلن گلیکول از گاز اتن با جدول در غلظت پرکسیدات می گیرند .
- (۳) واکنش اتیلن گلیکول با تترافتالیک اسید ، پلی تترافتالیک اسید در نتیجه می شود .
- (۴) PET ماده پلیمری سنتزی ماده کاردی و دایرادی دارد و به ندری تحمیل می شود .



۸۵ - در نمودار زیر هر حرف به ماده چه ترکیبی است؟



(۱) اتن = A و پارازیلن = B و تترافتالیک اسید = C

(۲) اتیلن = A و تترافتالیک اسید = B و پارازیلن = C

(۳) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ = A و اتانول = B و تترافتالیک اسید = C

(۴) پارازیلن = A و اتیلن = B و PET = C

۸۶ - چند عبارت در زیر درست است؟

- * پسماند PET تهدیدی جدی برای زندگی روی کره زمین به شمار می آید.
- * شیمی محلول بر سفت پلیمرها به کمک فناوری شیمی نقش مهمی در بازیافت آنها به ماده دارد.
- * پلیاستیک ها یکی از شایع خلاقیت و نوآوری بشر است که در آن فن آوری شیمیایی نقش اساسی دارد.
- * امروزه سالانه حدود ۴۰ میلیارد تن مواد پلیاستیکی در جهان تولید و این روند رو به افزایش است.
- * استفاده بی رویه و بیش از حد پلیمرها در صنایع خاص و زیست تخریب ناپذیری آنها باعث شده تا در تقاطع انرژی و دانش یافت یکی از مواد پلیاستیکی تا بل بازیافت، پلی استیلن ترفتالات است؟

(۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۲

۸۷ - علت اکا بر وسیع پلیاستیک در زندگی چیست؟

- (۱) کلی کمی کم (۲) نفوذ ناپذیری لب به هوا و آب (۳) اوزان بودن و مقاومت در مقابل خوردگی (۴) تمام موارد

۸۸ - چگونه می توان بطری های PET را بازیافت کرد؟

- (۱) مستقیم و غیره از یک بران مجدد بازیافت و با یک دایر جدید
- (۲) تبدیل آن ها به مواد دیگر یا واحد تازه اولیه، یا مواد اولیه معین دارند
- (۳) واکش آن با متانول، و تهیه مواد مفیدی که میتواند برای سفت پلیمرهای جدید به کار رود.
- (۴) تمام موارد.

۸۹ - کدام روش بازیافت در سوال ۸۸ به فناوری شیمیایی پیچیده تری نیاز دارد؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (۵) ۵ (۶) ۶ (۷) ۷ (۸) ۸ (۹) ۹ (۱۰) ۱۰





۹۰- کدام ویژگی در مورد متانول درست نیست؟

- ۱) متانول مایعی بی رنگ، بی بوی و ساده تر از متانول بوده الکلی است.
- ۲) از جویب قابل تهیه است و چون در صنعت گوناگون کاربرد زیادی دارد باید آنرا در مقیاس صنعتی تولید کرد.
- ۳) از واکنش گاز CO و H_2 در شرایط خاص و در حضور کاتالیزور تهیه و پس از سرانه مجموع ضریب در آن ۵ است.
- ۴) نسبت غلظت کته فرای نامیونی به پیوندی در آن $\frac{۲}{۵}$ است. مگر در آن را در آن گشت و در دقت و بهر گشتی در آن چل شود.

۹۱- خنید عبادت در پیوسته است؟

- * مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه متانول در صنعت ، از نفت خام می آید آن با تقطیر فرای به فرای است آورد.
- * مواد CO و H_2 در صنعت نیستند لذا باید ابتدا آنرا را تولید و پس به متانول تبدیل کرد.
- * ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت متانول را می توان از واکنش گاز متان با بخار آب به دست آورد.
- * گاز متان قیمت عمده گاز طبیعی را تشکیل میدهد و در میدان های نفتی به فرای یافت می شود.
- * برای افزایش ایمنی و جلوگیری از انفجار قیمت عمده گاز CH_4 را در میدان های نفتی می سوزانند.
- * از آنجا که گاز متان سیر شده است ، واکنش پذیری کمی داشته لذا فرای تبدیل آن به متانول به واکنش فرای پیچیده نیاز دارد.

۳ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۶ (۱)

۹۲- به چه دلیل تبدیل متان به متانول از اهمیت خاصی برخوردار است؟

- ۱) از آن برون گاز متان
- ۲) کاربرد صنعتی متانول در صنعت گوناگون
- ۳) در شرایط خاص تهیه متانول از متان
- ۴) مورد ۱ و ۲

۹۳- در واکنش های قابل هر حرف نهاییه چیست؟

$$\text{I) } A + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{50.5-55.5^\circ\text{C}} \text{CO} + \text{H}_2 \xrightarrow[3.5-5.0 \text{ atm}]{\text{کاتالیزور}} \text{C}$$


۱) $A = \text{CH}_4$ ، $C = \text{CH}_3\text{OH}$ و $B = \text{CH}_4$

۲) $A = \text{CO}_2$ ، $C = \text{CH}_3\text{OH}$ و $B = \text{CH}_4$

۳) $A = \text{C}_2\text{H}_6$ ، $C = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ و $B = \text{CH}_4$

۴) $A = \text{CH}_3\text{OH}$ ، $B = \text{CH}_4$ و $C = \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

۹۴- در تبدیل متان به متانول تغییر عدد اکسایش کربن چگونه است؟


۴ (۴)

۸ (۳)

۲ (۲)




۶ (۱)

۹۵- عدد اکسایش کربن در متانول و متان ... است





۹۶- کدام گزینه A اکسید نیست ؟



۹۷- یک دانش شیمیایی زمانی از دیدگاه اتمی به صورتی تراست که

(۲) آنرا آورده فعلی را ترس باشد.

(۱) اتم ها مواد را تشکیل دهند و از آن ترس باشند.


(۳) شمار بیشتری از اتم ها را تشکیل دهند به تعدادی که در صورت تبدیل شود. (۴) بازده درصدی را کمتر از ۵۰ باشد.

۹۸- کدام گزینه مزیت تولید مستقیم متانول از متان را درست بیان میکند ؟

(۴) ۲۶ بار

(۳) بازده بالاتر

(۲) ۵۰ درصد به جابجایی و اکسیداسیون



۹۹- به توجه به دانش های قبلی می توان گفت :




(۱) در دانش (۱) اتم C در CO اکسید است.

(۲) در دانش (۲) اتم ها H در H₂O کاهش یافته است.


(۳) آنرا آورده دانش (۲) ماده اولیه تهیه متانول است.

(۴) مورد ۱ و ۲

۱۰۰- اگر در فرآیندهای قبلی ۸ و ۷ بهمانه ولی Z حاصل باشد



و هدف تهیه ماده A باشد می توان گفت :



(۱) از دیدگاه اصول شیمی سینر دانش (۱) از دیدگاه اتمی هر دو اقتصاد دار و چون هم اتم ها به مواد سودمند تبدیل شده اند.

(۲) دانش (۲) بهمانه دارد لذا از نظر اقتصاد اتمی نسبت به (۱) ساده تر است.

(۳) در دانش (۱) به حذف ۲ اتمی کربن کاهش یافته است.

(۴) مورد ۱ و ۲

۱۰۱- کدام گزینه عبارت درستی بیان نمی کند .


(۱) تبدیل کاهش مصرف انرژی صرف فیزیکی یعنی استفاده از کاتالیز در صنعت مختلف ، به کاهش انرژی مصرف می شود.

(۲) چون در تداخل های گازها با افزایش دما و فشار ، بهمانه از دست می دهد و به جای آن می شود مقدار K نیز کمتر می شود.

(۳) اغلب دانش های کربن با افزایش دما و فشار ، ترکیب آن بیشتر می شود از نوع اکسیداسیون کاهش است.

(۴) در صنعتی که $2NO_2 \rightleftharpoons 2NO + O_2$ در دمای ثابت با کاهش حجم مقدار NO_2 افزایش ولی مقدار K ثابت می ماند.





۱۰۲ - ثابت ماندن کدام خاصیت کارگرایی زیر خواص تعادل در سامانه



(۱) ثابت ماندن فشار

(۲) ثابت شدن رنگ


(۳) دوبرابر شدن مولکول NO_2 نسبت به N_2O_4

(۴) دوبرابر شدن

۱۰۳ - سطح انرژی را تعیین فرآورده ها در کدام فرآیند از دانش دهنده ها بالاتر است ؟



۱۰۴ - با توجه به ترتیب مقادیر کدنگ فرآیند عبارت رستی بیان می کنند



(۱)


(۱) نسبت عدد اکسایش کربن ۱ به ۳ برابر $\frac{3}{1}$ است

(۲) در تبدیل ترتیب (۱) به ترتیب اکسید عدد اکسایش کربن ۳ و ۱ و ۳ و ۱ است

(۳) اگر ترتیب (۱) اکسید شود به یک دی استر تبدیل می شود

(۴) از دانش یک دی استر باید الکل می توان یک دی استر تهیه کرد

۱۰۵ - الکل را اسید سارنیک دی استر $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}(=\text{O}) - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) - \text{O} - \text{CH}_3$ کدام هستند



۱۰۶ - در ظرف یک لیتری ۳ مول A تا به تعادل تبدیل می شود $A + 9 \rightleftharpoons 1B + 2C$ اگر در ظرف ۱۰ لیتری تعادل ۲ مول B در ظرف باشد مقدار عددی K ثابت تعادل مقدار است ؟

(۴) ۲۵

(۳) ۴

(۲) ۹/۲۵

(۱) ۸

۱۰۷ - تعادل گازی $A + B \rightleftharpoons 2AB$ در ظرف ۱۰ لیتری تعادل ۲۰ مول A و ۲۰ مول B در ظرف باشد مقدار AB ضمیمه است ؟ (۱) ۰.۱ (۲) ۰.۲ (۳) ۰.۱ (۴) ۰.۲

۱۰۸ - ۰.۹ مول SO_3 در ظرف بسته تعادل $2\text{SO}_3 \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$ قرار می دهیم اگر با تغییر تعادل ۰.۳ مول O_2 در ظرف باشد حجم ظرف آنرا چقدر تغییر می دهد ؟

(۴) ۶

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲





۱۰۹- اگر ۲٫۴ مول HI در ظرف در بسته یک لیتری تا بفرزای تبادل گازی $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ قرارت بدهیم پس
 از تجزیه ۲٫۴ مول از آن تبادل بفرار شود ، ثابت تعادل در شرایط آزمایش چقدر است ؟
 (۱) ۰٫۴ (۲) ۰٫۳ (۳) ۰٫۱ (۴) ۰٫۲

۱۱۰- اگر در تعادل گازی $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ در یک ظرف دو لیتری مقدار آمونیاک و نیتروژن و هیدروژن
 به ترتیب ۳۴ ، ۲۸ و ۸ گرم باشد مقدار عددی K در این دما چقدر است ؟
 N=۱۴ ، H=۱

(۱) 1.5×10^{-3} (۲) 2.5×10^{-3} (۳) 2×10^{-2} (۴) 4×10^{-2}

۱۱۱- در تعادل گازی $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ در دمای معینی غلظت H_2 و I_2 یکسان و برابر از غلظت HI
 است ، ثابت تعادل در آن دما کدام است ؟

(۱) 1×10^{-2} (۲) 1×10^{-2} (۳) 2×10^{-2} (۴) 2×10^{-2}

۱۱۲- ۳ مول جسم A را در یک ظرف در بسته تا تعادل گازی $2A \rightleftharpoons B + 3C$ قرار می دهیم ، هرگاه
 مجموع مول های در حال تعادل برابر ۰٫۵ باشد تعداد مول های باقی مانده از ماده A چقدر است ؟

(۱) ۰٫۱ (۲) ۰٫۲ (۳) ۰٫۳ (۴) ۰٫۴

۱۱۳- ۱٫۹ مول گاز NOCl در ظرف در بسته یک لیتری گرم می دهیم تا تعادل گازی $2NOCl \rightleftharpoons 2NO + Cl_2$
 برقرار شود ، اگر در حالت تعادل ۰٫۹ مول NOCl تجزیه شده باشد ، مقدار عددی K در این دما کدام است ؟

(۱) 2.128×10^{-2} (۲) 5.25×10^{-3} (۳) 3.7645×10^{-4} (۴) 3.735×10^{-2}



نام :

نام خانوادگی :

مقطع / رشته :

شماره آزمون :

نام آزمون :

توجه : کل محل مورد نظر را با مداد مشکی نرم طوری پررنگ کنید که شماره داخل آن دیده نشود .

۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹


۱	۱	۲	۳	۴	۵۱	۱	۲	۳	۴	۱۰۱	۱	۲	۳	۴	۱۵۱	۱	۲	۳	۴	۲۰۱	۱	۲	۳	۴	۲۵۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴	۵۲	۱	۲	۳	۴	۱۰۲	۱	۲	۳	۴	۱۵۲	۱	۲	۳	۴	۲۰۲	۱	۲	۳	۴	۲۵۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴	۵۳	۱	۲	۳	۴	۱۰۳	۱	۲	۳	۴	۱۵۳	۱	۲	۳	۴	۲۰۳	۱	۲	۳	۴	۲۵۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴	۵۴	۱	۲	۳	۴	۱۰۴	۱	۲	۳	۴	۱۵۴	۱	۲	۳	۴	۲۰۴	۱	۲	۳	۴	۲۵۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴	۵۵	۱	۲	۳	۴	۱۰۵	۱	۲	۳	۴	۱۵۵	۱	۲	۳	۴	۲۰۵	۱	۲	۳	۴	۲۵۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴	۵۶	۱	۲	۳	۴	۱۰۶	۱	۲	۳	۴	۱۵۶	۱	۲	۳	۴	۲۰۶	۱	۲	۳	۴	۲۵۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴	۵۷	۱	۲	۳	۴	۱۰۷	۱	۲	۳	۴	۱۵۷	۱	۲	۳	۴	۲۰۷	۱	۲	۳	۴	۲۵۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴	۵۸	۱	۲	۳	۴	۱۰۸	۱	۲	۳	۴	۱۵۸	۱	۲	۳	۴	۲۰۸	۱	۲	۳	۴	۲۵۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴	۵۹	۱	۲	۳	۴	۱۰۹	۱	۲	۳	۴	۱۵۹	۱	۲	۳	۴	۲۰۹	۱	۲	۳	۴	۲۵۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴	۶۰	۱	۲	۳	۴	۱۱۰	۱	۲	۳	۴	۱۶۰	۱	۲	۳	۴	۲۱۰	۱	۲	۳	۴	۲۶۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴	۶۱	۱	۲	۳	۴	۱۱۱	۱	۲	۳	۴	۱۶۱	۱	۲	۳	۴	۲۱۱	۱	۲	۳	۴	۲۶۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴	۶۲	۱	۲	۳	۴	۱۱۲	۱	۲	۳	۴	۱۶۲	۱	۲	۳	۴	۲۱۲	۱	۲	۳	۴	۲۶۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴	۶۳	۱	۲	۳	۴	۱۱۳	۱	۲	۳	۴	۱۶۳	۱	۲	۳	۴	۲۱۳	۱	۲	۳	۴	۲۶۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴	۶۴	۱	۲	۳	۴	۱۱۴	۱	۲	۳	۴	۱۶۴	۱	۲	۳	۴	۲۱۴	۱	۲	۳	۴	۲۶۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴	۶۵	۱	۲	۳	۴	۱۱۵	۱	۲	۳	۴	۱۶۵	۱	۲	۳	۴	۲۱۵	۱	۲	۳	۴	۲۶۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴	۶۶	۱	۲	۳	۴	۱۱۶	۱	۲	۳	۴	۱۶۶	۱	۲	۳	۴	۲۱۶	۱	۲	۳	۴	۲۶۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴	۶۷	۱	۲	۳	۴	۱۱۷	۱	۲	۳	۴	۱۶۷	۱	۲	۳	۴	۲۱۷	۱	۲	۳	۴	۲۶۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴	۶۸	۱	۲	۳	۴	۱۱۸	۱	۲	۳	۴	۱۶۸	۱	۲	۳	۴	۲۱۸	۱	۲	۳	۴	۲۶۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴	۶۹	۱	۲	۳	۴	۱۱۹	۱	۲	۳	۴	۱۶۹	۱	۲	۳	۴	۲۱۹	۱	۲	۳	۴	۲۶۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴	۷۰	۱	۲	۳	۴	۱۲۰	۱	۲	۳	۴	۱۷۰	۱	۲	۳	۴	۲۲۰	۱	۲	۳	۴	۲۷۰	۱	۲	۳	۴
۲۱	۱	۲	۳	۴	۷۱	۱	۲	۳	۴	۱۲۱	۱	۲	۳	۴	۱۷۱	۱	۲	۳	۴	۲۲۱	۱	۲	۳	۴	۲۷۱	۱	۲	۳	۴
۲۲	۱	۲	۳	۴	۷۲	۱	۲	۳	۴	۱۲۲	۱	۲	۳	۴	۱۷۲	۱	۲	۳	۴	۲۲۲	۱	۲	۳	۴	۲۷۲	۱	۲	۳	۴
۲۳	۱	۲	۳	۴	۷۳	۱	۲	۳	۴	۱۲۳	۱	۲	۳	۴	۱۷۳	۱	۲	۳	۴	۲۲۳	۱	۲	۳	۴	۲۷۳	۱	۲	۳	۴
۲۴	۱	۲	۳	۴	۷۴	۱	۲	۳	۴	۱۲۴	۱	۲	۳	۴	۱۷۴	۱	۲	۳	۴	۲۲۴	۱	۲	۳	۴	۲۷۴	۱	۲	۳	۴
۲۵	۱	۲	۳	۴	۷۵	۱	۲	۳	۴	۱۲۵	۱	۲	۳	۴	۱۷۵	۱	۲	۳	۴	۲۲۵	۱	۲	۳	۴	۲۷۵	۱	۲	۳	۴
۲۶	۱	۲	۳	۴	۷۶	۱	۲	۳	۴	۱۲۶	۱	۲	۳	۴	۱۷۶	۱	۲	۳	۴	۲۲۶	۱	۲	۳	۴	۲۷۶	۱	۲	۳	۴
۲۷	۱	۲	۳	۴	۷۷	۱	۲	۳	۴	۱۲۷	۱	۲	۳	۴	۱۷۷	۱	۲	۳	۴	۲۲۷	۱	۲	۳	۴	۲۷۷	۱	۲	۳	۴
۲۸	۱	۲	۳	۴	۷۸	۱	۲	۳	۴	۱۲۸	۱	۲	۳	۴	۱۷۸	۱	۲	۳	۴	۲۲۸	۱	۲	۳	۴	۲۷۸	۱	۲	۳	۴
۲۹	۱	۲	۳	۴	۷۹	۱	۲	۳	۴	۱۲۹	۱	۲	۳	۴	۱۷۹	۱	۲	۳	۴	۲۲۹	۱	۲	۳	۴	۲۷۹	۱	۲	۳	۴
۳۰	۱	۲	۳	۴	۸۰	۱	۲	۳	۴	۱۳۰	۱	۲	۳	۴	۱۸۰	۱	۲	۳	۴	۲۳۰	۱	۲	۳	۴	۲۸۰	۱	۲	۳	۴
۳۱	۱	۲	۳	۴	۸۱	۱	۲	۳	۴	۱۳۱	۱	۲	۳	۴	۱۸۱	۱	۲	۳	۴	۲۳۱	۱	۲	۳	۴	۲۸۱	۱	۲	۳	۴
۳۲	۱	۲	۳	۴	۸۲	۱	۲	۳	۴	۱۳۲	۱	۲	۳	۴	۱۸۲	۱	۲	۳	۴	۲۳۲	۱	۲	۳	۴	۲۸۲	۱	۲	۳	۴
۳۳	۱	۲	۳	۴	۸۳	۱	۲	۳	۴	۱۳۳	۱	۲	۳	۴	۱۸۳	۱	۲	۳	۴	۲۳۳	۱	۲	۳	۴	۲۸۳	۱	۲	۳	۴
۳۴	۱	۲	۳	۴	۸۴	۱	۲	۳	۴	۱۳۴	۱	۲	۳	۴	۱۸۴	۱	۲	۳	۴	۲۳۴	۱	۲	۳	۴	۲۸۴	۱	۲	۳	۴
۳۵	۱	۲	۳	۴	۸۵	۱	۲	۳	۴	۱۳۵	۱	۲	۳	۴	۱۸۵	۱	۲	۳	۴	۲۳۵	۱	۲	۳	۴	۲۸۵	۱	۲	۳	۴
۳۶	۱	۲	۳	۴	۸۶	۱	۲	۳	۴	۱۳۶	۱	۲	۳	۴	۱۸۶	۱	۲	۳	۴	۲۳۶	۱	۲	۳	۴	۲۸۶	۱	۲	۳	۴
۳۷	۱	۲	۳	۴	۸۷	۱	۲	۳	۴	۱۳۷	۱	۲	۳	۴	۱۸۷	۱	۲	۳	۴	۲۳۷	۱	۲	۳	۴	۲۸۷	۱	۲	۳	۴
۳۸	۱	۲	۳	۴	۸۸	۱	۲	۳	۴	۱۳۸	۱	۲	۳	۴	۱۸۸	۱	۲	۳	۴	۲۳۸	۱	۲	۳	۴	۲۸۸	۱	۲	۳	۴
۳۹	۱	۲	۳	۴	۸۹	۱	۲	۳	۴	۱۳۹	۱	۲	۳	۴	۱۸۹	۱	۲	۳	۴	۲۳۹	۱	۲	۳	۴	۲۸۹	۱	۲	۳	۴
۴۰	۱	۲	۳	۴	۹۰	۱	۲	۳	۴	۱۴۰	۱	۲	۳	۴	۱۹۰	۱	۲	۳	۴	۲۴۰	۱	۲	۳	۴	۲۹۰	۱	۲	۳	۴
۴۱	۱	۲	۳	۴	۹۱	۱	۲	۳	۴	۱۴۱	۱	۲	۳	۴	۱۹۱	۱	۲	۳	۴	۲۴۱	۱	۲	۳	۴	۲۹۱	۱	۲	۳	۴
۴۲	۱	۲	۳	۴	۹۲	۱	۲	۳	۴	۱۴۲	۱	۲	۳	۴	۱۹۲	۱	۲	۳	۴	۲۴۲	۱	۲	۳	۴	۲۹۲	۱	۲	۳	۴
۴۳	۱	۲	۳	۴	۹۳	۱	۲	۳	۴	۱۴۳	۱	۲	۳	۴	۱۹۳	۱	۲	۳	۴	۲۴۳	۱	۲	۳	۴	۲۹۳	۱	۲	۳	۴
۴۴	۱	۲	۳	۴	۹۴	۱	۲	۳	۴	۱۴۴	۱	۲	۳	۴	۱۹۴	۱	۲	۳	۴	۲۴۴	۱	۲	۳	۴	۲۹۴	۱	۲	۳	۴
۴۵	۱	۲	۳	۴	۹۵	۱	۲	۳	۴	۱۴۵	۱	۲	۳	۴	۱۹۵	۱	۲	۳	۴	۲۴۵	۱	۲	۳	۴	۲۹۵	۱	۲	۳	۴
۴۶	۱	۲	۳	۴	۹۶	۱	۲	۳	۴	۱۴۶	۱	۲	۳	۴	۱۹۶	۱	۲	۳	۴	۲۴۶	۱	۲	۳	۴	۲۹۶	۱	۲	۳	۴
۴۷	۱	۲	۳	۴	۹۷	۱	۲	۳	۴	۱۴۷	۱	۲	۳	۴	۱۹۷	۱	۲	۳	۴	۲۴۷	۱	۲	۳	۴	۲۹۷	۱	۲	۳	۴
۴۸	۱	۲	۳	۴	۹۸	۱	۲	۳	۴	۱۴۸	۱	۲	۳	۴	۱۹۸	۱	۲	۳	۴	۲۴۸	۱	۲	۳	۴	۲۹۸	۱	۲	۳	۴
۴۹	۱	۲	۳	۴	۹۹	۱	۲	۳	۴	۱۴۹	۱	۲	۳	۴	۱۹۹	۱													



••• وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (سورة النجم، آیه ۳۹) •••
و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره‌ای) نیست.

پاسخ خودآزمایی‌ها، با هم بیندیشیم‌ها و تمرینات دوره‌ای فصل چهارم شیمی
دوازدهم

۱- نمودار زیر غلظت برخی از این آلاینده‌ها را در نمونه‌ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد.



آ) مقدار این آلاینده‌ها بین چه ساعت‌هایی از شبانه‌روز به بیشترین حد خود می‌رسد؟
از ساعت‌های اولیه صبح تا ساعت دو بعد از ظهر


ب) چرا هوای آلوده به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود؟ به علت حضور گاز NO_2

پ) چرا با کاهش مقدار گاز NO_2 ، مقدار گاز O_3 ، رو به افزایش است؟
به علت انجام واکنش:

نور خورشید



۲- در شیمی ۱، آموختید که آلاینده‌های زیر در خروجی آگروز خودروها وجود دارند.



آ) پیدایش گازهای کربن مونوکسید، گوگرد دی اکسید و نیتروژن مونوکسید را با نوشتن معادله شیمیایی موازنه شده توجیه کنید.


کربن مونوکسید به علت سوختن ناقص سوخت خودروها برای مثال:



ب) دلیل وجود هیدروکربن‌ها در گازهای خروجی از آگروز را توضیح دهید.

برخی هیدروکربن‌های فرار بدون اینکه وارد واکنش سوختن شوند از آگروز خودرو خارج می‌شوند.

با توجه به نمودارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.




آ) گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از واکنش ها را مشخص کنید. پاسخ خود را توضیح دهید.
 در واکنش گرماده سطح انرژی فراورده ها از واکنش دهنده ها پایین تر است
 در واکنش گرماگیر سطح انرژی فراورده ها از واکنش دهنده ها بالا تر است.
 کدام واکنش در شرایط یکسان سریع تر انجام می شود؟ چرا؟ (۳)

در شرایط یکسان هر چه انرژی فعال سازی واکنش کمتر باشد آن واکنش سریع تر انجام می شود.

پ) فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد. با توجه به این واقعیت کدام نمودار به کدام واکنش مربوط است؟ چرا؟

هر چه انرژی فعال سازی واکنشی کمتر باشد آن واکنش در دمای پایین تر و راحت تر انجام می شود
 بنا بر این نمودار ۲ مربوط به فسفر سفید و نمودار یک مربوط به هیدروژن است.



۱- جدول زیر برخی داده‌ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.


شرایط آزمایش	دما ($^{\circ}\text{C}$)	سرعت واکنش	آنتالپی واکنش (kJ)
بدون حضور کاتالیزگر	۲۵	ناچیز	-۵۷۲
ایجاد جرقه در مخلوط	۲۵	انفجاری	-۵۷۲
در حضور پودر روی	۲۵	سریع	-۵۷۲
در حضور توری پلاتینی	۲۵	انفجاری	-۵۷۲

ا) توضیح دهید چرا این واکنش در دمای اتاق بدون حضور کاتالیزگر انجام نمی‌شود؟
از آن جا که انرژی فعال سازی این واکنش زیاد است بدون کاتالیزگر در دمای اتاق انجام نمی‌شود.

ب) نقش جرقه در انجام واکنش چیست؟ تامین انرژی فعال سازی

پ) نقش پودر روی و توری پلاتینی در این واکنش چیست؟

۲- هر یک از نمودارها را به کدام شرایط واکنش می‌توان نسبت داد؟ توضیح دهید.



در واکنش سه و چهار کاتالیزگرها سطح انرژی فعال سازی را کاهش داده و باعث افزایش سرعت و واکنش می‌شوند. از آن جا که واکنش چهارم انفجاری و سریع تر است پس نمودار E_{a3} مربوط به حضور توری پلاتینی است

۳- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت داده شده را کامل کنید.

کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ~~افزایش~~ ^{کاهش} انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را ~~افزایش~~ ^{کاهش} می دهد، اما آنتالپی واکنش ~~افزایش می یابد~~ ^{ثابت می ماند}.

با هم بیندیشیم ص ۹۷

۱- برای حذف آلاینده های موجود در اگزوز خودروها (CO ، NO ، C_xH_y) قطعه ای را در مسیر خروج گازها قرار می دهند. با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید.




آ) هر آلاینده پس از عبور از قطعه A به چه فراورده ای تبدیل می شود؟


ب) معادله شیمیایی حذف هر یک از آلاینده ها را بنویسید و موازنه کنید.



۲- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) چرا این واکنش‌ها در دماهای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند؟
 با توجه به اینکه انرژی فعال‌سازی آن‌ها بزرگ است. در دمای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند.
 ب) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید.



۳- جدول زیر مقدار این آلاینده‌ها را در حضور و غیاب قطعه A نشان می‌دهد. با توجه به آن

پیش‌بینی کنید نقش این قطعه چیست؟ کاتالیزگر

NO	C ₂ H ₂	CO	فرمول شیمیایی آلاینده	
۱/۰۴	۱/۶۷	۵/۹۹	در غیاب قطعه A	مقدار آلاینده بر حسب گرم به ازای طی یک کیلومتر
۰/۰۴	۰/۰۷	۰/۶۱	در حضور قطعه A	

پ) تجربه نشان می‌دهد که کارایی قطعه A به نوع کاتالیزگرهای موجود در آن بستگی دارد.
 این قطعه محتوی سه نوع کاتالیزگر است. با این توصیف کدام عبارت زیر درست است؟ چرا؟

- آ) هر کاتالیزگر می‌تواند به همه واکنش‌ها سرعت ببخشد. ☒
- ب) هر کاتالیزگر به شمار معدودی واکنش سرعت می‌بخشد. ☒

هر کاتالیزگر به طور اختصاصی و انتخابی عمل کرده و شمار معدودی از واکنش‌ها را سرعت می‌بخشد نه همه را

۱- با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از آگروز خودروها به هنگام روشن و گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای CO ، NO ، C_xH_y بیشتری مشاهده می شود.

آ) دلیل این پدیده را توضیح دهید. در دمای پایین سرعت واکنش های شیمیایی کم تر است. بنابراین در خروجی آگروز خودروها آلاینده های بیشتری مشاهده می شود.

ب) چه راهکاری برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می کنید؟

بالا بردن دمای محدوده انجام واکنش (قطعه ی مبدل کاتالیستی) به کمک یک گرمکن الکتریکی.
۲- درباره درستی جمله های زیر گفت و گو کنید.

• کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل می کند.

درست: یک کاتالیزگر نمی تواند همه ی واکنش ها را سرعت بخشد.


• در حضور کاتالیزگر نباید واکنش های ناخواسته دیگری انجام شود.

درست: تا مواد مضر ناخواسته تولید نشود.

• کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد.

درست: تا بتوان از آن ها برای مدت طولانی استفاده کرد.

با توجه به معادله واکنش تعادلی تولید گاز آمونیاک و عبارت ثابت تعادل آن به پرسش ها پاسخ دهید.



آ) توضیح دهید چگونه می توان از روی معادله یک واکنش، عبارت ثابت تعادل را برای آن

نوشت؟

صورت ثابت تعادل: حاصل ضرب غلظت های تعادلی فراورده ها که در آن غلظت هر فراورده به توان ضریب استوکیومتری خود می رسد.


مخرج ثابت تعادل: حاصل ضرب غلظت های تعادلی واکنش دهنده ها که در آن غلظت هر واکنش دهنده به توان ضریب استوکیومتری خود می رسد.

ب) جدول صفحه بعد غلظت تعادلی گونه ها را در دمای معینی برای این واکنش نشان

می دهد. با محاسبه K ، مشخص کنید میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است یا زیاد؟ کم: از آن جا که مقدار ثابت تعادل در این دما عدد کوچکی است می توان نتیجه گرفت صورت کسر یعنی قسمت چرا؟ مربوط به فراورده ها عدد کوچکتری نسبت به واکنش دهنده ها باشد. و در واقع واکنش پیشرفت کمی داشته است.


$[\text{NH}_3]$	$[\text{H}_2]$	$[\text{N}_2]$	K
۰/۰۲	۰/۵	۱۲۰	۰/۰۸ mol ⁻² .L ²

در محفظه‌ای به حجم یک لیتر، تعادل زیر در دمای 200°C برقرار است.



شکل زیر افزودن مقداری نیتروژن را به این سامانه در دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به

شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱- جدول زیر را کامل کنید.

کمیت	تعداد	$[\text{NH}_3]$	$[\text{H}_2]$	$[\text{N}_2]$	K
۱		.14 mol/L NH_3	.5 mol/L H_2	.07 mol/L N_2	$2.24 \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}$
۲		.16 mol/L NH_3	.47 mol/L H_2	.11 mol/L N_2	$2.24 \text{ mol}^2 \cdot \text{L}^{-2}$

۲- غلظت کدام مواد در تعادل (۲) در مقایسه با تعادل (۱) افزایش یافته است؟

غلظت آمونیاک و نیتروژن

۳- با افزودن $\text{N}_2(\text{g})$ به تعادل (۱) واکنش در چه جهتی پیش رفته است تا به تعادل جدید

برسد؟ چرا؟ در جهت رفت و تولید آمونیاک، (مصرف نیتروژن)


۴- K در این آزمایش چه تغییری کرده است؟ از این ویژگی چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ثابت مانده است، نتیجه گرفته می‌شود تغییر غلظت مواد موجود در تعادل تاثیری بر روی ثابت تعادل ندارد

۵- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که در دمای ثابت، غلظت یکی از مواد شرکت کننده در سامانه تعادلی ~~کاهش~~ افزایش یابد، واکنش در جهت ~~تولید~~ مصرف آن تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید ~~آغاز~~ برسد.

واکنش تعادلی زیر در سامانه‌ای با حجم و دمای ثابت برقرار است. با هر یک از تغییرهای زیر تعادل در چه جهتی جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟



(آ) خارج کردن مقداری گاز آمونیاک از سامانه

واکنش در جهت تولید آمونیاک پیش می‌رود تا در حد امکان با اثر کاهش غلظت آمونیاک مقابله کند

(ب) وارد کردن مقداری گاز هیدروژن در سامانه


واکنش در جهت مصرف گاز هیدروژن پیش می‌رود تا در حد امکان با اثر افزایش غلظت هیدروژن مقابله کند.



(f)

۱- اگر در سامانه (آ) شکل ۷، پیستون بیرون کشیده شود تا در دمای ثابت حجم آن افزایش

یابد:



(آ) پیش‌بینی کنید تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟ در جهت برگشت

با افزایش حجم فشار کاهش یافته بنابراین تعادل به سمت مول‌گازی بیشتر جابه‌جا می‌شود تا اثر کاهش حجم تا حد امکان جبران شود


(ب) با این تغییر، شمار مول‌های آمونیاک چه تغییری می‌کند؟ کاهش می‌یابد

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که در دمای ثابت، فشار بر یک تعادل گازی افزایش می‌یابد، واکنش در جهت کاهش

شمار مول‌های گازی کمتر پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.

۳- پیش‌بینی کنید در دمای ثابت با افزایش فشار بر سامانه تعادلی زیر:




(آ) شمار مول‌های هر یک از مواد شرکت‌کننده چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ ثابت می‌ماند، چون شمار مول‌گازی دو طرف واکنش برابر است

(ب) غلظت مولی هر یک از مواد شرکت‌کننده چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ افزایش می‌یابد،

غلظت برابر است با تعداد مول تقسیم بر حجم، با افزایش فشار (یا به عبارتی کاهش حجم) شمار مول‌ها ثابت اما حجم کاهش یافته بنابراین غلظت نیز افزایش می‌یابد

۱- جدول داده شده اثر دما را بر ثابت تعادل زیر نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



دما (°C)	۲۵	۲۲۵	۴۳۵
K	$2/5 \times 10^{-25}$	4×10^{-11}	4×10^{-5}

$$K = \frac{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$$

آ) عبارت ثابت تعادل را برای آن بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟
دمای ۴۳۵ زیرا ثابت تعادل در این دما عدد بزرگتری است. به این معنا که واکنش در این دما به سمت تولید فراورده پیشرفت بیشتری داشته است.

پ) با افزایش دما K چه تغییری کرده است؟ این تغییر، جابه‌جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می‌دهد؟
با افزایش دما ثابت تعادل نیز افزایش یافته است.

این نشان دهنده‌ی جابه‌جایی تعادل به سمت راست یا فراورده‌ها با افزایش دما است.

ت) اگر برای این واکنش $\Delta H > 0$ باشد، جابه‌جا شدن تعادل و افزایش K را به کمک اصل





از آنجا که این واکنش گرماگیر است با بالا بردن دما و گرما دادن به واکنش تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت رفت پیش می‌رود تا با تغییر اعمال شده در حد امکان مقابله کند.

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

هنگامی که دمای یک سامانه تعادلی افزایش می‌یابد، واکنش در جهت ~~مصرف~~ گرما ~~تولید~~ پیش

می‌رود، اگر این واکنش گرماگیر باشد مقدار ~~فراورده‌ها~~ واکنش‌دهنده‌ها در سامانه کاهش می‌یابد.

۳- نمودار زیر درصد مولی آمونیاک را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می دهد. باتوجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.



آ) با افزایش دما درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می کند؟ کاهش می یابد

ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ گرماده
با افزایش دما واکنش در جهت مصرف آمونیاک یعنی در جهت برگشت جابه جا شده است پس q در سمت راست معادله قرار دارد و واکنش گرماده است.

پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای ۲۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس به صورت زیر است.


$$K_1 = \frac{6}{400} \times 10^{-4} \quad , \quad K_2 = \frac{6}{200} \times 10^{-4} \quad , \quad K_3 = \frac{6}{25} \times 10^{-4}$$

کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می دهد؟ توضیح دهید.

با توجه به گرماده بودن واکنش با افزایش دما ثابت تعادل کوچکتر می شود بنا براین :

$$K_3 = \frac{6}{25} \times 10^{-4}$$

با توجه به شکل زیر که شمایی از فناوری تولید آمونیاک به روش هابر را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) در مورد روش کار هابر در این فناوری با یکدیگر گفت‌وگو کنید.

دمای بهینه با حضور کاتالیزگر برای انجام واکنش تولید آمونیاک 450°C درجه سانتی‌گراد است بنابراین با استفاده از یک گرم‌کننده این دما را تامین می‌کنند. همچنین برای جدا سازی آمونیاک باید مخلوط واکنش را سرد کرد بنابراین از سیستم سرد کننده جهت کاهش دما استفاده می‌شود. با خروج آمونیاک از محفظه ی واکنش طبق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت رفت یعنی تولید آمونیاک پیش می‌رود. در این سیستم گازهای نیتروژن و هیدروژنی که واکنش نداده‌اند را دوباره به محفظه ی واکنش برمی‌گردانند.

ب) اگر نقطه جوش آمونیاک، نیتروژن و هیدروژن به ترتیب -33°C ، -196°C و -253°C درجه سلسیوس باشد، کدام دما -40°C یا -200°C را برای سردکننده مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید. باید دمایی انتخاب شود که در آن فقط آمونیاک به حالت مایع باشد تا جداسازی راحت‌تر انجام شود

با توجه به شکل زیر که قیمت تقریبی نفت خام و چند فراورده نفتی را نشان می‌دهد به پرسش‌ها پاسخ دهید.



ریال $1L = 10000$



ریال $159L = 2940000$



ریال $1Kg = 60000$



ریال $1L = 405000$



ریال $1ton = 2940000$



ریال $1L = 60000$

آ) جدول زیر را کامل کنید.

نام ماده	نفت خام	بنزین	متانول	اتیلن گلیکول	پلی اتن	اتانول
159L	159L	1kg	159L	1kg	159L	159L
قیمت ۱۵۹ لیتر یا کیلوگرم (ریال)	۲۹۴۰۰۰۰	۱۵۹۰۰۰۰	۲۹۴۰	۶۴۳۹۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۹۵۴۰۰۰۰

ب) درباره جمله زیر گفت‌وگو کنید.

«به‌کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره‌وری

اقتصاد یک کشور می‌شود.»

با تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور می‌توان مواد اولیه بسیاری از صنایع را در داخل همان کشور تولید و از بسیاری از هزینه‌های واردات و حمل و نقل و ... صرفه جویی نمود. همچنین فناوری تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده در داخل یک کشور باعث افزایش اشتغال زایی و عدم وابستگی به دیگر کشورها هم می‌شود.


خود را بیازمایید ص ۱۱۲

در نمودار زیر جاهای خالی را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.



خود را بیازمایید ص ۱۱۳

فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش‌ها




پاسخ دهید.


(آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟ پلی استر

با توجه به ساختار آن مشخص است که مونومرهای سازنده ی آن یک اسید و یک الکل دو عاملی می باشد


(ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید.



۱- بررسی‌ها نشان می‌دهند که از تقطیر نفت خام می‌توان مواد زیر را به‌دست آورد.




با بررسی فرمول‌های ساختاری زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.




(آ) برای تهیه ترفتالیک اسید از پارازایلین، چه تغییری باید در ساختار پارازایلین ایجاد کرد؟
 دو شاخه‌ی متیل در پارازایلین باید به گروه عاملی کربوکسیل (عامل اسیدی) تبدیل شوند
 (ب) عدد اکسایش اتم‌های کربن ستاره دار را در این دو ترکیب تعیین کنید.
 (پ) با توجه به آموخته‌های خود درباره واکنش‌های اکسایش-کاهش، برای تبدیل پارازایلین به ترفتالیک اسید کدام دسته از مواد زیر را مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید.

● اکسنده‌ها ○ کاهنده‌ها

ما ماده‌ای می‌خواهیم که کربن‌های ستاره دار در پارازایلین را اکسید و عدد اکسایش آن‌ها را شش واحد افزایش دهد.
 ۲- پتاسیم پرمنگنات اکسنده‌ای است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب پارازایلین را با بازده نسبتاً خوب به ترفتالیک اسید تبدیل می‌کند.



(آ) در این واکنش یون پرمنگنات به منگنز (IV) اکسید تبدیل می‌شود. تغییر عدد اکسایش اتم منگنز در این واکنش چند است؟ (عدد اکسایش اتم منگنز در یون پرمنگنات برابر با ۷+ است).




(ب) انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟ زیاد



از آن‌جا که واکنش برای انجام به دمای بالا نیاز دارد و در دمای بالا هم بازده آن نسبتاً خوب (نه زیاد) است بنابراین می‌توان

انرژی فعال‌سازی بالا را به این واکنش نسبت داد. ۱۲۸

۱- در هر یک از واکنش‌های زیر مشخص کنید کدام گونه اکسایش و کدام کاهش یافته است؟



۲- شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش‌هایی با کمترین آسیب به محیط زیست و بیشترین بازده است. معادله‌های شیمیایی موازنه نشده زیر تهیه ماده A را به دو روش نشان می‌دهد.



در این واکنش‌ها X و Y پسماند هستند، اما Z یک حلال صنعتی است.

آ) در کدام واکنش، همه اتم‌های مواد واکنش‌دهنده، به مواد ارزشمند تبدیل شده‌اند؟

چرا؟ واکنش دوم زیرا در این واکنش علاوه بر ماده ی مورد نظر یک حلال صنعتی هم تولید شده بنابراین محصولات ارزشمندی بدست آمده

ب) براساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟

واکنش دوم زیرا همه ی فراورده ها ارزشمند و پسماندی تولید نشده بنابراین آسیب کمتری به محیط زیست وارد می شود.

تمرین‌های دوره‌ای

۱- برای هر یک از جمله‌های زیر دلیلی بنویسید.

آ) استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.

استفاده از کاتالیزگر باعث می‌شود واکنش در دمای پایین‌تری انجام بنابراین سوخت کمتری برای تامین دما مصرف و آلاینده‌های کمتری وارد محیط زیست شود.

ب) در تعادل‌های گازی گرماگیر با افزایش دما در فشار ثابت، K افزایش می‌یابد.




برای افزایش دما باید به سامانه گرما دهیم از آنجا که در واکنش‌های گرماگیر نماد گرما در سمت واکنش دهنده ها قرار دارد مطابق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت مصرف گرما یعنی تولید فراورده بیشتر پیش می‌رود در نتیجه ثابت تعادل افزایش می‌یابد.

پ) هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن‌دار از یک هیدروکربن تولید می‌شود، واکنش اکسایش - کاهش است.

با توجه به پیوند دادن اکسیژن با کربن عدد اکسایش کربن در این واکنش‌ها افزایش می‌یابد بنابراین از دسته ی واکنش‌های


اکسایش - کاهش محسوب می‌شوند

۲- در کدام سامانه تعادلی زیر، کاهش حجم سامانه در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده‌ها می‌شود؟ توضیح دهید.



کاهش حجم یا به عبارتی افزایش فشار باعث می‌شود مطابق اصل لوشاتلیه سامانه در حد امکان به مقابله با تغییر اعمال شده بپردازد. بنابراین تعادل به سمت مول گازی کمتر جابه‌جا می‌شود.

۳- شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گاز بی‌رنگ N_2O_4 به گاز قهوه‌ای رنگ NO_2 را با گذشت زمان در دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.




آ) آیا واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید. ب) پس از مدتی سامانه دیگر تغییر رنگ نداده می‌توان نتیجه گرفت غلظت مواد شرکت کننده در این سامانه ثابت شده است و سامانه به تعادل رسیده است

ب) اگر حجم سامانه ۲ لیتر و هر ذره هم‌ارز با ۰/۰۱ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را در این دما حساب کنید.

$$\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2\text{(g)} \quad K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} \quad K = \frac{(0.025)^2}{(0.045)} = 1.39 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

۴- با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.




آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی هر واکنش را روی نمودار مشخص کنید.

ب) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟

واکنش سمت چپ زیرا انرژی فعال‌سازی آن بیشتر است


۵- با توجه به ساختار ترکیب‌های آلی زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.



آ) عدد اکسایش هر یک از اتم‌های کربن ستاره‌دار را تعیین کنید.


ب) در تبدیل ترکیب (۲) به ترفتالیک اسید، عدد اکسایش کدام اتم ستاره‌دار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.
کربن گروه متیل : زیرا با توجه به ساختار ترفتالیک اسید این کربن با اکسیژن پیوند داده و عدد اکسایشش افزایش یافته است

پ) روش تهیه یک دی‌استر از مواد (۱) و (۲) را با نوشتن معادله‌های شیمیایی موازنه شده نشان دهید.



بخش سوم

شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری



«مسئله ما آنچه را روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که کدامشان در عمل نیکوترند»

قسمت اول

قسمت اول که از صفحه‌های ۶۵ تا ۷۰ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

• مقدمه

• سیلیس، زیبا، سخت و ماندگار جای خالی

۲۱۳. هریک از عبارت‌های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد دو بار استفاده می‌شود).

سیلیس - دانش شیمی - عمر طولانی - کمی - آب - ماسه - کوارتز - دو بعدی - جامدهای کووالانسی - بالایی - سه بعدی

- ا. تأیید واکنش پذیری کم، استحکام زیاد و پایداری مناسب، مواد است.
- ب. شیمی‌دان‌ها با بهره‌گیری از توانستند به مواد جدیدتری دست یابند.
- ج. ترکیب مولکولی سازنده خاک رس است.
- د. وجود باعث استحکام و ماندگاری سازه‌های سنگی و نقش‌کننده‌های روی آنها شده است.
- ه. جزء نمونه‌های خالص سیلیس، است و درجه سختی دارد.
- و. عنصرهای اصلی سازنده در طبیعت، کربن و سیلیسیم هستند.
- ز. ساختاری با چینش گرافیت باعث نرم شدن و لغزیدن این ترکیب شده است.

درست یا نادرست

۲۱۴. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد سیلیس صحیح نوشته شده است.

- ا. فراوان‌ترین اکسید در پوسته کره‌ی زمین است.
- ب. سیلیس ساختاری همانند کربن دی اکسید دارد.
- ج. عناصر تشکیل دهنده آن فراوان‌ترین عناصر در پوسته زمین است.
- د. مقاومت گرمایی بالایی دارد.
- ه. در ساختار هر واحد سازنده آن چهار پیوند کووالانسی ساده وجود دارد.
- و. سنگ و ماسه از نمونه‌های خالص سیلیس است.
- ز. جزء اصلی سازنده سفال و مجسمه موآی است.
- ح. جامد کووالانسی ساخته شده از اتم‌های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند.
- ط. نرم و قابل انعطاف است.
- ی. پایداری آن از سیلیسیم خالص بیشتر است.
- ک. می‌تواند در برخی از ترکیبات به صورت یون تک اتمی درآید.
- ل. سیلیسیم، تمایل شدیدی به تشکیل پیوند با اکسیژن دارد.
- م. زنجیرها یا حلقه‌های دارای پل های Si-O-O-Si تشکیل می‌دهد.

برقراری ارتباط

۲۱۵. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است،


این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند.)

ستون B	ستون A
a. ماده مولکولی	ا. یکی از اجزای اصلی بسیاری از سنگ ها، صخره‌هاست.
b. گرافیت	ب. مجموعه‌ای از اتم‌های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند.
c. الماس	ج. اتم‌های کربن در گرافیت در رئوس آن قرار دارند.
d. ماده کووالانسی	د. دگرشکل طبیعی کربن که جزء جامدهای کووالانسی و به عنوان مغز مداد کاربرد دارد.
e. شش ضلعی	ه. پس از اکسیژن فراوان‌ترین عنصر در پوسته جامد زمین است.
f. سیلیسیم	و. در ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه استفاده می‌شود.
g. کربن	
h. SiO_2	


مهارتی

۲۱۶. ساختار سیلیس به صورت زیر است با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:

- ا. هر اتم سیلیسیم به چند اتم دیگر متصل شده است؟
- ب. ترکیب جزء مواد مولکولی است؟ یا کووالانسی؟ چرا؟



ج. یک تکه کوارتز به جرم ۳ کیلوگرم دارای چند مول واحد سازنده سیلیسی است؟



۲۱۷. با تجزیه عنصری ۴۵۰ گرم از یک نمونه خاک رس، ۱۲۰ گرم سیلیسیم به دست آمد،

درصد خلوص سیلیس را در این خاک به دست آورید.

۲۱۸. با آن که کربن و سیلیسیم در یک گروه قرار دارند، چرا خواص فیزیکی اکسید آنها با هم

تفاوت زیادی دارند؟

۲۱۹. آلوتروپ‌های کربن را در نظر گرفته با توضیحات داده شده نوع آلوتروپ را مشخص کنید.

ا. هر اتم کربن با چهار پیوند کووالانسی ساده به اتم‌های مجاور متصل شده است.

ب. به عنوان روغن روان کننده کاربرد دارد.



ج. نارسانای جریان برق است، اما هدایت گرمایی بالایی دارد.

د. جامدی با چینش دوبعدی که دارای حلقه‌های شش گوشه است.

۲۲۰. چرا هدایت گرمایی الماس پنج برابر فلز مس است؟


۲۲۱. نافلزی را نام ببرید که رسانایی قوی دارد و علت این امر چیست؟

۲۲۲. با توجه به معادله گرماشیمیایی سوختن زیر چرا گرافیت پایدارتر از الماس است؟



۲۲۳. آیا یون کربن وجود دارد؟ چرا؟

۲۲۴. ساختار زیر مربوط سیلیسیم کریید است با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:



ا. عدد اکسایش سیلیسیم را به دست آورید

ب. دمای ذوب این ترکیب را نسبت الماس مقایسه کنید.

ج. آیا این ترکیب می‌تواند رسانای جریان برق باشد؟ چرا؟

د. درجه سختی سیلیسیم کریید بیشتر است؟ یا گرافیت؟ چرا؟

۲۲۵. با توجه به شعاع اتمی اکسیژن و سیلیسیم تعیین کنید:

ا. انرژی پیوند Si-Si بیشتر است یا Si-O ؟

ب. سطح انرژی سیلیسیم بیشتر است یا سیلیس؟ چرا؟

بررسی نکات مهم درس:

انواع مواد یا جامدات

ساختار مواد، ارتباط بین اتم‌ها، یون‌ها و مولکول‌های تشکیل دهنده آن مواد را مشخص می‌کند. برای شناخت ساختار مواد، ابتدا باید به نوع اتصالات

بین اتم‌ها و یون‌ها پی برد. پیوندهای شیمیایی، نحوه اتصال میان اتم‌ها و یون‌ها را مشخص می‌کنند. بنابراین تفاوت پیوندهای شیمیایی مختلف را،

در ویژگی‌های ناشی از این پیوندها، در مواد مختلف می‌توان مشاهده کرد.

مواد یا جامدات را بر مبنای نوع ذرات سازنده، نحوه اتصال ذرات سازنده به یکدیگر و خواص آنها می‌توان به طور کلی در چهار دسته طبقه بندی

کرد:

(۱) مواد مولکولی

(۲) جامدات کووالانسی

(۳) جامدات یونی

(۴) جامدات فلزی

این طبقه بندی همچنین می تواند برای طبقه بندی مواد نیز بکار رود و مختص حالت جامد نباشد.

جامدات کووالانسی

جامدات کووالانسی شبکه‌ای از اتمهای متصل بهم با پیوندهای کووالانسی هستند. تفاوت جامدات کووالانسی با مواد مولکولی اینست که جامدات مولکولی متشکل از مولکولهای مجزا از هم هستند که معمولاً هر مولکول از تعداد محدود و کمی اتم تشکیل شده است، در حالی که در جامدات کووالانسی معمولاً کلیه اتمهای ماده (بعنوان مثال در حد عدد آووگادرو تا اتم) بصورت پیوسته با پیوندهای کووالانسی به همدیگر متصلند و در واقع کل یک تکه جامد کووالانسی بصورت یک مولکول غول پیکر است که تمام اتمها را شامل می شود.

ویژگی‌های جامدات کووالانسی

از آنجایی که پیوندهای کووالانسی، قوی هستند پس:

- (۱) دمای ذوب و جوش جامدات کووالانسی بالا است. جامدات کووالانسی معمولاً دمای ذوب و جوش بسیار نزدیک به همی دارند یا بدون مذاب شدن مستقیماً تصعید می شوند.
 - (۲) معمولاً در حلال‌ها حل نمی شوند، چرا که برهم کنش‌های حل شونده- حلال معمولاً نمی توانند انرژی مورد نیاز برای شکسته شدن پیوندهای کووالانسی قوی در جامد کووالانسی را تأمین نمایند.
 - (۳) به جزء گرافیت هدایت جریان الکتریکی ندارند و نارسانای برق هستند.
 - (۴) معمولاً رسانای خوب گرما هستند. به علت اتصال اتمها با پیوندهای کووالانسی قوی گرمای یک اتم براحتی و به سرعت به اتمهای دیگر منتقل می شود. از این رو گرما براحتی از یک سر جامد به سر دیگر آن منتقل می شود.
 - (۵) جامدات کووالانسی معمولاً سخت، ترد و شکننده اند. این جامدات معمولاً تحمل ضربه بالایی دارند، اما انعطاف پذیر نیستند و در صورت اعمال یک ضربه سنگین تر از حد تحمل آنها معمولاً تغییر شکل نمی دهند و از هم پاشیده شده و خرد می شوند.
 - (۶) به دلیل تعداد زیاد پیوندهای یک اتم چگالی بالایی دارند.
- یافته‌های تجربی نشان می دهد که عنصرهای اصلی سازنده جامدهای کووالانسی در طبیعت، کربن و سیلیسیم از گروه چهاردهم جدول دوره‌ای هستند، دو عنصری که از آنها تاکنون یون تک اتمی در هیچ ترکیبی از آنها شناخته نشده است.
- از جامدات کووالانسی می توان به سیلیس، الماس، گرافیت، سیلیسیم و سیلیسیم کربید و ... اشاره کرد.

14
↓
6 C 12.011
14 Si 28.086
32 Ge 72.63
50 Sn 118.71
82 Pb 207.2

سیلیس

سیلیسیم دی اکسید یا سیلیس با فرمول شیمیایی SiO_2 فراوان ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است.

نام سیلیس Silicon از واژه لاتین (Silicis) به معنی (SiO_2) سنگ سخت، سنگ آتش زنه یا سنگ چخماق گرفته شده است.

بخش سوم : شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

نام سیلیس برای کلیه کانی‌هایی با فرمول عمومی به کار برده می‌شود.

این کانیها با فرمول شیمیایی یکسان در گروه کوارتز قرار می‌گیرند.



کوارتز از جمله نمونه‌های خالص سیلیس است.

کوارتز در حالت خاص به صورت ذرّ کوهی ظاهر می‌گردد که در این حالت،

تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را آشکار می‌کند. از نظر ساختار داخلی هر کدام از اتمهای سیلیسیم بوسیله ۴ اتم اکسیژن بصورت چهاروجهی محاط شده است.

ترکیب شیمیایی، و خواص فیزیکی سیلیس، تعیین کننده کیفیت و موارد مصرف آن در هر یک از صنایع مورد استفاده می‌باشد.

بیش تر سطح زمین پوشیده از شن است. شن فقط از دو عنصر ساخته شده است: اکسیژن و سیلیسیم، این دو عنصر، نقش بسیار مهمی در زندگی ما و حیات بشر دارند.

ویژگی‌های سیلیس

۱) شامل شمار بسیار زیادی از اتم‌های سیلیسیم و اکسیژن با پیوندهای کووالانسی $\text{Si} - \text{O} - \text{Si}$ بوده و دارای ساختاری به هم پیوسته و

غول‌آسا است.

۲) به خوبی در مقابل هوازگی از خود مقاومت نشان می‌دهد.

۳) دردمای تقریبی ۱۶۷۰ درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود پس مقاومت گرمایی بالایی دارد.

۴) سختی بالایی (میزان مقاومت آن را در برابر خراشیده شدن) دارد.

۵) فراوان ترین اکسید در پوسته کره‌ی زمین است.

۶) عناصر تشکیل دهنده آن فراوان ترین عناصر در پوسته زمین است.

۷) در ساختار هر واحد سازنده آن چهار پیوند کووالانسی ساده وجود دارد.

۸) جامد کووالانسی ساخته شده از اتم‌های بسیاری است.

۹) پایداری آن از سیلیسیم خالص بیشتر است و تمایل شدیدی به تشکیل پیوند با اکسیژن دارد.

۱۰) چگالی نسبتاً بالایی بین ۲ تا ۳ گرم بر میلی لیتر دارند،

جامدهای کووالانسی کربن


تفاوت رفتار و خواص گرافیت و الماس را به نوع اتصال و پیوند شیمیایی اتم‌های کربن نمی‌توان نسبت داد؛ زیرا در هر دو شکل این ماده (که تنها دارای اتم‌های کربن است) یک نوع پیوند شیمیایی وجود دارد. علت در «چگونگی اتصالات و پیوندهای شیمیایی» این دو شکل کربن است.

گرافیت

گرافیت دارای ساختار سه لایه‌ای است. در هر لایه هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر با آرایش سه ضلعی مسطح متصل شده است. از اتصال شش اتم

کربن، شش گوشه‌هایی ایجاد شده‌اند که از اتصال آن‌ها به هم صفحه‌ای مشبک به وجود می‌آید. پیوندهای کووالانسی بین اتم‌های کربن در هر صفحه، بسیار قوی هستند از این رو هر صفحه را می‌توان یک مولکول غول‌آسای ورقه‌ای در نظر گرفت.

در گرافیت اتم‌های کربن شش ضلعی‌های پیوسته‌ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می‌دهند



که در یک سطح گسترده شده است. لایه‌های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن

روی هم، حجمی را تشکیل می‌دهند که به آن گرافیت می‌گوییم. واضح است که در ساختار

گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم‌های کربن

هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کووالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است

که لایه‌های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می‌کند. نوع این پیوند از جنس نیروی‌های بین

مولکولی است. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم ضعیف‌تر از اتصال اولیه که یک پیوند

کووالانسی است، خواهد بود. پس می‌توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری

به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه‌ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه‌ای انتظار می‌رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه‌های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند. از این رو، گرافیت به عنوان روان‌کننده در دمای زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجود همین ویژگی باعث کاربرد آن در مغز مدادها است.

گرافیت به دلیل داشتن الکترون‌های نامستقر (تک الکترونی که در تشکیل پیوند ساده شرکت نمی‌کند) همانند فلزها رسانای جریان برق است.

ویژگی‌های گرافیت

۱) شامل شمار بسیار زیادی از اتم‌های کربن با تعدادی پیوندهای کووالانسی C – C بوده و دارای ساختاری لایه لایه است.

۲) ماده‌ای لایه لایه ساخت شده از حلقه کربن ۶ ضلعی

۳) هم جامد مولکولی و هم جامد کووالانسی است.

۴) ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت

۵) روانکاری طبیعی بالایی دارد.

۶) دارای مقاومت حرارتی بالا تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد


۷) رسانای الکتریکی

۸) رسانای حرارتی

۹) پایداری شیمیایی

۱۰) اصطکاک کم و لغزنده

۱۱) دارای چگالی نسبتاً بالا حدود ۲/۲۱ گرم بر میلی لیتر



الماس

در مقابل ساختار لایه‌ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه‌ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می‌شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه‌ای سه بعدی فضا را پر

می‌کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کووالانسی ایجاد می‌کند،

در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کووالانسی برقرار می‌نماید

با توضیحاتی که راجع به تفاوت‌های ساختاری گرافیت و الماس داده شد، مشخص می‌گردد که دلیل نرمی

گرافیت و سختی الماس در چیست.

ویژگی‌های الماس



(۱) شامل شمار بسیار زیادی از اتم‌های کربن با پیوندهای کووالانسی $C - C$ بوده و دارای ساختاری به هم

(۲) درخشش خیره کننده الماس همراه با دوام فوق العاده

(۳) بالاترین درجه سختی در بین کل مواد (ساخت مته‌ها و ابزار برش شیشه)

(۴) مقاومت کامل آن در مقابل بیشترین مواد شیمیایی و اسیدها

(۵) کمیابی آن موجب ارزشمندی این گوهر بی همتا شده است.

(۶) شفافیت الماس به نبود ناخالصی‌های درونی و یا سطح خارجی مربوط می‌باشد.

(۷) تفاوت رنگی باعث ایجاد یک تفاوت بسیار زیاد در کیفیت و قیمت الماس می‌شود.

(۸) تمام نور از الماس منعکس می‌شود.

(۹) مقاومت حرارتی بالا تا 3500 درجه سانتیگراد

(۱۰) رسانای حرارتی

(۱۱) پایداری شیمیایی

(۱۲) چگالی بسیار بالا حدود $3/5$ گرم بر میلی لیتر دارند.

ساختار مواد از طریق نوع، تعداد و چگونگی پیوندهای تشکیل دهنده مواد، تاثیر به سزایی در خواص مواد دارد. بنابراین از طریق مطالعه در ساختار

مواد، بسیاری از رفتارها و خواص آنها را می‌توان پیش‌بینی کرد. همچنین برای دستیابی به برخی خواص، می‌توان ساختار را متناسب با آنها طراحی

نمود.

قسمت دوم

قسمت دوم که از صفحه‌های ۷۰ تا ۷۶ کتاب درسی را شامل می‌شود. مطالب زیر را می‌خوانید:

- گرافن، گونه‌ای به ضخامت یک اتم
- سازه‌های یخی، زیبا و سخت اما زودگذار
- رفتار مولکول‌ها و توزیع الکترون‌ها

• هنرنامی شاره (سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق

جای خالی

۲۲۶. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد دو بار استفاده می شود).

ناقطبی - گرافیت - سیلیسیم - ضعیف تر - جور هسته - صفر - شش گوشه - جفت الکترون ها - قطبی -
سیلیس - غیر صفر - ناجور هسته - قوی تر

- ز. یخ ظاهری شبیه به دارد به طوری که سازه های یخی شفاف بوده و جلوه گر زیبایی است.
- ح. گرافن، تک لایه ای از است که در آن، اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی حلقه های تشکیل داده اند.
- ط. توزیع در هر مولکول نقش مهمی در تعیین رفتار آن به ویژه در میدان الکتریکی دارد.
- ی. مولکول های دو اتمی دارای گشتاور دو قطبی و مولکول های آنها می باشند.
- ک. در مولکول های دو اتمی احتمال حضور جفت الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر و مولکول های آنها هستند.
- ل. مایعی که در گستره دمایی بیشتری مایع است، نیروی های جاذبه بین مولکولی دارد.

درست یا نادرست

۲۲۷. جمله های زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست و نادرست بودن آنها را مشخص کنید در صورت نادرست بودن شکل صحیح یا علت

نادرستی را بنویسید

- ح. ضخامت گرافن به اندازه یک مول از اتم کربن عامل شفافیت و انعطاف پذیری آن شده است.
- ط. تفاوت سیلیس با مولکول های یخ در سازه های شفاف آنها تعداد پیوندهای اشتراکی هر واحد سازنده است.
- ی. گرافن سخت و رسانای جریان برق است.
- ک. بهره گیری بیشتر از انرژی پرتوهای الکترومغناطیسی خورشید، کاهش رد پای زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.
- در مولکول های دو اتمی ناجور هسته احتمال حضور جفت الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است.
- ل. ترکیبات مولکولی و کووالانسی در گستره دمایی کمتری نسبت به ترکیبات یونی مایع هستند.
- م. برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی الزامی به حضور متمرکز کننده پرتوها نیست.

انتخاب کنید

۲۲۸. هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

- ج. در ساختار $\frac{\text{گرافیت}}{\text{الماس}}$ که یک جامد $\frac{\text{کووالانسی}}{\text{کووالانسی-مولکولی}}$ است، میان $\frac{\text{همه}}{\text{تعداد معینی از}}$ اتم ها پیوندهای $\frac{\text{یونی}}{\text{اشتراکی}}$ وجود دارد و واحد مولکولی ندارند، به همان دلیل دارای دمای ذوب $\frac{\text{بالا}}{\text{پایین}}$ هستند و $\frac{\text{زود}}{\text{دیر}}$ گدازند و جامد آن $\frac{\text{سخت}}{\text{نرم}}$ است.
- د. رفتار $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهای بین مولکولی آنها بستگی دارد. در حالی که رفتار $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ آن به طور عمده به پیوندهای اشتراکی در مولکول وابسته است.

ه. هر چه یک ماده در گستره دمایی $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$ مایع باشد تفاوت میان نقطه ذوب و نقطه جوش $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است و نشان می‌دهد که نیروی‌های

بین مولکولی $\frac{\text{قوی‌تر}}{\text{ضعیف‌تر}}$ خواهد بود.

و. در ترکیباتی که دارای مولکول‌های $\frac{\text{ناقطبی}}{\text{قطبی}}$ است، هر چه قطبیت مولکولی $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ باشد، نیروی بین مولکولی $\frac{\text{قوی‌تر}}{\text{ضعیف‌تر}}$ است.

مهارتی

۲۲۹. شکل داده شده نمونه‌هایی از آلوتروپ‌های کربن است با توجه به آن به پرسش‌ها

پاسخ دهید:

ا. شکل ظاهری گرافیت و زغال شبیه به هم می‌باشد ولی چرا گرافیت رسانا ولی زغال نارسا


است؟

ب. کدام آلوتروپ ساختاری شبیه گرافن دارد؟

ج. کدام ترکیب ظاهری شبیه به یخ دارد؟ دمای ذوب آن را با یخ مقایسه کنید.

د. چگالی الماس بیشتر است یا گرافیت؟ چرا؟

۲۳۰. ساختار لوویس مولکول‌های زیر را نوشته و تعیین کنید کدام یک قطبی است؟





۲۳۱. رفتار مولکول‌های SO_2 , O_2 , CS_2 , HCN در میدان الکتریکی در شکل زیر نشان داده شده است،

با توجه به شکل‌ها به پرسش‌ها پاسخ دهید.

آ) کدام مولکول (ها) دارای گشتاور دو قطبی صفر هستند؟ چرا

ب) کدام مولکول (ها) قطبی هستند؟




۲۳۲. شکل مقابل دو باریکه از دو مایع CH_2Cl_2 و CCl_4 را در اطراف بادکنک باردار

نشان می‌دهد. کدام یک CH_2Cl_2 است. چرا؟

۲۳۳. با توجه به شکل زیر بیان کنید :

الف) آزادی حرکت مولکول‌ها آب در کدام حالت بیشتر است؟ چرا؟

ب) کدام حالت از آب حجم کمتری را اشغال می‌کند؟ چرا؟



۲۳۴. شکل زیر گستره‌ی گشتاور دو قطبی را از صفر تا ۲ دای نمایش می‌دهد،


با توجه به سه مولکول H_2O ، H_2S و O_2 به سوالات پاسخ مناسب دهید :

الف) هر یک از سه مولکول بالا را در مکان مناسب خود (A,B,C) قرار دهید.


ب) دلیل انتخاب برای مکان A را بنویسید.

ج) از بین مکان B و C کدام یک احتمالا در دمای اتاق یک مایع است؟ چرا؟

گشتاور دوقطبی



۲۳۵. با توجه به شکل بیان کنید مولکولهای بین دو صفحه باردار مربوط به SO_2 است یا CO_2 ؟ چرا؟



۲۳۶. با توجه به جدول زیر، تفاوت حالت فیزیکی این سه ماده را توضیح دهید

ماده	Cl_2	Br_2	I_2
ویژگی	کالر	برم	ید
حالت فیزیکی (25°C)	گاز	مایع	جامد
جرم مولی (g.mol^{-1})	۷۱	۱۶۰	۲۵۴


۲۳۷. در جدول زیر گشتاور دوقطبی چند ترکیب مولکولی داده شده است. با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

ترکیب	جرم مولی (g.mol^{-1})	گشتاور دوقطبی (D)
A	۴۰	صفر
B	۳۶/۵	۱/۰۳
C	۱۷	۱/۴۷
D	۱۸	۱/۸۵

الف) انتظار دارید نقطه جوش کدام ماده از همه کمتر و کدام یک از همه بیشتر باشد؟ چرا؟

ب) میزان قطبیت مولکول‌های B و D را با هم مقایسه کنید. (با ذکر دلیل)

۲۳۸. در شکل زیر بار میله یا قطب مثبت و منفی مولکول‌ها را مشخص کنید.



۲۳۹. گازهای داده شده را در موارد داده شده درون پرانتز با ذکر علت مقایسه کنید

۱- $F_2(g)$ (۳۸ g/mol) و $HCl(g)$ (۳۶.۵ g/mol) (نقطه جوش)

۲- $CO_2(g)$ و $NO_2(g)$ (جهت گیری در میدان الکتریکی)


۳- $CO_2=44$ g/mol و $O_2=32$ g/mol (نقطه جوش)

۴- $CO=28$ g/mol و $N_2=28$ g/mol (مایع شدن)

۵- $O_2=32$ g/mol و $NO=30$ g/mol (نیروی بین مولکولی)

۲۴۰. مشخص کنید که هریک از اشکال زیر با توجه به توضیح داده شده

در گزینه‌های زیر، به کدام حالت فیزیکی ماده اشاره دارد.



الف: در حالت گاز، مولکولهای مجزا با کمترین برهم‌کنش وجود دارند.

ب: در این حالت برهم‌کنش نسبت به حالت گاز بیشتر است.

ج: در حالت جامد، برهم‌کنش به بیشترین مقدار خود می‌رسد.

۲۴۱. با توجه به جدول :


HCl	O_2	CO	N_2	مولکول
۳۶/۵	۳۶	۲۸	۲۸	جرم مولی $g.mol^{-1}$

آ) مولکول‌ها را دو دسته قطبی و ناقطبی در داخل جدول زیر قرار دهید.


مولکول قطبی	مولکول ناقطبی

ب) در بین هر دسته مشخص کنید ، نیروی بین مولکولی در کدام قوی تر است؟

۲۴۲. کدام یک از موارد زیر در میدان الکتریکی جهت گیری می‌کنند (قطبی هستند)؟ چرا؟




۲۴۳. با توجه به شکل ، حالت گازی کدام یک آسان تر به مایع تبدیل می‌شود؟ چرا؟



۲۴۴. با توجه به شکل که سه حالت فیزیکی آب را نشان می‌دهد

به سوالات پاسخ دهید:



(الف) کدام شکل آب در حالت گازی را نشان می‌دهد؟ چرا؟

(ب) در کدام حالت و شکل مولکول‌های آب می‌توانند بر روی هم بلغزند؟ چرا؟

(ج) به کدام شکل ساختاری باز می‌گویند؟ چرا؟

(د) در کدام یک فقط انرژی ارتعاشی وجود دارد؟

۳

۲

۱

۲۴۵. کدام گاز آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود؟ چرا؟ N_2 یا Cl_2 (جرم‌های مولی: $N = 14, \text{Cl} = 35.5 \text{ g mol}^{-1}$)

۲۴۶. به نظر شما کدام مولکول زیر قطبیت بیشتری دارد؟ چرا؟ HF, HCl

۲۴۷. با آن که قطبیت PH_3 بیش‌تر از AsH_3 است، اما نقطه‌ی جوش PH_3 کم‌تر از AsH_3 است، علت را به کمک جدول دوره‌ای شرح دهید.

۲۴۸. ذکر علت، خانه‌های خالی جدول را به کمک عددهای داده شده، کامل کنید. (عددها: -67°C و -85°C)

ترکیب	جرم مولی (g mol^{-1})	دمای جوش ($^\circ\text{C}$)
HCl	۳۶/۵	
HBr	۸۱	

۲۴۹. چرا مولکول CF_4 بر خلاف CHF_3 ناقطبی است؟

۲۵۰. با توجه به جدول زیر که ویژگی‌های آب و هیدروژن سولفید را نشان می‌دهد، به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید.

ماده	فرمول شیمیایی	جرم مولی (g mol^{-1})	حالت فیزیکی
آب	H_2O	۱۸	مایع
هیدروژن سولفید	H_2S	۳۴	گاز

(آ) گشتاور دوقطبی کدام یک کم‌تر است؟

(ب) نقطه‌ی جوش کدام یک بیش‌تر است؟ چرا؟

۲۵۱. در هریک از موارد زیر مشخص کنید، کدامیک از جفت ترکیبات داده شده دمای جوش بالاتری دارند؟


(الف) N_2 و NO (ب) H_2O و H_2S (پ) CF_4 و CCl_4


۲۵۲. شکل مقابل نقطه جوش سه گاز H_2O و H_2S و O_2

را نشان می‌دهد. هر یک را سر جای خود با ذکر دلیل قرار دهید.


($\text{S}=32, \text{O}=16, \text{H}=1$)

۲۵۳. کدام یک از مولکول‌های زیر در میدان الکتریکی جهت‌دار می‌شوند؟ علت چیست؟






(1)



(2)

۲۵۴. شکل زیر شمایی از فناوری پیشرفته برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی را نشان می‌دهد.



ا. هر یک از حروف A, B و C را نام‌گذاری کنید.

ب. چه عاملی باعث به حرکت در آمدن توربین می‌شود؟

ج. عاملی که سبب متمرکز شدن پرتوهای خورشید

می‌شود، چیست؟

د. کدام ماده را می‌توان به عنوان شارهای داغ در این

فناوری استفاده نمود؟

آب - منیزیم کلرید - هگزان

بررسی نکات مهم درس

گرافن

- گرافن، تک لایه‌ای از گرافیت است که در آن، اتم‌های کربن با پیوندهای اشتراکی حلقه‌های شش گوشه تشکیل داده‌اند.
- ساختاری با الگویی مانند کندوی زنبور عسل که دارای استحکام ویژه‌ای است.
- گرافن را به عنوان یک رسانای قوی جهت کاربردهای الکترونیکی از جمله کاربرد در ترانزیستورها مستعد ساخته است. چون همانند فلزها دارای الکترون‌های نامستقر می‌باشد.
- گرافن، محکم، سخت و بسیار سبک است. امروزه مهندسين هوا فضا جهت کاهش وزن و افزایش استحکام بدنه فضاپیماها از ترکیبات دارای نانوالیاف بهره می‌برند.
- مقاومت کششی آن حدود ۱۰۰ برابر فولاد است.

مواد مولکولی

- گاه اتم‌ها برای رسیدن به آرایش گاز نجیب (آرایش هشتایی) به جای از دست دادن یا گرفتن الکترون آن‌ها را میان خود به اشتراک می‌گذارند. در این حالت میان دو اتم پیوندی به وجود می‌آید که به آن پیوند کووالانسی می‌گویند. به عنوان مثال ترکیبی مانند ید که از به اشتراک گذاشته شدن زوج الکترون پیوندی میان دو اتم حاصل شده است. به چنین ترکیب‌هایی که از مولکول‌های جدا از هم تشکیل شده‌اند، ترکیب‌های مولکولی می‌گویند.

ویژگی‌های ترکیبات مولکولی

- (۱) مواد مولکولی متشکل از مولکولهای مجزا از هم هستند. بعنوان مثال می‌توان آب، شکر و الکل اتانول را در نظر گرفت که به ترتیب متشکل از مولکولهای مجزا از هم هستند.
- (۲) عناصر تشکیل دهنده در مورد ترکیب مولکولی، انواع غیر فلزی و اتم‌های هیدروژن هستند.
- (۳) مولکول‌های این دسته از مواد با نیروی بین مولکولی به هم دیگر متصل می‌شوند و با افزایش اندازه مولکولها، نیروهای بین مولکولی قویتر می‌شوند و دمای ذوب و جوش افزایش می‌یابد. قطبیت بالای مولکول و قابلیت تشکیل پیوند هیدروژنی نیز اثر مشابهی روی قدرت نیروهای بین مولکولی و دمای ذوب و جوش ماده مولکولی دارد.
- (۴) ترکیبات مولکولی می‌توانند در سه حالت ماده یعنی جامد (مانند ساکارز)، مایع (مانند آب) و گاز (مانند کربن دی اکسید و متان) وجود داشته باشند.
- (۵) مواد مولکولی در مقایسه با دیگر مواد (یونی، کووالانسی و فلزی) معمولاً دمای ذوب و جوش بسیار پایین‌تری دارند. مثلاً ماده مولکولی آب در صفر درجه سانتیگراد ذوب می‌شود، در حالی که ماده یونی سدیم کلرید در ۸۰۰ درجه سانتیگراد ذوب می‌شود.
- (۶) مواد مولکولی را معمولاً می‌توان براحتی در حلالهای مناسب حل نمود. مثلاً اتانول بخوبی در حلال آب و ید بخوبی در حلال تتراکلرید کربن حل می‌شود. مواد مولکولی قطبی در حلال‌های قطبی و مواد مولکولی غیرقطبی در حلال‌های غیرقطبی بخوبی حل می‌شود که این مطلب بصورت «قاعده مشابه در مشابه حل می‌شود» نیز بیان می‌گردد.
- (۷) مواد مولکولی چه در حالت جامد و چه در حالت مایع معمولاً رسانایی الکتریکی بسیار ضعیفی دارند و نارسانای جریان الکتریکی محسوب می‌شوند.
- (۸) این مواد معمولاً رساناهای خوبی برای گرما نیستند.
- (۹) جامدات مولکولی بعلت برهم کنش‌های ضعیف‌تر بین ذرات سازنده در مقایسه با دیگر جامدات تحت اثر ضربه راحت‌تر از هم می‌پاشند.
- (۱۰) ترکیبات مولکولی به دو دسته قطبی و ناقطبی تقسیم می‌شوند.

• انواع مولکول‌ها


۱- مولکول‌های دو اتمی



آ جورهسته مانند Cl_2 که در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کنند چون توزیع یکنواخت و متقارن الکترون‌ها در مولکول‌های دو اتمی و عبارتی تراکم بار الکتریکی روی اتم‌های سازنده آن یکسان است. در چنین مولکول‌هایی احتمال حضور جفت الکترون پیوندی در فضای بین دو هسته بیشتر است، از این رو احتمال حضور آنها روی هسته‌ها، یکسان و متقارن است. به دیگر سخن، گشتاور دو قطبی آنها صفر بوده و مولکول‌های ناقطبی هستند. پس مولکول‌هایی با فرمول عمومی A_2 ناقطبی هستند.

ب) ناجورهسته مانند HCl که در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند و احتمال حضور جفت الکترون پیوندی پیرامون هسته اتم کلر بیشتر بوده و بار جزئی منفی (δ^-) به دلیل بیشتر بودن خاصیت نافلزی را دارد، ولی اتم‌های هیدروژن دارای بار جزئی مثبت (δ^+) هستند از این رو احتمال حضور الکترون‌های پیوندی روی هسته‌ها، یکسان و متقارن نیست. مولکول‌های آن قطبی هستند. پس مولکول‌هایی با فرمول عمومی AB قطبی هستند.


۲- مولکول‌هایی با اتم مرکزی



- نقشه پتانسیل مولکول‌های سه اتمی آب به صورت زیر است:
- نحوه جهت‌گیری مولکول‌های آب در میدان الکتریکی نشان می‌دهد که تراکم بار الکتریکی روی اتم‌های سازنده آن یکسان نیست، تراکم بار الکتریکی بر روی اتم‌های اکسیژن بیشتر از اتم هیدروژن است. یعنی اتم اکسیژن، سِر منفی (δ^-) و اتم‌های هیدروژن، سِر مثبت (δ^+) مولکول را تشکیل می‌دهند پس آب دارای مولکول‌های قطبی می‌باشد.
- نقشه پتانسیل مولکول‌های سه اتمی کربن دی‌اکسید به صورت زیر است:



در مولکول خطی کربن دی‌اکسید، تراکم بار الکتریکی بر روی اتم‌های اکسیژن به دلیل بیشتر بودن خصلت نافلزی بیشتر از اتم کربن است، از این رو به اتم‌های اکسیژن بار جزئی منفی (δ^-) و به اتم کربن بار جزئی مثبت (δ^+) نسبت داده می‌شود، هر چند که به دلیل توزیع متقارن بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی، این مولکول در میدان الکتریکی جهت‌گیری نمی‌کند و گشتاور دو قطبی آن صفر است. پس مولکول‌های آن ناقطبی است.




- برای تعیین قطبیت مولکول‌های از کمیتی به نام گشتاور دو قطبی (مان دو قطبی μ) با یکای دبا که برابر با حاصلضرب کولن در متر و به عبارت زیر است:

$$\mu = r \cdot e$$

$$1D = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C.m}$$

r نشان دهنده فاصله بین دو اتم بر حسب متر و e نشان دهنده بار الکتریکی جزئی بر روی اتم و بر حسب کولن است.



- هر چقدر قطبیت یک مولکول بیشتر باشد گشتاور دو قطبی بیشتر و در میدان الکتریکی بیشتر جهت می‌یابد.
- تذکره:** مولکول‌ها در صورتی ناقطبی می‌شوند که شرایط زیر را همزمان داشته باشند:



(I) اتم‌های کناری جور هسته باشند.



(II) اتم مرکزی جفت الکترون غیر پیوندی نداشته باشد.

به عبارتی شکل هندسی آن متقارن باشد.



مولکول قطبی

مولکول ناقطبی



- مولکول‌ها با فرمول عمومی **ABE** یعنی اتم مرکزی به دو نوع اتم متصل است، همیشه قطبی هستند.

- برای تشخیص قطبیت مولکول‌هایی با فرمول عمومی AB_3 ، AB_2 ، و AB_4 باید از نظر داشتن جفت الکترون ناپیوندی در اتم مرکزی بررسی شوند.

برای این امر تعداد قلمرو اطراف اتم مرکزی را با توجه به فرمول زیر به دست می‌آوریم:

$$\text{تعداد اتم‌های متصل به اتم مرکزی} + \text{الکترون‌های ظرفیت اتم مرکزی} = \text{قلمرو}$$

تذکر: اگر اتم اتصال اکسیژن یا گوگرد باشد به جای آن صفر قرار می‌دهیم.

سپس قلمرو به دست آمده را با تعداد اتم متصل به اتم مرکزی مقایسه می‌کنیم، اگر برابر بود اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی ندارد، بنابراین مولکول ناقطبی است.

تعداد اتم اتصال به اتم مرکزی - تعداد قلمرو = جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی

مثال: BF_3 $\frac{3+3}{2} = 3$ = تعداد قلمرو پس $3 - 3 = 0$ = جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی

مولکول ناقطبی است.

SO_2 $\frac{6+0}{2} = 3$ = تعداد قلمرو پس $3 - 2 = 1$ = جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی


مولکول قطبی است.

یادآوری

پیوندها و نیروهای شیمیایی بین ذرات

- اتم‌های یک مولکول از طریق پیوند کووالانسی به هم متصل می‌شوند. و واحدهای مجزای مولکولی را پدید می‌آورند و مانند جامدهای یونی و فلزی شبکه‌ای نیستند.

نیروهای شیمیایی که بین اتم‌ها یا مولکول‌ها به وجود می‌آید، در کادر زیر آورده شده است:




- عوامل بسیاری بر نیروی مولکولی (واندوالس) تاثیر دارد که دو مورد آن بررسی می‌شود:

۱- قطبیت مولکول: در ترکیبات مولکولی با جرم مشابه، ترکیباتی که قطبی تر هستند، دمای جوش بیشتری دارند.

۲- جرم یا حجم مولکول: در ترکیب‌هایی با مولکول‌های ناقطبی، با افزایش اندازه یا جرم مولکول دمای جوش نیز افزایش می‌یابد.

نکته: وقتی اختلاف جرم دو ترکیب مولکولی زیاد باشد اثر جرم در افزایش نقطه جوش بیشتر از اثر قطبیت مولکول است. مانند نقطه جوش I_2 که بیشتر از HI است.

جامد < مایع < گاز



نیروهای بین مولکولی در حالت سه‌گانه عبارت است از :


جرم ترکیب‌های مولکولی با فرمول یکسان در جدول دوره‌ای عناصر

از بالا به پایین افزایش می‌یابد، به دلیل افزایش نیروی واندوالس

نقطه جوش نیز افزایش می‌یابد مانند ترکیبات هیدروژن دار گروه چهاردهم

یادآوری پیوند هیدروژنی


- وقتی نقطه جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه‌های بعدی جدول را بررسی می‌کنید به رفتار غیرعادی برخی ترکیبات رو به رو می‌شوید



این بررسی نشان می‌دهد که عناصر فلوئور، اکسیژن و نیتروژن دارای نیروی بین

مولکولی قوی‌تری است، که این نیرو پیوند هیدروژنی نام دارد.

هنگامی پیوند هیدروژنی برقرار می شود که:



۱- اتم مرکزی متصل به اتم هیدروژن باشد.

۲- در میدان الکتریکی سر هیدروژن شدیداً مثبت شود.

۳- اتم مرکزی الکترونگاتیوی (قدرت نافلزی) بالایی داشته باشد

که سر شدیداً منفی پیدا کند این شرط مخصوص سه اتم، عناصر فلوئور، اکسیژن و نیتروژن می باشد که خلاصه FON نامیده می شوند.

- از آنجا که بارهای الکتریکی ناهمنام یکدیگر را می ربایند، در یک نمونه آب که دارای شمار بسیاری مولکول H_2O است، سر مثبت هر مولکول، سرمغنی مولکول همسایه را جذب می کند از این رو در مجموعه ای از مولکول های آب، هر اتم هیدروژن با یک نیروی جاذبه قوی از سوی اتم اکسیژن در مولکول همسایه جذب می شود. این نیروهای جاذبه قوی میان مولکول های آب که در آن هیدروژن نقش کلیدی ایفا می کند، پیوندهای هیدروژنی نامیده می شود.
- عوامل مؤثر بر پیوند هیدروژنی:


۱- قطبیت پیوند: هر چه اتم هیدروژن سر مثبت تر و اتم مرکزی سر منفی تری (به عبارتی قطبی تر) داشته باشد پیوند هیدروژنی قوی تر




۲- تعداد پیوند هیدروژنی:

تجربه نشان داده است به ازای وجود همزمان یک جفت الکترون غیر پیوندی اتم مرکزی و هیدروژن متصل به آن دو تا پیوند هیدروژنی ایجاد می شود، پس در مولکول آب چهار تا در مولکول آمونیاک دو تا و در مولکول هیدروژن فلوئورید دو تا تشکیل می شود.

هر چه تعداد پیوند هیدروژنی بیشتر باشد نقطه جوش بیشتر است. $H_2O > HF > NH_3$




- مولکول های آب، آمونیاک و هیدروژن فلوئورید با هم و حتی با یکدیگر




پیوند هیدروژنی می دهند، که نیروی نسبتاً قوی بوده و سبب می شود

ترکیبات آنها نسبت به عناصر هم گروه رفتار غیرعادی داشته باشند.





- در ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند اشتراکی و به دو اتم هیدروژن از مولکول‌های دیگر با پیوندهای هیدروژنی متصل است از آنجایی که قدرت پیوند کووالانسی حدود ده برابر بیشتر از پیوند هیدروژنی است. بنابراین طول پیوند های کوتاه نشان دهنده پیوند کووالانسی و پیوندهای بلند، پیوند هیدروژن را نشان می‌دهد.
- تعداد پیوند هیدروژنی آب مایع کمتر از یخ می‌باشد و در بخار آب پیوند هیدروژنی وجود ندارد.



- در ساختار یخ، آرایش مولکول‌های آب به گونه‌ای است که در آن، اتم‌های اکسیژن در رأس حلقه‌های شش ضلعی قرار دارند و شبکه‌ای همانند کندوی زنبور عسل با استحکام ویژه پدید می‌آورند. این شبکه با داشتن فضاهای خالی منظم، در سه بُعد گسترش یافته است. و حجم اشغال شده افزایش می‌یابد درواقع، یخ ساختاری باز دارد. شکل‌های زیبا و متنوع دانه‌های برف ناشی از وجود این حلقه‌های شش ضلعی است.
- آب تنها مایعی است که حجم آن به هنگام منجمد شدن، افزایش می‌یابد، به همین دلیل دیواره سلول‌ها در اثر یخ زدگی ترکیده می‌شوند.
- چگالی یخ کمتر از آب است، بیشترین چگالی آب در دمای ۴ درجه سانتیگراد مشاهده می‌شود. چون قبل و بعد از این دما حجم آب منبسط می‌شود.

تفاوت میان یک ترکیب یونی و یک ترکیب مولکولی


- تفاوت اصلی بین یک ترکیب یونی و یک ترکیب مولکولی، عناصر تشکیل دهنده آن‌ها می‌باشد. در یک ترکیب یونی، عنصر فلزی و عنصر غیر فلزی با هم به منظور تشکیل ترکیبات، ترکیب می‌شوند. در این جا، جزء فلزی دهنده الکترون‌ها بوده، تشکیل یک یون با بار مثبت کرده که کاتیون نامیده می‌شود، در حالی که عنصر غیر فلزی توسط گرفتن الکترون‌ها تشکیل یک آنیون را می‌دهد. در ترکیب حاصل، یک پیوند یونی قوی بین دو یون با بار مخالف تشکیل می‌شود. بنابراین، نام پیوند یونی به آن داده می‌شود.



نده در مورد ترکیب مولکولی، انواع غیر ر ر ی عناصر الکترون‌ها را بین آن‌ها به اشتراک می‌گذارند،

همانطور که قبلاً
اتم‌های هیدروژن
کاتیون
آنیون

در نتیجه تشکیل پیوندهای کووالانسی می‌دهند. بنابراین، آن‌ها ترکیبات کووالانسی نیز نامیده می‌شوند. پیوند حاصل تا حد زیادی ضعیف‌تر از پیوند یونی موجود در ترکیبات یونی می‌باشد.



همچنین، از آن جا که هیچ یونی در تشکیل ترکیبات کوالانسی دخالت ندارد، آن ها رساناهای بد الکترسیته هستند.


در طبیعت، تعداد کل ترکیبات مولکولی بیش از تعداد ترکیبات یونی می باشد.

قسمت سوم

قسمت سوم که از صفحه‌های ۷۶ تا ۸۱ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

- چینی زیبا، منظم و سه بعدی یون‌ها در جامد یونی
- شعاع یونی
- ویژگی‌های جامدات یونی
- انرژی فروپاشی شبکه

جای خالی



۲۵۵. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد اضافی هستند).

گرماگیری - عدد کوئوردیناسیون - گرم - ناهمنام - کاهش - گرمادهی - منیزیم فلوئورید -
عدد اکسایش - افزایش - شبکه بلوری - لیتیم برمید - محلول - معکوس - مول - گازی - مسسیم

- ا. در یک ترکیب یونی نیروهای جاذبه میان یون های بر نیروهای دافعه میان یون های غالب است.
- ب. از واکنش فلز سدیم با گاز کلر، جامد یونی رنگی بر جای می‌ماند که همان نمک خوراکی است.
- ج. به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام موجود پیرامون هر یون در شبکه بلور گویند.
- د. ضمن تشکیل سدیم کلرید از عنصرهای مربوطه، اندازه اتم نافلز پس از انتقال الکترون، می‌یابد.
- ه. برای توصیف آرایش سه بعدی و منظم اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها در حالت جامد واژه به کار می‌رود.
- و. انرژی شبکه‌ی بلور کلسیم یدید از انرژی شبکه‌ی بلور کمتر است.
- ز. انرژی لازم برای فروپاشی یک جامد یونی و تبدیل به یون‌های انرژی فروپاشی شبکه گویند.
- ح. نقطه‌ی ذوب بلورهای یونی، با انرژی فروپاشی شبکه‌ی بلور آن‌ها، رابطه‌ی دارد.

درست یا نادرست

۲۵۶. جمله‌های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمله‌های نادرست را بنویسید.

- ف. در جامد یونی نیروهای جاذبه و دافعه از یک جهت به یون‌های آن وارد می‌شود.
- ص. در ترکیبات یونی همواره نیروهای جاذبه میان یون‌های ناهمنام بر نیروهای دافعه میان یون‌های همنام غالب است.
- ق. با افزایش بار مثبت یک کاتیون، شعاع یونی آن نیز افزایش می‌یابد.
- ر. در شبکه بلوری جامدات یونی نمی‌توان واحدهای مجزای مولکولی یافت.
- ش. در تمام ترکیب های یونی عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون یکسان است.
- ت. ضمن تشکیل سدیم کلرید از عنصرهای مربوطه، اندازه اتم فلز پس از انتقال الکترون، افزایش می‌یابد.

- ث. نیروی جاذبه بین یون‌ها در بلور ترکیب های یونی، قوی‌تر از جاذبه میان یک جفت کاتیون و آنیون مشابه است.
- خ. شبکه ی بلور یونی، آرایش سه بعدی منظم یون ها در بلور جامد یونی است.
- ذ. انرژی شبکه ی بلور پتاسیم یدید از انرژی شبکه ی بلور لیتیم فلوئورید کمتر است.
- ض. عدد کوئوردیناسیون یون های Na^+ و Cl^- در شبکه بلور سدیم کلرید، یکسان و برابر ۸ است.
- غ. شکنندگی بلور NaCl به دلیل نیروهای دافعه‌ای است که بر اثر ضربه و جابه‌جایی لایه‌ها در شبکه ایجاد می‌شود.

برقراری ارتباط

۲۵۷. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند).

ستون B	ستون A
a) سزیم کلرید	ا. ساده‌ترین نسبت کاتیون ها و آنیون های سازنده
b) فلوئور	ب. جامد یونی سفید رنگ ناشی از واکنش سدیم با گاز کلر
c) منیزیم کلرید	ج. به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام موجود پیرامون هر یون در شبکه بلور
d) نمک طعام	د. عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون در نمک آن یکسان نیست.
e) عدد کوئوردیناسیون	ه. شعاع یونی آن از شعاع اتمی آن بیشتر است.
f) فرمول شیمیایی	و. نسبت بار یون به شعاع آن
g) عدد اکسایش	ز. انرژی لازم برای فروپاشی یک مول جامد یونی و تبدیل به یون‌های گازی
h) انرژی فروپاشی شبکه	ح. کوچکترین شعاع یونی پایدار را در میان عناصر هم‌دوره خود در جدول دوره‌ای دارد.
i) چگالی بار	
j) آلومینیم	

انتخاب کنید

۲۵۸. هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

- ا. هر چه شعاع یون $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ باشد، نیروی جاذبه میان یون ها $\frac{\text{قوی‌تر}}{\text{ضعیف‌تر}}$ است و استحکام شبکه یونی $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ بوده و برای فروپاشی آن یا جدا کردن کامل یون‌ها از یکدیگر به انرژی $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$ نیاز دارد.
- ب. با افزایش عدد اتمی شعاع یون پایدار فلز در یک $\frac{\text{دوره}}{\text{گروه}}$ از جدول دوره‌ای $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می‌یابد و چگالی بار آن $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ می‌شود. بنابراین انرژی فروپاشی شبکه نمک کلرید آن $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ پیدا می‌کند.

مهارتی

۲۵۹. چرا از نمک‌های یونی برای داشتن شاره‌ی داغ برای تولید انرژی الکتریکی از پرتوهای خورشیدی استفاده می‌کنند؟

۲۶۰. با توجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

Cation	Anion				
	F^-	Cl^-	Br^-	I^-	O^{2-}
Li^+	1036	853	807	757	2925
Na^+	923	787	747	704	2695
K^+	821	715	682	649	2360
Be^{2+}	3505	3020	2914	2800	4443
Mg^{2+}	2957	2524	2440	2327	3791
Ca^{2+}	2630	2258	2176	X	3401
Al^{3+}	5215	5492	5361	5218	15916

ا. کمترین و بیشترین انرژی فروپاشی شبکه مربوط به کدام نمک است؟

ب. انرژی فروپاشی شبکه نمک آلومینیم کلرید نسبت به منیزیم اکسید

با ذکر دلیل مقایسه کنید.


ج. چگالی بار کدام آنیون کمترین است؟ چرا؟

د. مقدار X در جدول کدام عدد زیر می‌تواند باشد؟ چرا؟


$$2074 - 2543$$

۲۶۱. عدد کوئوردیناسیون نمک‌های زیر را به دست آورید.

(A) NaCl



(B) CsCl



۲۶۲. ترکیب XO_2 در حالت جامد رسانای جریان برق نیست، ولی در حالت

ا. اتم X کدام اتم (گوگرد - باریم) می‌تواند باشد؟ چرا؟

ب. در صورت انتخاب عدد اکسایش هر یک اتم‌های موجود در ترکیب را به دست آورید.

۲۶۳. مدل داده شده مربوط به نمک منیزیم اکسید است،



ا. هر کدام از گوی‌ها نشان دهنده کدام یون است؟

ب. عدد کوئوردیناسیون نمک را به دست آورید.


ج. انرژی فروپاشی شبکه این نمک را نسبت به سدیم کلرید با ذکر دو پارامتر مقایسه کنید.

۲۶۴. کدام نمودار زیر انرژی شبکه نمک برمید کاتیون‌های گروه دوم


جدول دوره‌ای را با افزایش عدد اتمی درست نشان می‌دهد؟ چرا؟




(A)



(B)




(C)



(D)

۲۶۵. با توجه به شکل رو به رو، A، B و C نشان دهنده‌ی انرژی شبکه بلور هالیدهای یون‌های کدام عنصرهایند؟ و با بزرگ‌تر شدن کاتیون هم




گروه، درباره کدام هالوژن، انرژی شبکه بیشتر تغییر می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید)

I - K و Li, Na (۲) F - Li و K, Na (۱)

I - Li و Na, K (۴) F - K و Na, Li (۳)


۲۶۶. انرژی آزاد شده در کدام واکنش را انرژی شبکه‌ی بلور منیزیم کلرید می‌گویند؟



۲۶۷. در هر مورد شعاع یونی گونه‌ها را با هم مقایسه کنید:


- | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| ۱) Mg^{2+} | ☐ | Ca^{2+} |
| ۲) Fe^{2+} | ☐ | Fe^{3+} |
| ۳) Cl^{-} | ☐ | ClO_4^{-} |
| ۴) O^{2-} | ☐ | N^{3-} |

۲۶۸. اگر انرژی فروپاشی شبکه‌ی بلور منیزیم فلوئورید برابر 2985 KJ.mol^{-1} باشد، کدام معادله انرژی فروپاشی شبکه را می‌تواند درست نشان داده باشد؟



بررسی نکات مهم درس

جامدات یونی



همانطور که از نامشان نیز پیداست، جامدات یونی از یونها تشکیل شده‌اند و دارای پیوند یونی هستند.

در پیوند یونی، اتم فلز با از دست دادن الکترون و اتم نافلز با به دست آوردن الکترون، به ترتیب به

کاتیون و آنیون تبدیل می‌شوند. پس از دادوستد الکترون و تشکیل یون‌ها، میان یون‌های ناهمنام، نیروی

جاذبه و میان یون‌های همنام، نیروی دافعه پدید می‌آید. اگر هر یک از یون‌ها همانند کره‌ای باردار باشد، انتظار می‌رود نیروهای جاذبه و دافعه از


همهٔ جهت‌ها به آن وارد شود، به دیگر سخن این نیروها به شمار معینی از یون‌ها محدود نشده بلکه میان همهٔ آنها و در فاصله‌های گوناگون وارد می‌شود.



وجود سدیم کلرید و دیگر جامدهای یونی در طبیعت نشان می‌دهد که نیروهای جاذبه میان یون‌های ناهمنام بر

نیروهای دافعه میان یون‌های همنام غالب است، آن چنان که شمار بسیار زیادی از یون‌ها به سوی یکدیگر کشیده

می‌شوند. که باعث آرایش منظمی از یون‌ها در سه بعد و تشکیل شبکه بلوری جامد یونی می‌شود.




شعاع اتمی

برای تعریف شعاع، کره‌ای در نظر می‌گیرند که مطابق مدل کوانتومی، اتم را مانند الکترون‌ها پیرامون هسته و در لایه‌های

الکترونی در حال حرکت‌اند. بنابراین می‌توان برای هر اتم شعاعی در نظر گرفت و آن را اندازه‌گیری کرد که البته تعیین

اندازهٔ اتم همانند جرم آن بسیار دشوار است. برای اندازه‌گیری شعاع، نصف فاصلهٔ میان دو هسته از اتم‌های یکسان که

در پیوند کووالانسی شرکت کرده‌اند را در نظر می‌گیرند. یعنی نصف طول پیوند کووالانسی را شعاع کووالانسی گویند.



شعاع یونی


شعاع اتم با مبادلهٔ الکترون تغییر می‌کند.

شعاع یون را به طور تجربی در شبکهٔ یونی به‌دست می‌آورند. فاصله بین دو یون مجاور در یک بلور را

می‌توان با استفاده از روش پراش پرتو ایکس تعیین کرد. برای بیشتر بلورها این فاصله مجموعه شعاع‌های

یک کاتیون و یک آنیون مجاور است.

Li 152 pm	Li ⁺ 60 pm	Be 111 pm	Be ²⁺ 31 pm	F 64 pm	F ⁻ 136 pm
Na 186 pm	Na ⁺ 95 pm	Mg 160 pm	Mg ²⁺ 65 pm	Cl 99 pm	Cl ⁻ 181 pm




شعاع کاتیون

شعاع کاتیون به دو دلیل از شعاع اتمی آن کوچکتر است:

(۱) اغلب اتم‌های فلزی با از دست دادن الکترون‌های ظرفیت، یک لایه الکترونی کمتر می‌شود.


(۲) نسبت پروتون‌ها بیشتر از الکترون‌ها شده پس با بیشتر شدن جاذبه لایه‌های الکترونی به هسته نزدیک‌تر می‌شود.



شعاع آنیون

شعاع آنیون به دو دلیل بزرگتر از شعاع اتمی آن است:

- (۱) با اضافه شدن الکترون به یک اتم نیروی دافعه‌ای میان الکترون‌های اتم و الکترون ورودی ایجاد می‌شود که باعث بیشتر شدن حجم اتم می‌گردد.



- (۲) با زیاد شدن الکترون‌ها، نسبت پروتون‌ها به الکترون‌ها کاهش یافته و جاذبه کم می‌شود پس الکترون‌ها راحت‌تر از هم دور شده و شعاع آن افزایش می‌یابد.

مقایسه شعاع آنیون و کاتیون‌های هم‌الکترون

با افزایش بار مثبت، شعاع کاتیون کوچکتر و با افزایش بار منفی شعاع آنیون بزرگتر می‌شود.

شعاع آنیون < شعاع اتم خنثی < شعاع کاتیون

$$r_{Al^{3+}} < r_{Mg^{2+}} < r_{Na^{+}} < r_{Ne} < r_{F^{-}} < r_{O^{2-}} < r_{N^{3-}}$$

تذکر: برلیم و بور هیچ وقت پیوند یونی نمی‌دهند چون یون‌های

B^{3+} و Be^{2+} بسیار کوچک بوده و چگالی بار سطحی آنها بیش از



حد زیاد است پس این یون‌ها ناپایدار بوده و در حالت طبیعی

تشکیل نمی‌شوند. این دو عنصر پیوند کووالانسی تشکیل می‌دهند.

آرایش یون‌ها در سرتاسر شبکه بلوری سدیم کلرید به عنوان نماینده

جامدهای یونی از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند، به طوری که هر کاتیون با شمار معینی آنیون و هر آنیون با شمار معینی کاتیون احاطه شده است.

به شمار نزدیک‌ترین یون‌های ناهمنام موجود پیرامون هر یون در شبکه بلور عدد کوئوردیناسیون می‌گویند.




عدد کوئوردیناسیون:

سدیم کلرید = ۶

سزیم کلرید = ۸

چگالی بار الکتریکی یونها

اگر هریون را باردار در نظر بگیرید، چگالی بار هم ارز با نسبت بار به حجم آن است. کمیتی که می تواند برای مقایسه میزان برهم کنش میان یون ها به کار رود. نسبت ساده تری که می توان به کاربرد، نسبت مقدار بار یون به شعاع آن است.



انواع یونها

یونها به دو دسته تقسیم می شوند:

یون تک اتمی: کاتیون یا آنیونی که تنها از یک اتم تشکیل شده باشد. مانند Li^+ , Al^{3+}

یون چند اتمی: ذره بارداری است که بیش از یک اتم دارد. مانند NH_4^+ , Hg_2^{2+} , O_2^{2-} , SO_4^{2-}

نکته: در یون های تک اتمی پیوند کووالانسی وجود ندارد.

یادآوری نوشتن فرمول ترکیبات یونی

۱) برای نوشتن یک ترکیب یونی ابتدا یون ها را مشخص می کنیم. اگر بار یون ها قابل ساده کردن بود ساده می کنیم.

۲) ابتدا از سمت چپ نماد کاتیون را بدون بارش و سپس نماد آنیون را بدون بارش قرار می دهیم.

۳) ظرفیت کاتیون را به آنیون و ظرفیت آنیون را به کاتیون می دهیم.

نکته: فرمول یک ترکیب یونی فرمول تجربی است و فرمول واقعی نیست یعنی تعداد واقعی یون ها را نشان نمی دهد.

نامگذاری ترکیبات یونی

نام فلز(+) نام نافلز +ید


(در صورت چند ظرفیتی بودن فلز عدد اکسایش آن در پرانتز جلوی نام فلز نوشته می شود)

ویژگی جامدات یونی

- یک ترکیب یونی فقط شامل یک یون مثبت و یک یونی منفی نیست. بلکه شامل مجموعه ای از میلیاردها یون مثبت و منفی است.
- یک ترکیب یونی از نظر بار خنثی است چون تعداد کل بارهای مثبت و منفی برابرند.
- نیروی جاذبه در یک ترکیب یونی محدود به یک کاتیون و یک آنیون نیست بلکه نیروی جاذبه بین یون های ناهم نام و در تمام جهات است

و هر یون چند یون مخالف احاطه می شود و آرایش سه بعدی به وجود می آورد.


- نیروی جاذبه بین یون‌های ناهمنام خیلی بیشتر از نیروی دافعه بین یون‌های همنام است.
- جامدات یونی معمولاً دمای ذوب و جوش بالایی دارند چون که پیوند یونی جزء قویترین پیوندهاست و به حالت مذاب یا بخار در آوردن جامدات یونی نیازمند غلبه بر این پیوند است،
- جامدات یونی در گستره‌ی بالایی از دما مذاب هستند. زیرا در حالت مذاب برخی از پیوندهای یونی سست می‌شود ولی در حالت بخار باید کلیه پیوندهای یونی از بین بروند. اختلاف دمای ذوب و جوش جامدات یونی مشابه جامدات فلزی است.
- در حالت جامد نارسانای جریان الکتریکی هستند زیرا در حالت جامد یونها آزادی حرکت انتقالی ندارند (ذرات تشکیل دهنده ساختار یک جامد معمولاً فقط آزادی حرکت ارتعاشی دارند)
- در حالت مذاب و محلول رسانای جریان برق هستند برخلاف حالت جامد، در حالت مذاب، یونها می‌توانند آزادانه از یک مکان به مکان دیگر جابجا شوند.





- گرمایی یونها از یک سر جامد براحتی به سر دیگر آن منتقل می شود.
 - جامدات یونی معمولاً شکننده هستند و مشابه فلزات انعطاف پذیر نیستند. در اثر ضربه و جابجایی لایه‌های یونها نسبت به همدیگر، یونها با بار همنام در مجاورت همدیگر قرار می‌گیرند و دافعه‌های آنها باعث از هم پاشیده شدن و قطعه قطعه شدن جامد یونی می‌شود.
 - جامدات یونی ممکن است در حلال‌های قطبی با قطبیت بالا مثل آب حل شوند. در موقع حل شدن آنها انرژی لازم برای شکستن پیوندهای یونی قوی با انرژی آزاد شده به خاطر تشکیل چندین پیوند یون-دوقطبی ضعیف‌تر برای هر یون جبران می‌شود.
 - در اثر تشکیل پیوند یونی شبکه بلور شکل می‌گیرد و انرژی آزاد می‌شود که این انرژی آزاد شده انرژی فروپاشی شبکه بلور گفته می‌شود.
- $$Mg^{2+}(g) + 2Cl^{-}(g) \rightarrow MgCl_2(s) \quad \Delta H = -2524 \text{ KJ.mol}^{-1}$$
- برای جامدات یونی، انرژی فروپاشی شبکه بلور یونی به صورت مقدار انرژی لازم برای تبدیل جامد یونی به یونهای گازی شکل جدا از هم تعریف می‌شود.
- $$MgCl_2(s) + 2524 \text{ KJ} \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2Cl^{-}(g)$$
- تغییر آنتالپی تشکیل شبکه بلور، تغییر آنتالپی واکنشی است که در آن یونهای سازنده بلور در حالت گازی با هم ترکیب شده و شبکه بلور جامد را بوجود می‌آورند. بنابراین واضح است که بایستی انرژی فروپاشی شبکه و تغییر آنتالپی تشکیل شبکه قرینه یکدیگر باشند.

- انرژی فروپاشی شبکه به دو عامل بستگی دارد:

(۱) **بار یون:** هرچه با یون بیشتر باشد جاذبه بین یون‌ها قوی‌تر بوده در نتیجه انرژی فروپاشی شبکه بیشتر خواهد بود.



(۲) **شعاع یون یا اندازه یون:** اگر بار یون‌ها مساوی بود به اندازه یون‌ها توجه می‌کنیم بدین ترتیب که هر چه اندازه یون کوچکتر باشد



(۳) **تراکم بار در سطح یون بیشتر است.** و جاذبه آن با یون‌های ناهمنام بیشتر است.

به طور کلی انرژی فروپاشی شبکه بلورهای یونی رابطه مستقیم با حاصلضرب بار یونها و رابطه معکوس با مجموع شعاعهای یونی دارد و همچنین تحت تأثیر نوع شبکه بلور (نحوه چیدمان یونها در کنار همدیگر) و به مقدار کمتر جنس یونها قرار دارد.

بالا تر بودن انرژی شبکه معمولاً به معنای قویتر بودن پیوند یونی و در نتیجه دمایی ذوب و جوش بیشتر و استحکام بالاتر جامد یونی است. البته برای مقایسه پایداری ترمودینامیکی جامدات یونی تغییر آنتالپی تشکیل معیار بهتر و دقیق تری از انرژی فروپاشی شبکه است.

نکته :

(۱) برای مقایسه انرژی فروپاشی شبکه ابتدا به سراغ بار یون می‌رویم در صورتی که بار یونها برابر بود به سراغ شعاع می‌رویم هر چه شعاع یون کمتر باشد، چگالی بار آن بیشتر و انرژی فروپاشی شبکه بیشتر چون جاذبه یون‌های ناهمنام بیشتر است.



(۲) هر چه انرژی فروپاشی شبکه بلور بیشتر باشد معمولاً نقطه ذوب و جوش ترکیب یونی بالاتر خواهد بود یعنی هر چه بار یون بیشتر و اندازه یونها کوچکتر باشد نقطه ذوب و جوش بالاتر است.

تذکر: در مقایسه انرژی فروپاشی شبکه‌ی نمک‌هایی

با بار چندتایی بهترین روش محاسبه استفاده از فرمول

$$U = \frac{k \times \gamma \times Z^+ \times Z^-}{r^+ + r^-}$$

U زیر است:

K: عدد ثابت

γ: شمار یونها در فرمول شیمیایی نمک

Z: بار اکتريکی کاتیون و آنیون

r: شعاع کاتیون و آنیون

Cation	Anion				
	F ⁻	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	O ²⁻
Li ⁺	1036	853	807	757	2925
Na ⁺	923	787	747	704	2695
K ⁺	821	715	682	649	2360
Be ²⁺	3505	3020	2914	2800	4443
Mg ²⁺	2957	2524	2440	2327	3791
Ca ²⁺	2630	2258	2176	2074	3401
Al ³⁺	5215	5492	5361	5218	15916

$$\begin{array}{ccc} 3+ & 1- & 2+ & 2- \\ Al & F_r & MgO & MgO \end{array} \quad \text{مثال: } AlF_3 \text{ با } MgO$$

$$\frac{k \times 4 \times (3 \times 1)}{51 + 133} > \frac{k \times 2 \times (2 \times 2)}{66 + 140}$$

$$\frac{\text{انرژی فروپاشی شبکه}}{\text{شمار کاتیون} \times \text{بار کاتیون} \times \text{تعداد یونها}} > \frac{\text{شمار کاتیون} \times \text{بار کاتیون} \times \text{تعداد یونها}}{\text{شمار کاتیون} + \text{شمار آنیون}}$$

قسمت چهارم

قسمت چهارم که از صفحه‌های ۸۱ تا ۸۸ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

• فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا

• ویژگی‌های جامدات فلزی

• «رنگ، نماد زیبایی»

• تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

جای خالی

۲۶۹. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد اضافی هستند).

نافلزها - ظرفیت - فلزها - فیزیکی - جامد یونی - سیلیسیم کربید - شیمیایی - درونی -

سفید - سیاه - سیلیسیم - جامد فلزی

ج. بخش عمده عنصرهای جدول دوره ای را تشکیل می دهند،

ط. رسانایی الکتریکی، رسانایی گرمایی جمله رفتارهای فلزها بوده در حالی که تنوع اعداد اکسایش از جمله رفتارهای آنهاست.

ی. الکترون های موجود در اتم، دریایی الکترونی را ساخته اند که در آن آزادانه جابه جا می شوند.

ک. یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می رود.

ل. اگر یک نمونه ماده همه طول موج های مرئی را بازتاب کند، به رنگ و اگر همه آنها را جذب کند، به رنگ دیده می شود.

م. هم در حالت مذاب و هم جامد رسانا ولی فقط در حالت مذاب رسانا است.

درست یا نادرست

۲۷۰. جمله های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و شکل صحیح جمله های نادرست را بنویسید.

ا. در دوره برنز که پس از دوره آهن قرار دارد جایگاه برجسته فلزها در تمدن بشری را آشکار می کند.

ب. فلزها فقط در دسته عناصر s و d قرار دارند.

ج. الکترون های ظرفیت هر اتم فلز در شبکه فلزی متعلق به خود آن اتم نیست.

د. فلزها فقط در حالت مذاب رسانای جریان برق هستند.

ه. در شبکه بلوری فلز نیز عدد کوئوردیناسیون تعریف می شود.

برقراری ارتباط

۲۷۱. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است. این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر


بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند).

ستون B	ستون A
a) دریای الکترون	ا. یک ساینده ارزان است که در تهیه سنباده به کار می رود
b) الکترون های درونی	ب. عاملی است که چیدمان کاتیون ها را در شبکه بلوری فلز حفظ می کند
c) وانادیم (IV)	ج. عدد اکسایشی از وانادیم که رنگ محلول خود را آبی می کند.
d) ترکیب مولکولی	د. آلیاژی از تیتانیم و نیکل که در قاب عینک کاربرد دارد.

- ه. الکترون‌های تشکیل دهنده دریای الکترون
و. آلیاژ فلزی که بعنوان سازه فلزی در ارتودنسی به کار می‌رود.
ز. نوعی کلویید که لایه نازکی روی سطح ایجاد می‌کند تا مانع خوردگی در برابر اکسیژن، رطوبت و مواد شیمیایی گردد.
ح. سازنده اصلی یک ماده رنگی
- e) الکترون‌های ظرفیت
f) رنگ
g) سیلیسیم کربید
h) نیتینول
i) تیتانیم
j) وانادیم (II)
k) پیوند کووالانسی
l) رنگ دانه

مهارتی

۲۷۲. با توجه به شکل



ا. ساختاری بلوری مربوط به کدام نوع جامد است؟

ب. طرح داده شده کدام ویژگی جامد را نشان می‌دهد؟

۲۷۳. چرا جامد فلزی هم در حالت مذاب و هم در حالت جامد رسانای جریان برق است؟


۲۷۴. کدام دسته از فلزات می‌توانند عدد اکسایش متغیر داشته باشند؟

فلزات قلیایی - فلزات واسطه - فلزات قلیایی خاکی

۲۷۵. واژه رسانای الکترونی برای کدام نوع جامد بکار می‌رود؟ چرا؟

۲۷۶. در کدام دسته از عناصر تنوع رنگی زیاد است؟

۲۷۷. با توجه به شکل و پرتوهای خروجی ناشی از تابش



رنگ هر شیء را (سیاه - سفید - رنگی) مشخص کنید و تعیین

کنید که در هر شیء کدام ماده وجود دارد؟ (دوده - TiO_2 - Fe_2O_3)

۲۷۸. عدد اکسایش منگنز را در ترکیبات زیر به دست آورید. MnO_2 - CdMnO_4 - KMnO_4 - MnCl_2


۲۷۹. اگر عدد اکسایش کبالت در آنیون زیر برابر ۶+ باشد بار آنیون را به دست آورید.

۲۸۰. کدام یک از کاربردهای ذکر شدن نمی‌تواند برای آلیاژ نیتینول مناسب باشد؟ چرا؟

ا. قاب عینک

ب. ظروف بسته بندی مواد غذایی

ج. سازه فلزی در ارتودنسی



د. انگشتر و زیورآلات بدلی

بررسی نکات مهم درس:

جامدات فلزی

فلزات گروه مهمی از عناصر را تشکیل می‌دهند که معمولاً الکترونهای مدار آخر خود را به راحتی از دست می‌دهند.

اهمیت کشف فلز و استفاده از آن در ساخت ابزار به قدری مهم است که دوره‌هایی از زندگی انسان را به اسم فلزات نام گذاری کرده‌اند.


مثل عصر مس ، عصر مفرغ و عصر آهن.

پس از دوره سنگی، دوره برنز و سپس آهن، جوامع دچار دگرگونی و رشد چشمگیری شدند و این خود نشان از جایگاه برجسته فلزها در تمدن بشری دارد.

فلزها هنوز هم کلید رشد، گسترش و ارتقای کیفیت زندگی به شمار می‌روند، آن چنان که بسیاری باور دارند پایداری جامعه پیشرفته با فناوری کارآمد به گسترده‌ی استفاده از عنصرهای فلزی وابسته است.

فلزها بخش عمده عنصرهای جدول دوره‌ای را تشکیل می‌دهند، عنصرهایی که در هر چهار دسته s ، p ، d و f جای داشته اما رفتارهای فیزیکی و شیمیایی متنوعی دارند.

اتمهای فلزات که در مقایسه با اتمهای شبه فلزات و نافلزات راحت‌تر الکترون از دست می‌دهند، دسته‌ای از مواد به نام مواد فلزی را بوجود می‌آورند که مشخصه بازر آنها پیوند فلزی است. برای توجیه پیوند فلزی می‌توان از نظریه دریای الکترون آزاد استفاده نمود. نظریه دریای الکترون آزاد ساده و تقریبی بوده، با این وجود بسیاری از خصوصیات کلی فلزات را توجیه می‌کند.



در نظریه دریای الکترون آزاد فرض می‌شود که اتمهای فلزی الکترونهای والانس خود را از دست می‌دهند

و به صورت یونهای مثبت در می‌آیند. سپس این یونهای مثبت در دریایی از الکترونهای آزاد بوجود آمده

غوطه‌ور می‌شوند و جاذبه یونهای مثبت و الکترونهای آزاد منفی اساس کنار هم قرار گرفتن اتمهای فلزات


و تشکیل پیوندی به نام پیوند فلزی است.

ویژگی‌های جامدات فلزی

- فلز فقط شامل یک یون مثبت و الکترون ظرفیت خودش نیست. بلکه شامل مجموعه‌ای از میلیاردها یون مثبت و الکترونهای نامستقر است.
- فلز از نظر بار خنثی است چون تعداد کل بارهای مثبت و منفی برابرند.
- نیروی جاذبه در یک فلز محدود به یک کاتیون و الکترون خودش نیست بلکه نیروی جاذبه بین کاتیون و دریای الکترون در تمام جهات مشاهده می‌شود و آرایش سه بعدی به وجود می‌آورد.

- پیوند فلزی پیوند قوی است و بنابراین دمای ذوب و جوش مواد فلزی معمولاً بالاست.
- برخلاف جامدات کووالانسی اختلاف دمای ذوب و جوش جامدات فلزی معمولاً زیاد است.
- الکترون‌های آزاد مواد فلزی تحت تأثیر میدانهای الکتریکی خارجی به راحتی می‌توانند جابه‌جا شوند و به همین جهت فلزات هم در حالت جامد و هم در حالت مایع رسانای خوب جریان الکتریکی هستند.
- جنب و جوش‌های نامنظم گرمایی بعلاوه دافعه یونهای مثبت باهم، پیوند فلزی قوی و وجود الکترونهای آزاد براحتی از یک سرفلز به سر دیگر آن منتقل می‌شود. به همین جهت فلزات رسانای خوب گرما نیز هستند.
- فلزات انعطاف پذیر هستند و در اثر ضربه معمولاً خرد نمی‌شوند بلکه تغییر شکل می‌دهند و از این رو خاصیت چکش خواری و ورق کاری دارند.
- فلزها جلاپذیرند. به دلیل نامستقر بودن الکترون‌های ظرفیت اتم فلز تمایلی به جذب پرتوهای تابش شده ندارد. پس همه پرتوها را بازتابش می‌کند.
- درجه سختی فلزات متفاوت است. در دمای محیط فلز جیوه مایع است در صورتی که در همین شرایط برخی از فلزات بسیار سختند.
- فلزات معمولاً در حلال‌های معمولی حل نمی‌شوند. البته گاهی اوقات فلزات بخاطر واکنش شیمیایی با حلال در حلال حل می‌شوند مثلاً فلز سدیم با آب واکنش می‌دهد و محلول سدیم هیدروکسید و گاز هیدروژن تولید می‌نماید.
- فلزات می‌توانند با هم محلول جامد در جامد تشکیل بدهند که آلیاژ نامیده می‌شود. آلیاژها از نظر برخی ویژگی‌های فیزیکی یا شیمیایی می‌توانند با فلزات خالص سازنده تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند و بسیاری از معایب فلزات خالص برای کاربرد در صنایع و زندگی روزمره را از بین ببرند. از این رو است که آلیاژها کاربردهای وسیعی در دنیای امروزه ما دارند.

مانند فولاد – نیتینول – برنز



عوامل موثر بر پیوند فلزی

- (۱) **شعاع فلز:** هرچه اندازه فلز کوچکتر باشد جاذبه هسته اتم فلزی بر دریای الکترون بیشتر است پس پیوند فلزی قوی تر خواهد بود.

نقطه جوش

نقطه ذوب

- (۲) **الکترون‌های ظرفیت:** با زیادتر شدن الکترون‌های ظرفیت، مشارکت آنها در پیوند فلزی بیشتر و آن را محکم تر می‌کند.

تیتانیوم

- دارای عدد اتمی ۲۲ و عدد اکسایش +۴
- دمای ذوب بسیار بالا ۱۶۶۷ درجه سانتیگراد (برای ساخت موتور جت)
- چگالی نسبتاً بالا ۴/۵۱ گرم بر سانتیمتر مکعب
- تهیه این فلز دشوار و قیمت بالایی دارد.
- ماندگاری و استحکام مناسب (سازه فلزی در ارتودنسی – استنت برای رگ‌ها – قاب عینک)
- مقاوم در برابر خوردگی و سایش (ساخت پروانه کشتی اقیانوس پیما)
- استفاده در ساخت بناهای هنرمندانه، زیبا و ماندگار
- نیتینول، آلیاژ این فلز با نیکل به عنوان آلیاژ هوشمند در ساخت فراورده‌های صنعتی و پزشکی

بخش چهارم

شیمی راهی به سوی آینده روشن تر



« و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده (بهره‌ای) نیست »

قسمت اول

قسمت اول که از صفحه‌های ۸۹ تا ۹۵ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

- مقدمه
 - به دنبال هوای پاک
 - انرژی فعال‌سازی در واکنش‌های شیمیایی
۲۸۱. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد دو بار استفاده می‌شود).

برخی از - مصرف می‌شود - فناوری نو - فعال‌سازی - انگیزه - SO_2 - هوا - NO_2 - بنزین - تمامی - افزایش - باقی می‌ماند

- ح. برای بال رفتن از نردبان پیشرفت، افزون بر باید نخست تکیه گاه مناسبی برای آن یافت.
- ط. دیدن رنگ قهوه‌ای هوای آلوده شدن با گاز است.
- ی. دلیل وجود هیدروکربن‌ها در گازهای خروجی از اگزوز مربوط به شکسته شدن مولکول‌های است.
- ک. از پیامدهای رشد و پیشرفت جامعه می‌توان دسترسی آسان و ارزان تر به را نام برد.
- ل. انرژی لازم برای انجام واکنش‌ها انرژی نام دارد.
- م. کاتالیزگر سرعت واکنش شیمیایی را می‌دهد و در پایان واکنش

درست یا نادرست

۲۸۲. جمله‌های زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست و نادرست بودن آن‌ها را مشخص کنید در صورت نادرست بودن شکل صحیح یا علت نادرستی را بنویسید.
- أ. افزودن کاتالیزگر به واکنش ممکن است سبب تغییر سرعت واکنش شود.

- ب. رشد و پیشرفت هر جامعه تنها در سایه تلاش هدفمند و آگاهانه افراد خبره، کاردان و ورزیده دست یافتنی است.
- ج. کشف و استخراج اوره قبل از تولید آمونیاک به روش هابر است.
- د. گاز نیتروژن با گاز اکسیژن در هر دمایی می تواند واکنش دهند و به نیتروژن مونوکسید تبدیل شوند.
- ه. بهره گیری از مبدل کاتالیستی در خودرو و کود شیمیایی سبز و همچنین تبدیل مواد شیمیایی خام به مواد ارزشمند از جمله فناوری ها به شمار می رود.
- و. شیمی دان ها برای افزایش سرعت همه واکنش های شیمیایی، از کاتالیزورها استفاده کردند.
- ز. فقط واکنش های شیمیایی گرماگیر برای آغاز شدن به انرژی نیاز دارند.
- ح. در واکنش های گرماده انرژی فعال سازی رفت نسبت به برگشت بیشتر است.
- ط. افزایش دما بر سرعت واکنش هایی که انرژی فعال سازی بیشتری نیاز دارند، تأثیر بیشتری دارد.

انتخاب کنید

۲۸۳. هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

- أ. در واکنش های $\frac{\text{گرماگیر}}{\text{گرماده}}$ ، انرژی فعال سازی واکنش $\frac{\text{برگشت}}{\text{رفت}}$ از واکنش $\frac{\text{رفت}}{\text{برگشت}}$ کمتر است.
- ب. در واکنش های شیمیایی، هر چه مقدار انرژی فعال سازی $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ باشد، موقعیت سد انرژی $\frac{\text{بالا تر}}{\text{پایین تر}}$ و واکنش در شرایط $\frac{\text{دشواری}}{\text{آسانی تر}}$ و سرعت واکنش $\frac{\text{تند تر}}{\text{کند تر}}$ است.
- ج. با $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ دما انرژی واکنش دهنده ها $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ می شود. به طوری که شمار ذره هایی که در واحد زمان می توانند به فراورده ها تبدیل شوند، $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ یافته و در نتیجه سرعت واکنش $\frac{\text{تند تر}}{\text{کند تر}}$ می شود.
- د.

برقراری ارتباط

۲۸۴. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است،


این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند.)

ستون A	ستون B
س. مانع گسترش بیماری هایی از جمله وبا در جهان شده است.	h) فناوری تولید سموم
ع. ماده ای که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می دهد.	i) انرژی فعال سازی
ف. صنعت پوشاک و صنعت بسته بندی (غذا، دارو و ...) را دگرگون ساخت.	j) کانالیزگر
ص. نقش چشمگیری در تأمین غذای جمعیت جهان دارد.	k) فناوری آنتی بیوتیک،
ق. حداقل انرژی مورد نیاز برای انجام شدن هر واکنش	l) مدیون دانش شیمی

راه را برای جراحی های گوناگون هموار کرد .	m) فناوری تولید بنزین
ش. گسترش فناوری صفحه های نمایشگر در وسایل الکترونیک	n) فناوری تصفیه آب
ت. به حمل و نقل سرعت بخشید و مبدل های کاتالیستی آلودگی ناشی از	o) فناوری های تولید کودهای شیمیایی
مصرف آن را کاهش داد.	p) فناوری تولید پلاستیک

مهارتی


۲۸۵. نمودار زیر غلظت برخی از این آلاینده ها را در نمونه ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می دهد.



ا. رفت و آمد کودکان در کدام ساعت شبانه روز با خطر جدی تری روبه رو است؟

ب. چگونه می توان ماکزیمم آلودگی در سطح شهر را احساس کرد؟

ج. آلاینده های زیر در خروجی اگزوز خودروها وجود دارند:



د. کدام آلاینده سرعت خوردگی را افزایش می دهد؟

ه. مولکول های نیتروژن بسیار پایدارند ولی چرا گاز NO مشاهده می شود؟

و. آیا C_xH_y می تواند ترکیب C_4H_8 باشد؟ چرا؟

فرمول شیمیایی آلاینده	مقدار آلاینده به ازای طنی یک کیلومتر (گرم)
CO	۵/۹۹
C_xH_y	۱/۶۷
NO	۱/۰۴

۲۸۶. جدول زیر مقدار برخی آلاینده ها را در گازهای خروجی از اگزوز خودرو نشان می دهد:

اگر در شهر تهران روزانه ۵۰,۰۰۰ خودرو در بخش های گوناگون فعالیت کنند، و هر خودرو به طور


میانگین ۵۰Km مسافت طی کند، حساب کنید:

ا. چند تن آلاینده به هوا کره وارد می شود؟

ب. درصد جرمی گاز CO را در این مخلوط به دست آورید.

ج. اگر شاخص آلودگی مجاز در شهر تهران برابر 10 tonKm^{-1} در روز باشد، روزانه چند خودرو که به طور میانگین ۵۰Km مسافت طی

می کنند، مجاز به تردد هستند؟



۲۸۷. نمودار مقابل تغییر انرژی نسبت به مسیر واکنش را نشان می دهد.

- هریک از موارد خواسته شده را معلوم کنید.

(۱).....(۲).....(۳).....

(۴).....

این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

۲۸۸. اگر در واکنش $۲D \rightarrow B + ۳۰\text{ KJ}$ مجموع انرژی فعالسازی

واکنش رفت و برگشت ۹۰ کیلو ژول باشد انرژی فعالسازی واکنش برگشت چند کیلو ژول بر مول است؟ نمودار آنرا رسم کنید؟

۲۸۹. هر یک از نمودارهای داده شده به یک واکنش خاص تعلق دارد.


ا. انرژی فعالسازی هر واکنش را روی شکل مشخص کنید.

ب. برای هر واکنش ΔH را نشان دهید.

ج. مشخص کنید واکنش گرماگیر است یا گرماده؟

د. سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟ چرا؟

ه. افزایش دما بر بیشتر شدن سرعت کدام واکنش تأثیر بیشتری دارد؟




۲۹۰. واکنش زیر را در نظر بگیرید: $O_2(g) + O(g) \rightarrow 2O_2(g)$

باتوجه به نمودار انرژی این واکنش به پرسشها پاسخ دهید.

الف) آنتالپی واکنش را محاسبه کنید.

ب) در شرایط یکسان سرعت واکنش رفت را با برگشت مقایسه کنید.




۲۹۱. با توجه به نمودارهای زیر به پرسشها پاسخ دهید:

ا. در شرایط یکسان سرعت کدام واکنشها از بقیه بیشتر است؟ چرا؟

ب. انرژی فعالسازی برگشت واکنش ۱ را به دست آورید.


ج. کدام واکنش گرماگیر است؟




۲۹۲. با استفاده از نمودار مقابل:

الف) انرژی فعالسازی واکنش برگشت را حساب کنید.

ب) واکنش رفت سریعتر است یا برگشت؟ چرا؟




۲۹۳. با توجه به نمودارهای «انرژی - پیشرفت واکنش» زیر، درستی و نادرستی جملات زیر را بررسی نمایید.



پیشرفت واکنش

(ب)



پیشرفت واکنش

(ا)

ا. واکنش: $2OH(g) \rightarrow H_2O(g) + O(g)$ با آزاد شدن ۷۸ کیلو ژول گرما همراه است.


ب. انرژی فعال سازی واکنش آ در جهت رفت، سه برابر انرژی فعال سازی واکنش ب، در جهت برگشت است.

ج. سرعت واکنش (آ) بیشتر است و تشکیل هر مول گاز اکسیژن با آزاد شدن ۱۹۶ کیلو ژول گرما همراه است.

۲۹۴. با توجه به نمودار روبرو و داده های آن، می توان دریافت که این واکنش در

جهت گرما و سرعت آن در این جهت است

و انرژی فعال سازی آن در جهت برگشت برابر کیلوژول است.



(۱) رفت - ده - بیش تر - +۴۶۰

(۲) رفت - ده - کم تر - -۳۴۰

(۳) برگشت - گیر - کم تر - +۳۴۰


(۴) برگشت - گیر - بیش تر - +۴۶۰

۲۹۵. با توجه به واکنش مقابل: $A_r(g) \rightarrow B_r(g)$

ا. ΔH , E_a رفت و E_a برگشت را حساب کنید.

ب. واکنش رفت سریعتر است یا برگشت؟ چرا؟


مقیاس نمودار ۱۰ کیلو ژول می باشد.




۲۹۶. با توجه به نمودارهای زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید.

الف - مقدار عددی ΔH را در نمودار ۲ را مشخص کنید.

ب - انرژی فعال سازی برگشت در نمودار ۱ برابر چند است؟




پیشرفت واکنش



نمودار (۲)

پیشرفت واکنش

بررسی نکات مهم درس:



هوای آلوده

- هوای آلوده حاوی گازهای SO_2 - CO - NO - NO_2 - O_3 و ذره های معلق و مواد آلی فرآر است. گاز گوگرد دی اکسید از سوختن گوگرد موجود در سوخت های فسیلی ایجاد می شود. سوختن ناقص هیدروکربن تولید $CO(g)$ و C (دوده) و گاهی هیدروکربن های شکسته شده از مولکول های بنزین با فرمول C_6H_6 می شود. گاز نیتروژن هم در دمای بالای موتور خودرو به گازهای NO و NO_2 تبدیل می شود. و مولکول های O_3 از واکنش زیر تولید می شود $NO_2(g) + O_3(g) \rightarrow NO(g) + O_3(g)$
- بیشترین درصد جرمی آلاینده خارج شده از اگزوز خودرو، کربن مونو اکسید است.
- به دلیل وجود این آلاینده ها، هوای آلوده بوی بدی دارد.
- چهره شهر را زشت می کند و به رنگ قهوه ای دیده می شود.
- فرسودگی ساختمان ها و پوسیدگی خودروها را سرعت می بخشد. گاز گوگرد دی اکسید و اکسیدهای نیتروژن با آب و اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهند و در نهایت به سولفوریک اسید و نیتریک اسید تبدیل می شوند. این اسیدها هنگام بارش، باران های اسیدی تولید می کنند و به شدت محیط زیست را تخریب می کنند.

- سبب ایجاد و تشدید بیماری های تنفسی از جمله برونشیت، آسم، سرطان ریه و حتی مرگ می شود.

انرژی فعال سازی

هر واکنش برای انجام شدن به حداقلی از انرژی نیاز دارد. در واقع برای اینکه یک واکنش شیمیایی آغاز شود باید واکنش دهنده ها مقدار معینی انرژی داشته باشند، که به این حداقل انرژی، انرژی فعال سازی گویند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

برای پرش قورباغه دست کم باید انرژی لازم برای رساندن خودش به بالای مانع داشته باشد تا خودش را به آب برکه برساند.


بدیهی است هر چه ارتفاع مانع کمتر باشد، انتقال قورباغه آسان تر و سریع تر انجام می شود.



در واکنش های شیمیایی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. به طوری که برای آغاز هر واکنش شیمیایی نیز مقدار معینی از انرژی لازم است.

نمودار انرژی فعال سازی

نمودارهای زیر نشان می دهند که واکنش دهنده ها در یک واکنش چه گرماگیر و چه گرماده برای آغاز واکنش باید حداقلی از انرژی را داشته باشند تا با عبور از سد انرژی به فراورده ها تبدیل شوند.



انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی

سرعت انجام واکنش های شیمیایی با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه واکنش زنگ زدن آهن کند، در حالی که واکنش سوختن متان، تند است.

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

- واکنش های سریع واکنش هایی هستند که انرژی فعال سازی کمی نیاز دارند، یعنی حداقل انرژی لازم را زودتر به دست می آورند و واکنش در مدت زمان کوتاه تری به فراورده تبدیل می شود.

- هرچه انرژی فعال سازی بیشتر باشد قله سد انرژی در سطح انرژی بالاتر و مدت زمان طولانی تری صرف تأمین

انرژی می شود، بنابراین سرعت واکنش کندتر است.
در شکل روبه رو سرعت واکنش «ب» کندتر است.

پس واکنش در شرایط دشوارتر و دمای بالاتری انجام می شود.

- با افزایش دما، انرژی واکنش دهنده ها بیشتر می شود.
به طوری که شمار ذره هایی که در واحد زمان می توانند به

فراورده ها تبدیل شوند، افزایش یافته و در نتیجه سرعت واکنش افزایش

واکنش نمی دهد اما درون موتور خودرو اندکی از آنها به نیتروژن مونوکسید تبدیل می شود.

نکته: اثر افزایش دما بر سرعت واکنش هایی بیشتر است که گرماگیرتر هستند یا انرژی فعال سازی بیشتری لازم دارند.


مثلاً با افزایش دما سرعت واکنش های «الف» و «ب» هر دو زیاد می شود اما نسبت افزایش سرعت واکنش «ب» بیشتر است.

انرژی فعال سازی در واکنش های برگشت پذیر

در برخی از واکنش ها فراورده ها نیز ممکن است بتوانند با هم واکنش داده و واکنش دهنده ها را دوباره تولید

کنند؛ انرژی فعال سازی در این جهت را انرژی فعال سازی برگشت و با E_a' نمایش می دهند.

در این نمودار سرعت واکنش رفت بیشتر از برگشت است.



محاسبه ی گرمای واکنش

یادآوری

- تعیین ΔH واکنش های شیمیایی به دو روش امکان پذیر است:

۱- گرماسنجی، روش مستقیم اندازه گیری ΔH یک واکنش که با استفاده از دو نوع گرماسنج امکان پذیر است:

I. گرماسنج لیوانی

II. گرماسنج بمبی

۲- روش های غیرمستقیم برای تعیین ΔH که خود به چهار روش قابل محاسبه است:

I. جمع پذیری گرمای واکنش ها، قانون هس: «اگر معادله واکنشی را بتوان از جمع معادله دو یا چند واکنش دیگر به دست آورد ΔH آن نیز از جمع جبری ΔH همان واکنش ها به دست می آید.»

II. با استفاده از آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها و فراورده ها

محاسبه ΔH بر اساس میانگین آنتالپی پیوند



گام اول: پیوند میان اتم های مواد واکنش دهنده شکسته می شود و انرژی جذب می شود. پس این مرحله همیشه گرماگیر است.

گام دوم: میان اتم های پرانرژی و جدا از هم جاذبه و پیوندهای جدید برقرار می شود.


که همیشه با آزاد شدن انرژی همراه است یعنی این مرحله گرماده است.

گام سوم: برای محاسبه ΔH کافی است اختلاف دو انرژی محاسبه گردد.

$$\Delta H = \sum \Delta H_f - \sum \Delta H_r$$



III. با استفاده از انرژی فعال سازی رفت و برگشت




$$\Delta H = E_a - E'_a$$

تذکر: در یک واکنش اغلب انرژی فعال سازی کمتر از مجموع آنتالپی پیوندهای مواد واکنش دهنده است.

زیرا در محاسبه انرژی فعال سازی پیوندها به طور کامل شکسته نمی شوند.

در نمودار:



A: انرژی G: پیشرفت واکنش B: سطح انرژی واکنش دهنده ها


C: انرژی فعال سازی رفت E: مجموع انرژی پیوندهای اولیه

D: تفاوت انرژی فعال سازی و مجموع انرژی پیوندهای اولیه

F: آنتالپی واکنش H: سطح انرژی فراورده ها

تذکر: واکنش هایی نیز وجود دارند که انرژی فعال سازی آنها بسیار کم و حتی صفر است.

مثلاً واکنش برخورد یک الکترون با پوزیترون که به دو فوتون تبدیل می شود از این نوع است.



در شیمی نیز اکثر واکنش‌های رادیکالی دارای انرژی فعالساز صفر هستند و به راحتی و با سرعت پیش می‌روند.

نوع سومی از واکنشها دارای انرژی فعال سازی منفی هستند! اگر بخواهیم ساده آن را توضیح دهیم،

در این واکنشها دادن انرژی باعث کاهش سرعت یا عدم انجام واکنش می‌شود و در واقع شما باید به نوعی

مقداری انرژی بگیرید تا واکنش به پیش برود.

نمودار انرژی واکنش‌های گرماگیر و گرماده

واکنش گرماگیر	واکنش گرماگیر
واکنش‌هایی که حین انجام واکنش با آزاد کردن گرما همراه هستند. سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها < سطح انرژی فراورده‌ها انرژی فعال‌سازی واکنش رفت > انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت مجموع انرژی‌های پیوندی واکنش‌دهنده‌ها > مجموع انرژی پیوندی فراورده‌ها سرعت واکنش رفت < سرعت واکنش برگشت $\Delta H = E_a - E'_a \quad \Delta H < 0$	واکنش‌هایی که حین انجام واکنش با گرفتن گرما همراه هستند. سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها > سطح انرژی فراورده‌ها انرژی فعال‌سازی واکنش رفت < انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت مجموع انرژی‌های پیوندی واکنش‌دهنده‌ها < مجموع انرژی پیوندی فراورده‌ها سرعت واکنش رفت > سرعت واکنش برگشت $\Delta H = E_a - E'_a \quad \Delta H > 0$

کاتالیزگر

- در بسیاری از واکنش‌های صنعتی لازم است که سرعت واکنش طوری افزایش یابد که تولید فراورده‌ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. بنابراین واکنش‌ها را در صنعت در دما و فشار بالا انجام می‌دهند ولی تولید فراورده‌ها در آنها صرفه اقتصادی ندارد توجه کنید که بحث کارایی اقتصادی یک فرایند، یک بحث صنعتی است نه آزمایشگاهی از این رو شیمی‌دان‌ها در پی یافتن شرایط بهینه (دما و فشار پایین‌تر) برای انجام چنین واکنش‌هایی هستند.
- راهی که باعث کاهش انرژی فعال سازی می‌شود استفاده از کاتالیزگر است.

- کاتالیزگر ماده‌ای است که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهد،
- کاتالیزگرها در واکنش شرکت می‌کنند؛ اما در پایان واکنش مصرف نشده باقی می‌مانند.
- کاتالیزگرها را بارها و بارها می‌توان به کار برد.
- کاتالیزگرها در صنایع گوناگون، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود زیرا برای تأمین انرژی لازم برای انجام یک واکنش سوخت زیادی مصرف می‌شود.
- به جای افزایش دما جهت افزایش سرعت واکنش از کاتالیزگر استفاده می‌شود زیرا کاتالیزگر نسبت به دما دو برتری دارد:
- (۱) انرژی کمتری مصرف می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
- (۲) خطر تجزیه گرمایی موادی که نسبت به گرما حساسند، حذف می‌شود.

قسمت دوم

قسمت دوم که از صفحه‌های ۹۶ تا ۱۰۰ کتاب درسی را شامل می‌شود. مطالب زیر را می‌خوانید:

- اثر کاتالیزگر بر انرژی فعال‌سازی واکنش
- مزایای استفاده از کاتالیزگر

جای خالی

۲۹۷. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد دو بار استفاده می‌شود).

رودیم - شیمیایی - روتنیم - کاهش - تمام - مبدل کاتالیستی - پالادیم - کاتالیزگر - گرما - افزایش - شمار معدودی از -

- م. کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری و گرمایی مناسبی داشته باشد.
- ن. مبدل کاتالیستی در خودرو شامل فلزهای ، و پلاتین است.
- س. انرژی فعال‌سازی واکنش را می‌توان با استفاده از تأمین کرد.
- ع. یکی از راهکارهایی برای کاهش یا حذف آلاینده‌های خروجی از اگزوز خودروها استفاده از است.
- ف. کاتالیزگرها در هر واکنش شیمیایی با انرژی فعال‌سازی سرعت واکنش را می‌دهند.
- ص. هر کاتالیزگر می‌تواند به واکنش‌ها سرعت ببخشد.

درست یا نادرست

۲۹۸. جمله‌های زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید و درست و نادرست بودن آن‌ها را مشخص کنید در صورت نادرست بودن شکل صحیح یا

علت نادرستی را بنویسید

- ن. کاتالیزگر در پایان واکنش دست نخورده باقی می‌ماند زیرا پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی دارند.
- س. با استفاده از کاتالیزگر می‌توان واکنش‌ها را در دماهای پایین‌تر انجام داد.
- ع. کاتالیزگرها در صنایع گوناگون می‌توانند سبب افزایش آلودگی محیط زیست شوند.
- ف. در یک واکنش، کاتالیزگر را می‌توان بارها و بارها به کار برد تا به طور کامل مصرف شوند.
- ص. در حضور کاتالیزگر نباید واکنش‌های ناخواسته دیگری انجام شود.

- ق. برای افزایش بازده می توان هر نوع کاتالیزگری را استفاده نمود.
- ر. کاتالیزورها با کاهش انرژی فعال سازی، گرمای واکنش را تغییر نمی دهند.
- ش. برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مسطح درمی آورند.
- ت. یکی از بزرگترین معایب مبدل کاتالیزور عملکرد آنها در دمای نسبتاً بالاست.
- ث. مبدل کاتالیستی برای مدت طولانی بدون آنکه کارایی آن کاهش یابد، کار می کند.
- خ. آلاینده ها در کسری از ثانیه از موتور خودرو خارج و دمای آنها به سرعت کاهش می یابد.

برقراری ارتباط

۲۹۹. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است،

این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند.)

ستون B	ستون A
(a) مبدل کاتالیستی	ا. یکی از شرایط استفاده از کاتالیزورها
(b) پایداری شیمیایی	ب. واکنشگر اضافی برای کاهش آلودگی ناشی از گاز اکسیدهای نیتروژن
(c) آمونیاک	ج. کاتالیزگری که برای مدت طولانی کار می کند اما پس از مدت معینی کارایی آن کاهش می یابد.
(d) گرمای واکنش	د. به تونلی در یک جاده کوهستانی شباهت دارد.
(e) سد انرژی انجام واکنش	ه. با وجود استفاده از کاتالیزگر مقدار آن ثابت است.
(f) NO	و. سبب ایجاد اثر گلخانه ای و بالا رفتن دمای کره زمین شده است.
(g) کاتالیزگر	
(h) عمومی بودن	
(i) CO ₂	

مهارتی

۳۰۰. مخلوط هیدروژن و اکسیژن را می توان در دمای اتاق برای مدتی طولانی نگه داشت، بدون آنکه واکنشی میان دو گاز رخ دهد؛ اما در حضور پلاتین، در همین دما، واکنش به سرعت انجام شده و آب تشکیل می شود. علت را توضیح دهید.

۳۰۱. چرا مبدل کاتالیستی را به شکل توری می سازند؟

۳۰۲. الف) در گازهای خروجی از اگزوز خودروها در هنگام روشن و گرم شدن خودرو CxHy و NO، CO به ویژه در روزهای سرد زمستان با وجود

مبدل کاتالیستی، گازهای CxHy و NO، CO مشاهده می شوند؟ چرا؟


ب) چه راهکاری برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد می کنید؟

۳۰۳. در برخی از مبدل های کاتالیستی، سرامیک را به شکل مش های (دانه های) ریز درمی آورند و کاتالیزگرها را روی سطح آن می نشانند. تجربه نشان می دهد که این مبدل ها کارایی بالاتری دارند! علت را توضیح دهید.



(رفت) E_a بدون استفاده از کاتالیزگر و با استفاده از آن، به ترتیب برابر ۴۲۰ و ۲۵۰ کیلوژول باشد، انرژی فعال سازی برگشت در حضور کاتالیزگر را به دست آورید.

۳۰۵. در تجزیه ی نیتروژن مونواکسید انرژی فعال سازی رفت در غیاب و در حضور کاتالیزگر مناسب به ترتیب ۳۸۱ و ۱۳۸ کیلوژول است. انرژی



۳۰۶. در یک واکنش فرضی رابطه ی $E_{a\text{برگشت}} - 2E_{a\text{رفت}} = 3\Delta H$ برقرار است. با توجه به این اطلاعات به پرسش های زیر پاسخ دهید:

ا. واکنش موردنظر گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

ب. سرعت این واکنش در جهت برگشت بیشتر است یا در جهت رفت؟

ج. اگر $E_{a\text{رفت}}$ این واکنش ۱۵۰ کیلوژول برمول باشد و در حضور کاتالیزگر ۲۰٪ کاهش یابد $E_{a\text{برگشت}}$ در حضور کاتالیزگر چقدر است؟

۳۰۷. در واکنش $A(g) + B(g) \rightarrow C(g) + 160 \text{ KJ}$ برای عبور هر مول واکنش دهنده از سد انرژی ۱۸۰ KJ انرژی لازم است، اگر استفاده از کاتالیزگر

انرژی فعال سازی رفت را به میزان ۶۰٪ آنتالپی واکنش کاهش دهد. انرژی فعال سازی برگشت در حضور کاتالیزگر را به دست آورید.

۳۰۸. اگر در واکنش فرضی: $2AB_{(g)} \rightarrow A_{2(g)} + B_{2(g)} \quad \Delta H = -185 \text{ KJ}$ ، (رفت) E_a با بهره گیری از کاتالیزگر و بدون بهره گیری از آن، با یکای

کیلوژول، به ترتیب برابر ۱۳۰ و ۳۸۰ باشد، چند مورد از مطالب زیر، درباره آن درست اند؟

ا. در نبود کاتالیزگر، E_a واکنش برگشت برابر ۴۶۵ KJ است.

ب. در مجاورت کاتالیزگر، E_a واکنش برگشت برابر ۳۱۵ KJ است.

ج. تفاوت سطح انرژی پیچیده فعال در دو حالت، برابر ۷۵ KJ است.


د. تفاوت E_a واکنش در جهت برگشت در دو حالت، برابر ۲۵۰ KJ است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۳۰۹. در واکنش $A + B \rightarrow C + D$ تفاوت سد انرژی و واکنش دهنده ها برابر ۲۰۰ کیلوژول بر مول و انرژی آزاد شده از تشکیل یک مول C برابر

۱۲۰ کیلوژول بر مول می باشد. اگر کاتالیزگر انرژی فعال سازی رفت را ۲۰٪ کاهش دهد، انرژی فعال سازی برگشت چند کیلوژول خواهد بود؟

۳۱۰. انرژی پیوندهای A-A, B-B و A-B به ترتیب ۲۵۰، ۵۵۰ و ۷۵۰ کیلوژول بر مول می باشد، کدام اطلاعات برای واکنش زیر درست است؟




۱) $E_a = 910$, $E'_a = 1560$, $\Delta H = -650$ ۲) $E_a = 350$, $E'_a = 1000$, $\Delta H = -650$

۳) $E_a = -700$, $E'_a = 1500$, $\Delta H = -700$ ۴) $E_a = 350$, $E'_a = 1050$, $\Delta H = -700$

۳۱۱. جدول زیر انرژی فعال سازی واکنش تجزیه اکسید دی نیتروژن را در شرایط مختلف نشان می دهد:

شرایط	بدون کاتالیزگر	کاتالیزگر $Au(s)$	کاتالیزگر $Cl_2(g)$
$E \text{ (kJ/mol)}$	۲۵۰	۱۲۰	۱۴۰

هر یک از نمودارهای زیر مربوط به کدامیک از شرایط جدول است؟



۳۱۲. با توجه به شکل زیر که مربوط به استفاده از مبدل کاتالیستی است، به پرسش‌ها پاسخ دهید:


ا. آیا نمودارهای انرژی می‌توانند مربوط به سه نوع واکنش جداگانه باشند؟

ب. در کدام نمودار مبدل کاتالیستی استفاده نشده است؟

ج. کدام نمودار مربوط به واکنشی است که مبدل کاتالیستی به صورت مش ریزه


در آمده است؟

۳۱۳. در شکل زیر X و Y را مشخص کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید




ا. هدف از تزریق ماده X به مبدل کاتالیستی چیست؟

ب. چه واکنشی با تزریق این ماده صورت می‌گیرد؟ آن را بنویسید.




۳۱۴. با توجه به واکنش انجام شده در مبدل کاتالیستی پس از تزریق $3/4$ کیلوگرم آمونیاک حساب کنید از ورود چند مترمکعب آلاینده در شرایط

STP به هواکره جلوگیری می‌کند؟ (مول/گرم $NH_3 = 17$)



۳۱۵. تغییرات عدد اکسایش نیتروژن را در واکنش زیر مشخص کنید.



بررسی نکات مهم درس



- کاتالیزورها قهرمانان ناشناخته‌ی واکنش‌های شیمیایی حیاتی در جوامع انسانی هستند.

- کاتالیزگر ماده‌ای است که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهد. با کمک کاتالیزگرها مولکول‌هایی که برای برهم‌کنش به سال‌ها زمان نیاز داشتند در چند ثانیه برهم‌کنش می‌کنند.
- کارخانه‌ها با تکیه بر کاتالیزگرها است که می‌توانند از پلاستیک تا دارو را بسازند.
- کاتالیزگرها همچنین در فرآوری نفت خام و زغال‌سنگ به سوخت‌های مایع کمک می‌کنند.
- آن‌ها در فناوری‌های انرژی پاک نقش کلیدی دارند.
- کاتالیزگرهای طبیعی بدن انسان (آنزیم‌ها) نقش مهمی از گوارش گرفته تا بیشتر از آن را ایفا می‌کنند.
- در خلال واکنشی شیمیایی، مولکول‌ها پیوندهای میان اتم‌هایشان را می‌شکنند. اتم‌ها همچنان پیوندهای تازه‌ای با دیگر اتم‌ها می‌سازند. این درست همانند یارگیری در رقص‌های محلی است. گاهی این یارگیری‌ها دوام چندانی ندارد. یک مولکول شاید خواصی داشته باشد که اتم‌هایش را از مولکول‌های دیگر دریغ کند. اما در شراکتی پایدار، مولکول‌ها چنان‌اند که اتم‌هایشان برای زمان‌های طولانی در کنار هم می‌مانند. شاید چندتایی شریک خود را عوض کنند، ولی این روندی همیشگی نیست.
- کاتالیزگرها با کاهش انرژی فعال‌سازی سبب می‌شوند که این گسستن‌ها و پیوستن‌ها پی‌درپی رخ دهد. انرژی فعال‌سازی مقدار انرژی‌ای است که نیاز است تا واکنشی شیمیایی رخ دهد.
- کاتالیزگرها تنها مسیر واکنش را به سوی تولید فراورده تغییر می‌دهند و بزرگرهای میان‌بر به جای راهی پردستانداز می‌سازند. آن‌ها در واکنش مصرف نمی‌شوند و تنها مولکول‌های دیگر را تشویق به واکنش می‌کنند و پس از انجام این کار کنار می‌روند.
- کاتالیزگر واکنش را از مسیری پیش می‌برد تا برای انجام واکنش انرژی فعال‌سازی کمتری لازم باشد و واکنش دهنده‌ها راحت‌تر و سریع‌تر به فراورده‌ها تبدیل شوند.

هر کاتالیزگر واکنش خاصی را سرعت می‌بخشد.


مبدل کاتالیستی

- در مسیر گازهای خروجی از خودروها قطعه‌ای قرار می‌دهند که می‌تواند باعث حذف یا کاهش آلاینده شود مبدل کاتالیستی نامی است که به آن نسبت می‌دهند. بر روی سطح این قطعه سرامیکی که به شکل توری به کار می‌رود، فلزهای پلاتین (Pt)، رودیم (Rh) و پالادیم (Pd) نشانداده شده است.
- برای تبدیل گازهای NO و NO₂ از گاز آمونیاک استفاده می‌کنند تا باعث فرایند کاهشی آنها شوند و مطابق یک واکنش اکسایش - کاهش به گاز پایدار نیتروژن تبدیل شود.



- برای افزایش کارایی مبدل کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه) افزایش سطح برخورد، تعداد مولکول‌های بیشتری در واکنش شرکت کنند.
- مبدل کاتالیزور، نقش بزرگی در کاهش آلاینده‌ها دارد. با این حال، هنوز هم مستلزم تغییر و تحولاتی است.
- یکی از بزرگترین معایب مبدل کاتالیزور عملکرد آنها در دمای نسبتاً بالاست.
- هنگامی که موتور خودرو سرد است، مبدل کاتالیزور تقریباً هیچ کاری برای کاهش آلاینده‌ها صورت نمی‌دهد.

- راه حلی ساده این است که مبدل کاتالیزور را هر چه بیشتر نزدیکتر به موتور نصب کنیم. یعنی گازهای گرم موتور به مبدل برخورد کرده و هر چه سریع تر آن را گرم کند،




مبدل

اما این کار می تواند به علت برخورد گازهای بسیار داغ آگروز به مبدل، از عمر آن بکاهد.

بیشتر سازندگان خودرو، مبدل را زیر خودرو و درست زیر صندلی جلو قرار می دهند تا به حد کافی از موتور دور باشد و از گازهای خروجی صدمه ای نبیند. پس گرم کردن مبدل کاتالیزور نیز راه خوبی برای کاهش انتشار آلاینده هاست.

- ساده ترین روش برای این کار، استفاده از گرمکن های الکتریکی است.

متأسفانه سامانه الکتریکی ۱۲ ولتی خودرو فاقد توان کافی برای گرم کردن سریع مبدل در حد لازم است. معمولاً بیشتر مردم چندین دبیعه تپل از استارت زدن، منتظر گرم شدن مبدل نمی مانند.




تغییرات ایجاد شده با به کار بردن کاتالیزگر

- کاتالیزگر به یک اندازه انرژی فعال سازی را کاهش می دهند نه به یک نسبت.

تغییرات انرژی فعال سازی

انرژی فعال سازی برگشت

- کاتالیزگر به یک اندازه و به یک نسبت سرعت واکنش را افزایش می دهند.



- به طور کلی آنچه که با به کار بردن کاتالیزگر در یک واکنش تغییر داده می شود در جدول خلاصه شده است:

کاتالیزگر باعث تغییرات زیر نمی شود	کاتالیزگر باعث تغییرات زیر می شود
۱) کاتالیزگر نوع واکنش نهایی را تغییر نمی دهد.	۱. کاتالیزگر باعث تغییر ساز و کار و مسیر انجام واکنش می شود.
۲) سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده ها تغییر نمی کند.	۲. سطح سد انرژی را کاهش می دهد.
۳) نوع و پایداری فراورده تغییر نمی کند.	۳. زمان انجام واکنش را کوتاه می کند.
۴) خصوصیات ترمودینامیکی را تغییر نمی دهد.	۴. سرعت واکنش را افزایش می دهد.
۵) آنتالپی واکنش (ΔH) تغییر نمی کند.	۵. انرژی فعال سازی رفت و برگشت را به یک اندازه کاهش می دهد.

قسمت سوم

قسمت سوم که از صفحه های ۱۰۱ تا ۱۰۵ کتاب درسی را شامل می شود، مطالب زیر را می خوانید:

- آمونیاک و بهره وری در کشاورزی
- تغییر حجم سامانه در تعادل های گازی

جای خالی

۳۱۶. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد اضافی هستند).

میزان پیشرفت - لوشاتلیه - آهن - هابر - آب - محلول نقره نیترات - به طور کامل - به طور جزئی - بدون تغییر می ماند - $\frac{1}{4}$ برابر می شود - حجم - فشار بر - رفت - برگشت

- ط. تولید فراورده بیشتر در شرایط معین، به واکنش در آن شرایط بستگی دارد.
- ی. شرایط بهینه تولید آمونیاک توسط به دست آمد و فلز را به عنوان کاتالیزگر انتخاب نمود.
- ک. با افزودن به تعادل $2Ag(s) + Cu^{2+}(aq) \rightleftharpoons Cu(s) + 2Ag^{+}(aq)$ تعادل در جهت برگشت جابه جا می شود.
- ل. با مخلوط کردن گازهای نیتروژن و هیدروژن با نسبت استوکیومتری گاز آمونیاک تشکیل می شود.
- م. با دو برابر کردن غلظت A در تعادل $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$ ثابت تعادل
- ن. افزایش سامانه، تعادل $2A(g) \rightleftharpoons B(g)$ را در جهت جابه جا می کند.

درست یا نادرست

۳۱۷. جمله های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمله های نادرست را بنویسید.

- در تعادل انرژی های فعال سازی واکنش های رفت و برگشت مساوی است.
- مقدار عددی ثابت تعادل معیاری برای میزان پیشرفت واکنش است.
- تعادل یعنی ثابت ماندن غلظت مواد شرکت کننده در واکنش است.
- هر واکنش تعادلی حتماً برگشت پذیر است.
- مقدار ثابت تعادل با افزایش حجم سامانه در واکنش $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ افزایش می یابد.

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

و. با حذف NH_4Cl در تعادل زیر $\text{NH}_4\text{Cl}(s) \rightleftharpoons \text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g)$ تعادل همچنان برقرار است.

ز. با افزایش غلظت اکسیژن در سامانه تعادلی می یابد. غلظت تمام گونه های شرکت کننده در تعادل افزایش

انتخاب کنید

۳۱۸. هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

ج. در سامانه $\frac{\text{باز}}{\text{بسته}}$ در یک واکنش تعادلی، غلظت واکنش دهنده و فراورده $\frac{\text{برابر}}{\text{ثابت}}$ و سرعت واکنش در جهت رفت و برگشت $\frac{\text{صفر}}{\text{برابر}}$ خواهد بود.

د. هنگامی که در دمای ثابت، غلظت $\text{HCl}(g)$ در سامانه تعادلی $\text{NH}_4\text{Cl}(s) \rightleftharpoons \text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g)$ $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ یابد، واکنش در جهت

$\frac{\text{رفت}}{\text{برگشت}}$ آن پیش می رود تا به تعادل $\frac{\text{آغازی}}{\text{جدید}}$ برسد.

ه. اگر در دمای ثابت حجم سامانه $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ یابد، واکنش در جهت $\frac{\text{رفت}}{\text{برگشت}}$ آن پیش می رود و مول

$\text{CaO}(s)$ $\frac{\text{افزایش می یابد}}{\text{بدون تغییر می ماند}}$

و. در سامانه تعادلی $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ با $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ فشار، سرعت واکنش در جهت رفت $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد. و غلظت گونه های شرکت

کننده در تعادل $\frac{\text{افزایش می یابد}}{\text{بدون تغییر می ماند}}$

برقراری ارتباط



۳۱۹. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است. این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر

بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند).

ستون B	ستون A
(a) فریتس هابر	ا. به طور مستقیم به عنوان کود شیمیایی به خاک افزوده می شود
(b) آمونیاک	ب. بهترین راه حل برای تأمین غذا به عنوان یکی از چالش های زندگی
(c) وارد کردن گاز هیدروژن	ج. تعیین کننده شرایط بهینه برای تولید آمونیاک
(d) افزایش بهره وری در تولید فراورده های کشاورزی	د. مطابق این اصل واکنش تعادلی تا حد امکان در جهت جبران تغییر اعمال شده آن جابه جا می شود.
(e) نیتروژن	ه. این تغییر در جابه جایی تعادل $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ بی اثر است.
(f) لوشاتلیه	و. با اضافه کردن آب به تعادل
(g) ثابت یونش اسیدی	$\text{HF}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(aq) + \text{F}^-(aq)$ تغییر نمی کند.
(h) فشار	
(i) pH	


مهارتی

۳۲۰. مطابق شکل زیر، ظرف واکنش دارای دو مول گاز SO_2 و دو مول گاز SO_3 است با توجه به آن درستی و نادرستی جملات داده شده را بررسی کنید:




- در آغاز واکنش سرعت انجام آن هم در جهت رفت و هم برگشت صفر است.
- سرعت برگشت واکنش نسبت به زمانی که فقط دو مول SO_2 داریم کمتر است.
- پس از مدتی واکنش فقط در جهت برگشت انجام می شود.
- در آغاز واکنش سرعت انجام آن در جهت برگشت زیاد است ولی با گذشت زمان صفر می شود.
- واکنش پس از مدتی به تعادل می رسد و نسبت غلظت ها ثابت می شود.

۳۲۱. در صنعت، از گرما دادن به کلسیم کربنات جامد در کوره ای با دمای حدود 827°C کلسیم اکسید جامد را به دست می آورند.



با دقت به شکل های زیر نگاه کنید و سپس به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.




الف) در کدام شکل، این تعادل برقرار شده است؟

ب) اگر هر ذره معادل با 0.01 مول باشد، حجم ظرف چند لیتر است؟

پ) در کدام شکل، واکنش کامل شده است؟


ت) با توجه به این شکل ها، چه روشی برای کامل کردن واکنش های تعادلی پیشنهاد می کنید؟

۳۲۲. به کمک نمودار روبه رو، معادله واکنش تعادلی موازنه شده را نوشته و مقدار ثابت تعادل را به همراه یکای آن به دست آورید.




۳۲۳. دانش آموزی به کمک نمودار داده شده مقدار ثابت تعادل

به درستی محاسبه کرده است. شیوه محاسبه این دانش آموز را توضیح دهید و K را به دست آورید.



۳۲۴. برای هر یک از عبارات ثابت تعادل یک معادله موازنه شده بنویسید.



۳۲۵. ثابت تعادل در یک دمای معین برای کدام واکنش $K=2.8 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ می تواند باشد.


۱)

۲)

۳)

۴)

۳۲۶. مقدار ۱۵/۳۹ گرم NH_4Cl را در ظرف سر بسته ۲ لیتری در دمای ثابت قرار می دهیم تا تعادل زیر برقرار شود. اگر جرم آمونیوم کلرید در زمان تعادل ۴/۶۵ گرم باشد ثابت تعادل را محاسبه کنید.



۳۲۷. ظرفی ۱۰ لیتری حاوی ۳۰ مول NO_2 می باشد در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد ۸۰ درصد NO_2 مطابق معادله زیر تجزیه می شود. ثابت تعادل در این دما کدام است؟

۳۲۸. مقدار ۶ مول مادهی A و ۴ مول مادهی B وارد ظرفی به حجم V لیتر شده است تا تعادل

برقرار شود. اگر ثابت تعادل واکنش فوق برابر $0.5 \text{ mol}^{-1} \text{ L}$ بوده و پس از برقراری تعداد مول های B برابر ۳ مول باشد حجم ظرف چند لیتر بوده است؟

۳۲۹. ۰/۶۲۵ گرم کلسیم کربنات خالص را در ظرف یک لیتری قرار می دهیم، در آن را می بندیم و دما را به ۸۰۰ درجه سانتی گراد می رسانیم تا تعادل برقرار شود. هر گاه جرم مواد جامد در موقع برقراری تعادل ۰/۵ گرم باشد، ثابت تعادل واکنش کدام است؟

۳۳۰. تعادل اولیهی زیر در یک دمای معین و در ظرفی به حجم یک لیتر برقرار است:

در همان دما بر تعادل اولیه تغییراتی تحمیل می گردد که در نتیجهی آن تعادل جابه جا شده، بعد از مدتی تعادل ثانویه برقرار می شود. با توجه به اطلاعات کمی مربوط به این آزمایش که در جدول مقابل آمده است به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

$[H_2O]$	$[CH_4]$	$[H_2]$	$[CO]$	
۰/۳۸۷	۰/۳۸۷	۱/۳۸۹	۰/۶۱۳	تعادل اولیه
۰	۰/۳۸۷	۱/۳۸۹	۰/۶۱۳	اولین لحظه ی اعمال تغییر
؟	؟	؟	۰/۴۹۱	تعادل جدید

(آ) چه تغییری بر تعادل اولیه تحمیل شده است؟ توضیح دهید.

(ب) در تعادل جدید غلظت CH_4 ، H_2O و H_2 را محاسبه کنید.

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

(پ) ثابت تعادل را در تعادل اولیه و تعادل ثانویه با هم مقایسه کنید.

۳۳۱. در دمای معین سامانه

۰/۰۱۲ مول متان CH_4 تزریق شود.

(آ) پس از تزریق متان تعادل در چه جهتی جابه‌جا می‌شود؟

		CO		
۰/۴	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۳	غلظت های تعادلی در حالت (۱)
۰/۴۱۲	۰/۲	۰/۰۲	۰/۰۳	غلظت ها در لحظه تغییر در تعادل
؟	؟	؟	۰/۰۴۸	غلظت های تعادلی در حالت (۲)

(ب) با توجه به غلظت تعادلی هیدروژن در

حالت (۲) غلظت های تعادلی CH_4 و

CO را در جدول بنویسید.

۳۳۲. تعادل اولیه‌ی زیر در یک دمای معین و در ظرفی به حجم یک لیتر برقرار است:

در همان دما بر تعادل اولیه تغییری تحمیل می‌گردد که در نتیجه‌ی آن تعادل جابه‌جا شده، بعد از مدتی تعادل ثانویه برقرار می‌شود. با توجه به جدول پاسخ دهید:

(آ) چه تغییری بر تعادل اولیه تحمیل شده است؟ توضیح دهید.

$[\text{H}_2]$	$[\text{CO}]$	$[\text{CH}_3\text{OH}]$	
۰/۲۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۰	تعادل اولیه
۰/۴۰۰	۰/۲۰۰	۰/۰۸۰	اولین لحظه‌ی اعمال تغییر
؟	؟	۰/۱۳۱	تعادل جدید

(ب) در تعادل جدید غلظت CO و H_2 را محاسبه کنید.

۳۳۳. اگر مقدار ثابت تعادل یک واکنش تعادلی که شرکت کننده های آن تنها

در فازهای جامد و گاز هستند، برابر با

$\text{mol}^{-1}\text{L} \times 10^2 / 2$ باشد، کاهش حجم این سامانه در دمای ثابت سبب می‌شود تا


(۱) مقدار ثابت تعادل افزایش یابد.

(۲) بر جرم مواد جامد افزوده شود.

(۳) بر جرم مواد گازی افزوده شود.


(۴) مقدار ثابت تعادل کاهش یابد.

۳۳۴. اگر در تعادل: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ در دمای معین ثابت تعادل برابر ۵۰ باشد، در همان دما ثابت تعادل واکنش:



۳۳۵. با توجه به تعادل: $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ ، $K = ۰/۰۱$ ، اگر حجم ظرف ۵ لیتر مقدار ی در زمان تعادل ۰/۰۱ مول بر لیتر باشد. مقدار HI

در این شرایط چند مول است؟



۳۳۶. با توجه به داده های مندرج در شکل زیر در حجم ۱۰ لیتر ثابت تعادل واکنش زیر را به دست آورید.



۳۳۷. مخلوطی به نسبت مولی برابر گازهای A_2 و B_2 را در ظرف در بسته حرارت دهیم،

تا تعادل: $\text{A}_2(\text{g}) + \text{B}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + \text{D}(\text{g})$ برقرار شود. اگر در هنگام

تعادل $\frac{[\text{C}]}{[\text{A}_2]} = 0.4$ باشد، ثابت تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟

۳۳۸. تعادل گازی در نظر بگیرید. هرگاه x مول NO_2 و ۴ مول N_2O_4 را در ظرف ۱ لیتری

مخلوط کنیم غلظت NO_2 چقدر باشد تا همواره سرعت واکنش تا رسیدن به تعادل در جهت رفت از برگشت بیش تر باشد.

$$[\text{NO}_2] < 2 \quad (1) \quad [\text{NO}_2] < 4 \quad (2) \quad [\text{NO}_2] > 2 \quad (3) \quad [\text{NO}_2] > 1 \quad (4)$$

۳۳۹. در واکنش تعادلی $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ در یک ظرف ۱ لیتری در هنگام تعادل ۳ مول A ، ۱ مول B ، ۶ مول C و ۸ مول D وجود دارند، اگر به

این تعادل ۲ مول B و ۲ مول C اضافه شود پس از برقراری تعادل مجدد غلظت جسم A و D کدام است.

۳۴۰. درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص کنید.

(آ) تغییر فشار برهمه ی سامانه های تعادلی به طور قابل ملاحظه ای مؤثر است.

(ب) هیچ سامانه ی تعادلی گازی وجود ندارد که تغییر فشار بر آن تأثیر نداشته باشد.

(پ) تغییر فشار یک سامانه ی تعادلی گازی با تغییر حجم آن اعمال می شود.


(ت) افزایش فشار یک سامانه ی گازی، باعث جابه جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی کمتر می شود.

(ث) کاهش فشار یک سامانه ی گازی، باعث جابه جا شدن تعادل به سمت تعداد مول های گازی بیشتر می شود.

(ج) به طور کلی تغییر فشار سامانه ی گازی شکلی که از فشار تأثیر می پذیرد، تعادل به سمتی جابه جا می شود که اثر تغییر فشار اعمال

شده را به حداقل برساند.

۳۴۱. در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد مقدار H_2S را در یک ظرف به حجم یک لیتر وارد کرده ایم تا مطابق معادله ی زیر تجزیه



و غلظت H_2 برابر ۰/۲ باشد مقدار اولیه H_2S چند گرم بوده است.

۳۴۲. اگر در یک ظرف سربسته با حجم معین ۲ مول N_2 و ۳ مول H_2 با هم مخلوط شوند تا در شرایط معین، واکنش

برقرار شود کدام یک از عبارتهای زیر درست و کدام یک نادرست است؟ علت را بیان کنید

(۱) سرعت تولید NH_3 به مرور کاهش می یابد.

(۲) با نصف کردن حجم سامانه، سرعت واکنش رفت و برگشت افزایش می یابد.

(۳) غلظت گاز نیتروژن در زمان تعادل صفر می شود.

(۴) در زمان تعادل سرعت مصرف H_2 با سرعت مصرف آمونیاک با هم برابر است.

(۵) سرعت مصرف NH_3 تا زمان رسیدن به تعادل به مرور افزایش می یابد.

(۶) در لحظه تعادل، غلظت گاز آمونیاک دو برابر گاز نیتروژن است.


(۷) با دو برابر کردن حجم سامانه، فقط غلظت گاز آمونیاک کاهش می یابد.

۳۴۳. تعادل شیمیایی $\text{AB}_{(\text{g})} \rightleftharpoons \text{A}_{(\text{g})} + \text{B}_{(\text{g})}$ ، در ظرف سربسته ۱۰ لیتری در دمای اتاق برقرار است،

أ. با کاهش فشار، سرعت واکنش رفت نسبت به واکنش برگشت چه تغییری می کند؟

ب. با کاهش حجم ظرف به ۵ لیتر، ثابت تعادل را نسبت به حالت قبل مقایسه کنید.

۳۴۴. در یک ظرف استوانه‌ای با پیستون روان با حجم ۳ لیتر، ۳ مول از هر یک از گازهای شرکت کننده در واکنش:



مول بر لیتر می شود؟

۳۴۵. با افزایش کدام یک از مواد زیر به سامانه تعادلی

شود.

(۲) افزایش یک گرم NH_4I

(۱) افزایش یک گرم $Pb(NO_3)_2$

(۴) افزایش یک گرم KI

(۳) افزایش یک گرم NH_4Cl

را نصف کنیم کدام اتفاق رخ می دهد.

۳۴۶. هر گاه حجم ظرف حاوی تعادل

(۲) در تعادل جدید ثابت تعادل نصف می شود.

(۱) غلظت N_2 و H_2 کاهش می یابد.

(۴) سرعت واکنش رفت و برگشت کاهش می یابد.

(۳) تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می شود.

۳۴۷. هر گاه ۳ مول HI را در دمای معین در ظرفی به حجم ۱ لیتر قرار دهیم تا واکنش تعادلی زیر برقرار شود در هنگام تعادل چند درصد از HI

تجزیه شده است.

۳۴۸. ۰/۵ مول از هر یک از گازهای CO و Cl_2 را وارد ظرف سربسته ۲ لیتری کرده تا در دمای ثابت تعادل گازی

برقرار شود. بازده درصدی واکنش چند است؟

را نشان می دهد، کدام عبارت

۳۴۹. اگر نمودار روبه رو چگونگی تغییرات غلظت مواد موجود در تعادل


زیر درست است؟

(۱) در تعادل جدید مقدار K کاهش می یابد.

(۲) در لحظه اعمال تغییر، سرعت واکنش رفت از برگشت بیش تر است.

(۳) نسبت غلظت واکنش دهنده ها در تعادل قبلی تغییری نکرده است.

(۴) در لحظه اعمال تغییر، نسبت غلظت ها در واکنش زیاد شده است.



۳۵۰. در سامانه در حال تعادل $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ افزودن مقداری $CaO(s)$ چه تاثیری در حالت تعادلی در دمای

معین دارد؟


(۱) سرعت واکنش های رفت و برگشت افزایش می یابند.

(۲) تعادل به سمت چپ جابه‌جا می شود.

(۳) تعادل در جهت راست جابه‌جا می شود.

(۴) فشار گاز $CO_2(g)$ ثابت می ماند.

۳۵۱. با توجه به شکل روبه‌رو و ثابت در نظر گرفتن دما، کدام مطلب نادرست است؟



(۱) کاهش حجم، سبب جابه‌جا شدن تعادل در جهت رفت شده است.


(۲) مقدار ثابت تعادل در حالت ۱ برابر ۲۸۲/۲ است.

(۳) با کاهش حجم ظرف، غلظت اکسیژن ۴/۳ برابر شده است.

(۴) غلظت $SO_2(g)$ بر اثر افزایش فشار ۱۲/۲ برابر شده است.

۳۵۲. مقداری کلسیم کربنات را در ظرف سرپسته‌ای حرارت می‌دهیم تا با برقراری تعادل $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ فشار، درون ظرف در P_1 ثابت بماند. اگر در دمای ثابت، حجم ظرف را نصف کنیم، فشار درون ظرف در تعادل جدید (P_2) چه رابطه‌ای با فشار اولیه (P_1) دارد؟

۳۵۳. اگر در یک ظرف ۲ لیتری با پیستون متحرک، در دمای معین مقداری PCl_5 گرما داده شود، پس از تشکیل ۷۱ گرم گاز کلر، تعادل:



شود، واکنش در کدام جهت جابه‌جا شده و مقدار PCl_5 اولیه، چند مول بوده است؟ ($Cl = 35.5$)

۳۵۴. کدام عبارت در مورد سامانه تعادلی $3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$ درست است؟


(۱) افزایش غلظت $H_2(g)$ باعث افزایش غلظت Fe می‌شود.

(۲) با کاهش مقدار Fe_2O_3 تعادل در جهت رفت جا به جا می‌شود.

(۳) با کاهش مقدار H_2O مقدار Fe_2O_3 نیز کاهش می‌یابد.

(۴) با افزایش غلظت Fe_2O_3 غلظت H_2O نیز افزایش می‌یابد.


۳۵۵. شکل مقابل را به دقت نگاه کنید. در ظرف A تعادل زیر برقرار است:



اگر شیر را باز کنیم:

الف- غلظت H_2 چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

ب- تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟



بررسی نکات مهم درس

محاسبات کمی در تعادل

- هنگامی می‌توان از عبارت ثابت تعادل استفاده کرد که واکنش برگشت پذیر به تعادل رسیده باشد؛ اما این که چه موقع، تعادل برقرار می‌شود، بستگی به سرعت واکنش دارد.
- در تعادل تغییرات غلظت واکنش دهنده‌ها با فراورده‌ها رابطه دارد. یعنی آنچه که از واکنش دهنده‌ها کاسته می‌شود با توجه به ضرایب استوکیومتری آن‌ها به فراورده‌ها تبدیل می‌شود.



- نسبت حاصل ضرب غلظت تعادلی فراورده‌ها هریک به توان ضریب استوکیومتری به حاصل ضرب غلظت تعادلی واکنش دهنده‌ها هر یک به توان ضریب استوکیومتری، همواره مقدار ثابتی است.

• در واکنش تعادلی $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ مقدار ثابت برابر است: $K_c = \frac{[D]^d [C]^c}{[A]^a [B]^b}$


- مقدار ثابت تعادل با جایگزین کردن غلظت‌های تعادلی واکنش دهنده و فراورده‌هایی گازی و یا محلول به دست می‌آید.

تعادل های همگن و ناهمگن

- در تعادل همگن همه مواد شرکت کننده در تعادل، در یک فاز هستند. تعادل‌های گازی و محلول، یک فاز هستند. از این رو، این واکنش‌ها تعادلی، همگن به شمار می‌روند. $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$
- اسیدها و بازها که در آب به یون‌های مثبت و منفی یونیده می‌شوند، و به تعادل می‌رسند. تک فاز هستند چون همگی در آب محلولند. ولی آب در رابطه ثابت یونش به دلیل ثابت بودن غلظت نوشته نمی‌شود.



- در تعادل ناهمگن، مواد شرکت کننده در تعادل در فازهای متفاوتی قرار دارند. برای نمونه، هرگاه کلسیم کربنات جامد در سامانه بسته‌ای گرم شود، تعادل زیر میان این ترکیب و فراورده‌های حاصل از تجزیه آن برقرار می‌شود. این تعادل، نمونه‌ای از یک تعادل ناهمگن سه فازی است.



و در رابطه ثابت تعادل، مواد جامد به دلیل ثابت بودن غلظت نوشته نمی‌شوند. گویی این مقادیر ثابت، در مقدار ثابت تعادل گنجانده شده است.

الف) روش حل مسائل در مبحث تعادل با مطرح شدن غلظت‌های تعادلی

با جایگزین کردن غلظت‌های تعادلی در عبارت ثابت تعادل می‌توان به سه دسته از مسائل پاسخ داد.

۱) محاسبه ثابت تعادل :

مقدار ثابت تعادل با جایگزین کردن غلظت‌های تعادلی واکنش دهنده و فراورده‌ها، به دست می‌آید. اگر داده‌ها بر حسب گرم یا مول باشد، باید داده‌ها را با استفاده از حجم سامانه و یا جرم مولی به غلظت تبدیل کرد.

مثال ۱ : هرگاه در ظرف ۴ لیتری در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد، ۱ مول NH_3 به همراه ۲ مول N_2 و ۴ مول H_2 در تعادل باشند. ثابت تعادل در این دما چند است؟

پاسخ: برای به دست آوردن ثابت تعادل، ابتدا غلظت‌ها محاسبه می‌شود:

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

$$[NH_3] = \frac{1}{4} = 0.25, \quad [N_2] = \frac{2}{4} = 0.5, \quad [H_2] = \frac{4}{4} = 1 \text{ mol.L}^{-1}$$


$$K = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{0.25^2}{0.5 \times 1^3} = 0.125 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2$$

تذکر: گاهی، غلظت‌های تعادلی همه گونه‌های شرکت کننده در تعادل داده نمی‌شود. در این موارد اگر غلظت تعادلی برخی گونه‌ها معلوم باشد، می‌توان با بهره‌گیری از نسبت ضرایب استوکیومتری واکنش، غلظت‌های تعادلی دیگر گونه‌ها را محاسبه کرد.

مثال ۲: مقداری NH_4Cl را در ظرف سربسته ۲ لیتری در دمای ثابت قرار می‌دهیم تا تعادل زیر برقرار شود. اگر جرم آمونیاک در زمان تعادل ۵/۱ گرم باشد ثابت تعادل را محاسبه کنید.


$$(N=14 \quad Cl=35.5 \quad H=1)$$

پاسخ:



مثال ۳: هرگاه مقداری گاز $SO_2(g)$ را در ظرف ۲ لیتری وارد شود و پس از برقراری تعادل، ۲ مول $SO_2(g)$ و ۴ مول $O_2(g)$ در ظرف واکنش موجود است، ثابت تعادل را به دست آورید.

پاسخ: از روی مقدار گاز اکسیژن می‌توان مقدار گاز $SO_2(g)$ را به دست آورد که با توجه به ضریب استوکیومتری آن دو برابر اکسیژن یعنی ۸ مول است.




$$[SO_2] = \frac{2}{2} = 1, \quad [O_2] = \frac{4}{2} = 2, \quad [SO_3] = \frac{8}{2} = 4 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$K = \frac{[SO_3]^2}{[O_2][SO_2]^2} = \frac{1^2}{2 \times 4^2} = 0.03125 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2$$

(۲) محاسبه‌ی غلظت یکی از واکنشگرها با استفاده از ثابت تعادل:

می‌توان با بهره‌گیری از ثابت تعادل، غلظت(های) تعادلی گونه(های) مجهول را حساب کرد.

مثال ۱: در محلول هیدروفلوئوریک اسید که غلظت HF برابر با ۰/۰۱ مول بر لیتر و ثابت یونش اسیدی برابر $5/9 \times 10^{-4}$ است، غلظت یون هیدرونیوم چند مول بر لیتر خواهد بود؟



$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{F}^-]$$

پاسخ:

$$5/9 \times 10^{-4} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HF}]} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 5/9 \times 10^{-4} \times 0/1 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 2/4 \times 10^{-2}$$

مثال ۲: در یک آزمایش ۰/۵ مول N_2 و ۰/۵ مول O_2 در یک ظرف به حجم ۲۵۰ میلی لیتر در تعادل است.



$$\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) \quad K = 4 \times 10^{-4} = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2][\text{O}_2]} \Rightarrow [\text{NO}]^2 = 4 \times 10^{-4} \times 2 \times 2 = 1/6 \times 10^{-3} \Rightarrow [\text{NO}] = 0/4 \text{ mol L}^{-1}$$

پاسخ:

$$\frac{0/5}{0/250} = 2 \quad [\text{O}_2] = \frac{0/5}{0/250} = 2 \quad [\text{NO}] = ?$$

۳ محاسبه‌ی حجم ظرف واکنش:

با استفاده از ثابت تعادل و مقدار گونه‌های شرکت کننده در تعادل، می‌توان حجم محلول را به دست آورد.

تذکر: می‌توان رابطه‌ی ثابت تعادل را برای واکنش عمومی $a\text{A}(\text{g}) + b\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons c\text{C}(\text{g}) + d\text{D}(\text{g})$ به صورت زیر نوشت:

$$K = \frac{[\text{D}]^d [\text{C}]^c}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b} = \frac{(\text{mol D})^d (\text{mol C})^c}{(\text{mol A})^a (\text{mol B})^b} \times V^m$$

$$m = (a+b) - (d+c)$$

مثال: مقدار ۶ مول ماده‌ی A و ۱ مول ماده‌ی B با ۲ مول ماده‌ی C در ظرفی به حجم V لیتر در تعادل $\text{A}(\text{s}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$

است. اگر ثابت تعادل واکنش فوق برابر $0/5 \text{ mol}^{-1} \text{L}$ باشد حجم ظرف چند لیتر بوده است؟

$$\text{A}(\text{s}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) \quad K = \frac{[\text{C}]}{[\text{B}]^2} = \frac{\frac{2}{V}}{\left[\frac{1}{V}\right]^2} = 0/5 \Rightarrow V = 0/25 \text{ L} = 250 \text{ ml}$$

or

پاسخ:


$$K = \frac{\text{mol C}}{(\text{mol B})^2} \times V^{2-1} \Rightarrow 0/5 = \frac{2}{1^2} \times V \Rightarrow V = \frac{0/5}{2} = 0/25 \text{ L}$$

نکات مربوط به ثابت تعادل

- ثابت تعادل هر واکنش در دمای ثابت، مقداری ثابت است.
- ثابت تعادل به مقدار اولیه واکنش دهنده‌ها یا فراورده‌ها بستگی ندارد.
- مقدار عددی ثابت تعادل معیاری برای میزان پیشرفت واکنش است.

- مقدار عددی ثابت تعادل در همه واکنش ها نشان دهنده این است که در تعادل، غلظت کدام شرکت کننده ها بیشتر است.
- هر چه ثابت تعادل بزرگتر باشد، تمایل تبدیل واکنش دهنده ها به فراورده ها بیشتر است یا درصد پیشرفت واکنش بیشتر و غلظت فراورده ها زیادتر می شود.

- با آن که هنگام نوشتن عبارت ثابت تعادل از نوشتن غلظت مواد جامد و مایع خالص صرف نظر می کنیم، اما حضور مواد جامد و مایع در تعادل




- ثابت تعادل دارای یکا است. و در واکنش $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ برابر است با:


$$\text{یکا ثابت تعادل} = \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right]^n$$

$$n = (c + d) - (a + b)$$

- چنانچه یک واکنش تعادلی را به طور معکوس بنویسیم، رابطه ثابت تعادل نیز برعکس می شود یعنی به توان منفی یک می رسد.




- چنانچه یک واکنش تعادلی را در ضربی، ضرب کنیم، رابطه ثابت تعادل نیز به توان آن ضرب می رسد.



ب) روش حل مسائل در مبحث تعادل با مطرح شدن غلظت های اولیه

اغلب، غلظت های تعادلی همه گونه های شرکت کننده در تعادل در دسترس نیست. در این موارد اگر غلظت برخی گونه ها معلوم باشد، می توان با بهره گیری از استوکیومتری واکنش، غلظت های تعادلی دیگر گونه ها را محاسبه کرد. در واکنش عمومی زیر که در جهت رفت جابه جا می شود.



برای به دست آوردن غلظت های تعادلی از یک جدول با اطلاعات داده شده استفاده می گردد.

معادله واکنش	$aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$			
مول اولیه	m	n	.	.
تغییر مول Δn	-aX	-bX	+cX	+dX
مول تعادلی	m-aX	n-bX	cX	dX
غلظت تعادلی	_____	_____	_____	_____

تغییر مول Δn ، برای واکنش دهنده همان مقدار شرکت کننده در واکنش و برای فراورده، مقدار تولید شده در تعادل است.

تذکره ۱: اگر در مسئله ای بازده واکنش یا درصد تفکیک، برای یکی از واکنشگرها داده شود، برای به دست آوردن تغییرات مول Δn از فرمول زیر

استفاده می کنیم:

_____ بازده

تذکره ۲: اگر در مسئله‌ای بازده واکنش یا درصد تفکیک، برای باقیمانده یکی از واکنشگرها داده شود، برای به دست آوردن تغییرات مول Δn از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

بازده —

تذکره ۳: با آن که هنگام نوشتن عبارت ثابت تعادل از نوشتن غلظت مواد جامد و مایع خالص صرف نظر می‌کنیم، اما حضور مواد جامد و مایع در جدول تعادل الزامی است.

مثال ۱: از واکنش ۰/۲۵ مول گاز A با نیم مول گاز B در ظرف یک لیتری مطابق واکنش: $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g)$ دردمای معین ۰/۱۵ مول

گاز C تشکیل می‌شود. ثابت تعادل در این دما چقدر است ؟

معادله واکنش	$A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g)$		
مول اولیه	۰/۲۵	۰/۵	۰
تغییر مول Δn	-X	-۳X	+X
مول تعادلی	۰/۲۵ - X = ۰/۱	۰/۵ - ۳X = ۰/۰۵	۰/۱۵
غلظت تعادلی	۰/۱	۰/۰۵	۰/۱۵

$$K = \frac{[C]}{[A][B]^2} = \frac{0.15}{0.1 \times 0.05^2} = 1/2 \times 10^4$$

مثال ۲: ۱/۳۲ مول گاز N_2O_4 را در یک ظرف ۱۰ لیتری تا دمای معینی

گرما می‌دهیم اگر در لحظه برقراری تعادل: $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

تعداد مول های N_2O_4 و NO_2 برابر باشد، مقدار K کدام است ؟


$$\text{mol } NO_2 = \text{mol } N_2O_4 \Rightarrow 1/32 - x = 2x \Rightarrow x = 0.044 \text{ mol} \quad K = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} = \frac{0.088^2}{0.088} = 0.088$$

معادله واکنش	$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$	
مول اولیه	۱/۳۲	۰
تغییر مول Δn	-x	+۲x
مول تعادلی	۱/۳۲ - x = ۰/۰۸۸	۲x = ۰/۰۸۸
غلظت تعادلی	۰/۰۸۸	۰/۰۸۸

آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی

- بهترین راه حل برای تأمین غذا افزایش بهره‌وری در تولید فراورده‌های کشاورزی است.
- نیتروژن را به شکل ترکیب‌های نیتروژن‌دار از جمله آمونیاک و اوره به خاک می‌افزایند.
- آمونیاک را به صورت مایع به طور مستقیم به عنوان کود شیمیایی به خاک زراعی تزریق می‌کنند.
- آمونیاک را از واکنش مستقیم گاز نیتروژن و هیدروژن نمی‌توان در دمای اتاق حتی در حضور کاتالیزگر یا جرقه به دست آورد.
- واکنش برگشت پذیر است و می‌تواند در شرایط مناسب به تعادل برسد. تعادلی که در دمای معین، مخلوطی از گازهای واکنش دهنده و فراورده با غلظت ثابت است.

- تولید آمونیاک بیشتر در شرایط معین، به میزان پیشرفت واکنش در آن شرایط بستگی دارد. به دیگر سخن هر چه میزان پیشرفت واکنش بیشتر باشد، درصد بیشتری از واکنش دهنده‌ها به آمونیاک تبدیل می شوند.
- فریتس هابر موفق شد شرایط بهینه واکنش را بیابد. (فشار برابر ۲۰۰ اتمسفر، دما برابر 450°C در حضور کاتالیزگر آهن).



- مطابق نمودارها میزان تولید آمونیاک با افزایش دما کمتر و با افزایش فشار بیشتر می شود.

عوامل موثر بر تعادل

با برقراری تعادل، سرعت واکنش های رفت و برگشت باهم برابر و غلظت مواد شرکت کننده در تعادل ثابت می شود. این برابری سرعت ها و ثابت شدن غلظت ها، تا زمانی که عاملی مزاحم تعادل نشود، پابرجا می ماند. عواملی چون تغییر غلظت، تغییر فشار و تغییر دما می توانند موجب برهم زدن تعادل شوند.

اصل لوشاتلیه

اگر عاملی موجب برهم زدن یک سامانه تعادلی شود، سامانه در جهتی جابه جا می شود که با عامل مزاحم مقابله کرده و تا آنجا که امکان دارد اثر آن را تعدیل کند. بدین ترتیب، در سامانه یاد شده یک تعادل جدید برقرار می شود.

اثر تغییر غلظت


یکی از راه های برهم زدن تعادل های شیمیایی تغییر غلظت شرکت کننده هاست. ساده ترین راه تغییر غلظت آن است که شمار مول های یکی از شرکت کننده ها را در دما و حجم ثابت تغییر داد. بدیهی است که افزودن مقداری از یکی از شرکت کننده ها در دما و حجم ثابت به سامانه، باعث افزایش غلظت آن خواهد شد.

اضافه کردن آب به سامانه محلول نیز باعث تغییر غلظت گونه های شرکت کننده می شود.

طبق اصل لوشاتلیه، با زیاد کردن غلظت هر ماده تعادل در جهت مصرف آن ماده جابه جا می شود و با کم کردن غلظت هر ماده تعادل در جهت تولید آن ماده پیش می رود.

مثال: هرگاه در تعادل $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ مقدار ۱ مول $\text{SO}_2(\text{g})$ به سامانه افزوده شود انتظار می رود که در سامانه $1/68$

مول $\text{SO}_2(\text{g})$ در تعادل مشاهده شود ولی با کمتر بودن مقدار آن مشخص است که سامانه در جهت برگشت جابه جا شده است و سرعت واکنش برگشت از سرعت واکنش رفت بیشتر می گردد؛ در تعادل جدید غلظت $\text{SO}_2(\text{g})$ نسبت به تعادل اولیه زیاد می شود و غلظت $\text{O}_2(\text{g})$ و $\text{SO}_3(\text{g})$ نیز نسبت به تعادل اولیه افزایش می یابد.



نکته ۱: مقدار افزوده شده در یک سامانه تعادلی به طور کامل مصرف نمی شود و مقداری از آن در تعادل باقی می ماند.

نکته ۲: با افزایش غلظت یکی از واکنشگرها، سرعت رفت و برگشت در تعادل جدید افزایش می یابد.

نکته ۳: هنگامی که بر یک تعادل تغییری وارد می شود، حتی پس از برقراری تعادل مقداری از آثار تغییر وارده باقی می ماند بجز در تعادل هایی

که مقدار K فقط تابع غلظت یک ماده است. مثل تعادل $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \Rightarrow K = [\text{CO}_2]$

آثار تغییرات غلظت به طور کامل از بین می رود.

نکته ۴: تغییر غلظت بر مقدار عددی K در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه تأثیری ندارد..

نکته ۵: تغییر مقدار ماده جامد یا مایع خالص تأثیری روی جابه جایی تعادل ندارد زیرا با تغییر مقدار ماده جامد یا مایع خالص، غلظت آنها


همچنان ثابت باقی می ماند و با ثابت ماندن غلظت نیز تغییری در تعادل ایجاد نمی شود.

اثر تغییر فشار

برای تغییر غلظت مواد شرکت کننده می توان از روش دیگری نیز بهره برد. روشی که در آن حجم سامانه در دمای ثابت تغییر می کند. برای

نمونه، با تغییر حجم یک سیلندر می توان فشار آن را تغییر داد. آشکار است که با کاهش حجم، فشار زیاد و با افزایش حجم، فشار کم می شود.

مطابق شکل زیر، در تعادل $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ بر اثر افزایش فشار، حجم سامانه کاهش یافته تا اینکه تعادل تازه ای برقرار شود.



با کاهش حجم سامانه محتوی مخلوط گازها، فشار افزایش می یابد. در نتیجه، تعادل برای جبران افزایش فشار به سمت تعداد مول گاز کمتر جابه جا می شود. به بیان دیگر، تعادل به سمت راست جابه جا می شود. زیرا هرچه شمار مول های گاز موجود در یک سامانه کمتر باشد، شمار برخورد مولکول ها به دیواره ها کمتر و در نتیجه فشار گاز کمتر خواهد شد.

نکته ۱: تغییر فشار بر سامانه ای مؤثر است که در آن مولکول های گازی وجود داشته باشد.

نکته ۲: تغییر فشار زمانی تعادل را جابه جا می کند که تعداد مول های گازی دو طرف تعادل متفاوت باشد.

نکته ۳: با افزایش فشار در تعادل هایی که مقدار K فقط تابع غلظت یک ماده است. مثل تعادل



آثار تغییرات فشار به طور کامل از بین می رود.

نکته ۴: تغییر فشار بر مقدار عددی K در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه تأثیری ندارد.

نکته ۵: تغییر فشار در یک سامانه گازی باعث تغییر غلظت کلیه گونه های شرکت کننده در سامانه می شود یعنی با افزایش فشار صرفه نظر از جهت جابه جای، غلظت تمام گونه ها افزایش می یابد. ولی مقدار مول گازها به جهت جابه جای بستگی دارد.

نکته ۶: با افزایش فشار سرعت واکنش تعادلی چه در جهت رفت و چه برگشت افزایش می یابد.

نکته ۷: با افزایش فشار سرعت واکنش در جهتی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد که تعداد مول گازی بیشتر است و جهت تعادل به سمت مول کمتر مشاهده می شود.

نکته ۸: اگر تعداد مول گازی دو طرف برابر باشد افزایش فشار سرعت دو طرف تعادل را افزایش می دهد ولی با یک نسبت و یک اندازه بنابراین تعادل جابه جا نمی شود.

قسمت چهارم

قسمت چهارم که از صفحه های ۱۰۵ تا ۱۱۱ کتاب درسی را شامل می شود، مطالب زیر را می خوانید:

• دما، عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

• ارزش فناوری‌های شیمیایی

جای خالی

۳۵۶. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد اضافی هستند).

فناوری - دما - نیست - افزایش دما - است - کاهش دما - ΔH - سرعت - مواد خام و اولیه - آمونیاک -
نیتروژن - بزرگتر - کوچکتر - اقتصاد - دانش شیمی - صنعت - فراوری شده

ن. عاملی که افزون بر جابه‌جایی تعادل توان تغییر ثابت تعادل را دارد است.

س. اثر تغییر دما بر تعادل‌های گوناگون، یکسان و به علامت آنها بستگی دارد.

ع. به کارگیری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره‌وری یک کشور می‌شود.

ف. با توجه به واکنش تعادلی گازی: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، می‌توان دریافت که این تعادل، بر اثر در جهت رفت، یا افزایش مقدار گاز در جهت برگشت و با انتقال به ظرف در دمای ثابت، در جهت رفت پیشرفت می‌کند.

ص. مواد شیمیایی جدید را با استفاده از مواد به‌دست می‌آورند.

درست یا نادرست

۳۵۷. جمله‌های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و شکل صحیح جمله‌های نادرست را بنویسید.

ا. جابه‌جایی در تعادل به هنگام تغییر دما همواره طوری است که تغییرات دمای سامانه کمترین مقدار ممکن شود.

ب. در واکنش‌های گرماده، افزایش دما باعث کاهش مقدار ثابت تعادل می‌شود.

ج. کاتالیزگر با تأثیر بر انرژی فعال‌سازی، می‌تواند سرعت رسیدن یک سامانه به تعادل را کاهش دهد. ولی بر جابه‌جایی تعادل تأثیری نداشته باشد.

د. در واکنش گرماده، افزایش دما باعث جابه‌جایی تعادل به سمت چپ می‌شود.

ه. برای توسعه اقتصاد یک کشور بهتر است منابع معدنی به صورت خام فروشی در اختیار سایر کشورها قرار گیرد.

انتخاب کنید

۳۵۸. هر یک از عبارتهای زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

ا. فرایند هابر، گرما $\frac{\text{ده}}{\text{گیر}}$ است و کاهش دما، سبب می‌شود که واکنش در جهت تولید آمونیاک $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ جابه‌جا شود، اما سبب $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ سرعت

واکنش‌های رفت و برگشت می‌شود. به همین دلیل، این واکنش را در دماهای $\frac{\text{بالا}}{\text{پایین}}$ انجام می‌دهند.

ب. در واکنش‌های تعادلی گرما $\frac{\text{ده}}{\text{گیر}}$ با افزایش گرما تعادل در جهت $\frac{\text{رفت}}{\text{برگشت}}$ جابه‌جا می‌شود، پس نسبت $\frac{\text{فراورده}}{\text{واکنش دهنده}}$ به $\frac{\text{فراورده}}{\text{واکنش دهنده}}$ افزایش می‌یابد،

بنابراین ثابت تعادل $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می‌یابد.

مهارتی

۳۵۹. عوامل مؤثر بر تعادل را نام ببرید.


۳۶۰. درباره‌ی فرایند هابر در تولید آمونیاک به سؤالات زیر پاسخ دهید:

(آ) چرا در این فرایند فشار سامانه‌ی تعادلی را تا حد امکان افزایش می‌دهند؟

(ب) با وجود اینکه تعادل فوق در جهت رفت گرماده است، چرا آن را در دماهای بالا انجام می‌دهند؟


(پ) برای جداسازی آمونیاک از مخلوط گازی چه روشی به کار می‌رود.

۳۶۱. در واکنش زیر با اعمال هر یک از تغییرات زیر تعادل در چه سمتی جابه جا می شود؟



(آ) افزایش دما (ب) کاهش فشار (پ) افزایش کاتالیزگر (ت) خارج کردن HCl

۳۶۲. در واکنش زیر با اعمال هر یک از تغییرات زیر تعادل در چه سمتی جابه جا می شود؟



(آ) کاهش دما (ب) کاهش فشار (پ) افزودن پودر فلز نیکل (ت) خارج کردن گاز کربن دی اکسید

۳۶۳. در تعادل گازی $4HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$ $\Delta H < 0$ کدام یک از موارد زیر می تواند چنین تغییری

را در سرعت واکنش تعادلی اولیه ایجاد کند؟

(۱) افزایش گاز اکسیژن




(۲) کاهش دما

(۳) کاهش حجم

(۴) افزایش دما

۳۶۴. واکنش زیر را در در نظر بگیرید:



صورتی رنگ

آبی رنگ

اگر سیستم تعادلی را سرد کنیم:

الف - تعادل در چه جهتی جابه جا می شود؟


ب- خواص ماکروسکوپی سیستم چه تغییری می کند؟

پ- آیا افزایش فشار می تواند بر جابه جایی تعادل تأثیر داشته باشد.

ثابت تعادل	دما (°C)
۰/۶۰۲	۱۰۰۰
۰/۷۷۵	۹۰۰
۱/۰۷۵	۸۰۰
۱/۵۸۷	۷۰۰

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

۳۶۵. با توجه به جدول روبرو این واکنش گرماگیر است یا گرماده؟
در باره ی پاسخ خود توضیح دهید.



۳۶۶. با توجه به تصویر سامانه در حال تعادل $2\text{NO}_2(g) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(g)$ است، نماد گرما در کدام طرف واکنش نوشته شود؟ چرا؟

۳۶۷. با توجه به داده های جدول روبرو، که به واکنش تعادل گازی: $2A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$ ، در سه دمای مختلف مربوط است، کدام مطلب درست است؟

دما (°C)	K
۲۵	4×10^{24}
۲۲۷	$3/5 \times 10^{10}$
۴۲۷	3×10^4

(۱) با کاهش دما، واکنش در جهت برگشت جابه جا می شود.

(۲) واکنش گرماگیر و با افزایش دما ثابت تعادل کوچکتر می شود.

(۳) مقدار $[C]^2$ از مقدار $[A]^2[B]$ در این واکنش، بسیار بیش تر است.

(۴) مجموع ΔH های پیوند واکنش دهنده ها در آن، نسبت به فرآورده ها بزرگ تر است.

مربوط است، کدام مطلب درست است؟

درصد مولی NH_3 در مخلوط تعادلی			$K(\text{mol}^{-2} \cdot \text{L}^2)$	دما (°C)
۱۰۰۰atm	۱۰۰atm	۱۰atm		
۹۸	۸	۵۱	۶۵۰	۲۰۹
۸۰	۲۵	۴	۰/۵	۴۶۷
۱۳	۵	۰/۵	۰/۰۱۴	۷۵۷

۳۶۸. با توجه به داده های جدول زیر که به تعادل گازی:

(۱) مجموع انرژی پیوند فرآورده ها از مجموع انرژی پیوند واکنش دهنده ها بیش تر است.

(۲) سطح سد انرژی به سطح انرژی فراورده نزدیک تر و ΔH واکنش مثبت است.

(۳) در دمای ثابت، با افزایش فشار، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک افزایش می یابد.


(۴) در فشار ثابت، با افزایش دما، ثابت تعادل و درصد مولی آمونیاک به یک

نسبت کاهش می یابد.

۳۶۹. با توجه به شکل زیر که شمایی از فناوری تولید آمونیاک به

روش هابر را نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.

گازهای هیدروژن و نیتروژن واکنش نداده



ا. X, Y و Z را مشخص کنید.

ب. مطابق واکنش

تعادل را در کدام جهت جابه جا می کند؟

ج. یکی از روش های کامل کردن واکنش های تعادلی، خارج کردن فراورده (ها) از سامانه است کدام دما را برای دستیابی به این هدف مناسب می دانید؟ (۴۰ - یا ۲۰۰ -)؟ توضیح دهید.

(اگر نقطه جوش آمونیاک، نیتروژن و هیدروژن به ترتیب ۳۳-، ۱۹۶- و ۲۵۳- درجه باشد.)

۳۷۰. به پرسش های زیر پاسخ دهید:

ا. چند مورد از فناوری هایی که بشر امروزی برای حل مسائل خود استفاده می کند، نام ببرید.

ب. برای توسعه اقتصاد یک کشور بهتر حالت صادر کردن منابع معدنی چیست؟ چرا؟

ج. درصد خلوص مواد شیمیایی با قیمت آن چه ارتباطی دارد؟

د. آیا یک کشور می تواند بدون مبادله مواد با دیگر کشورها زمینه آسایش، رشد و توسعه مردم را فراهم کند؟

بررسی نکات مهم درس:


دما، عاملی برای جابه جایی تعادل

اثر تغییر دما بر تعادل های گوناگون، یکسان نیست و به گرماده یا گرماگیر بودن آنها بستگی دارد.

واکنش های گرماگیر

با افزایش دما تعادل مطابق اصل لوشاتلیه برای جبران در جهت مصرف گرما پیش می رود $A(g) + q \rightleftharpoons B(g)$ یعنی در جهت رفت جابه جا و گرمای اضافی را مصرف می کند


مطابق نمودار تأثیر افزایش دما بر سرعت در جهتی بیشتر است که گرماگیرتر است پس اثر افزایش دما در جهت رفت بیشتر است. و واکنش در جهت رفت با سرعت بیشتری انجام می شود و در کل جهت تعادل به سمت راست مشاهده می شود تا سامانه در تعادل جدید قرار گیرد.



واکنش های گرماده

با افزایش دما تعادل مطابق اصل لوشاتلیه برای جبران در جهت مصرف گرما پیش می رود $A(g) + C(g) \rightleftharpoons B(g) + q$ یعنی در جهت برگشت جابه جا و گرمای اضافی را مصرف می کند.

مطابق نمودار تأثیر افزایش دما بر سرعت در جهتی بیشتر است که گرماگیرتر است پس اثر افزایش دما در جهت برگشت بیشتر است. و واکنش در جهت برگشت با سرعت بیشتری انجام می شود و در کل جهت تعادل به سمت رفت مشاهده می شود تا سامانه در تعادل جدید قرار گیرد.



اثر تغییر دما بر ثابت تعادل


تنها عاملی که می تواند، بر روی تغییر ثابت تعادل تأثیر داشته باشد، دما است.

در واکنش های گرماگیر با افزایش دما جابه جایی در جهت رفت و نسبت غلظت فراورده به واکنش دهنده ها افزایش می یابد و ثابت تعادل بزرگتر می

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

شود. و در واکنش های گرماده بلعکس است.

تنها و تنها عامل مؤثر بر K (ثابت تعادل)، دما (T) می باشد؛ به طوری که:





اثر کاتالیزگر بر تعادل

کاتالیزگر با کاهش انرژی فعال سازی به اندازه یکسان هم در جهت رفت و هم برگشت، سرعت واکنش را در دو طرف به یک اندازه و یک نسبت افزایش می یابد. بنابراین با به کار بردن کاتالیزگر سرعت رسیدن به تعادل افزایش می یابد ولی در جابه جایی تعادل نقشی ندارد.

بررسی عوامل مؤثر در تعادل به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه شده است:

عامل تغییر	تغییر وارده بر تعادل	تعدیل انجام شده توسط تعادل
غلظت	افزایش غلظت	جابه جایی تعادل در جهت مصرف و کاهش آن
	کاهش غلظت	جابه جایی تعادل در جهت تولید و جبران آن ماده
فشار	افزایش فشار (کاهش حجم) سامانه	جابه جایی تعادل در جهت تولید تعداد مول کمتر گازی
	کاهش فشار (افزایش حجم) سامانه	جابه جایی تعادل در جهت تولید تعداد مول بیشتر گازی
دما	افزایش دمای سامانه	جابه جایی تعادل در جهت مصرف گرمای اضافی
	کاهش دمای سامانه	جابه جایی تعادل در جهت تولید گرمای کاهش یافته



فرایند هابر در تولید آمونیاک

فریتس هابر انتظار داشت که با تغییر عوامل مؤثر بر تعادل بتواند مقدار آمونیاک را در مخلوط تعادلی افزایش دهد.

دما

با افزایش دما و تأمین انرژی فعال سازی، سرعت واکنش افزایش خواهد یافت. از این رو واکنش را در دماهای بالاتر بررسی کرد. دماهایی که در آنها واکنش با سرعت چشمگیری انجام می شد، اما با پیشرفت کمی به تعادل می رسید به طوری که سامانه محتوی مخلوطی از هر سه گاز بود. جالب اینکه او هر چه دما را بالاتر می برد درصد مولی آمونیاک در مخلوط کاهش می یافت. زیرا تولید آمونیاک یک فرایند گرماده است.

پس قاعدتاً با کاهش دما طبق اصل لوشاتلیه می توان تعادل را به سمت تولید آمونیاک بیشتر جابه جا کرد. اما این روش از دیدگاه صنعتی و اقتصادی به ضرر تولید آمونیاک است زیرا کاهش دما، سرعت واکنش های رفت و برگشت را نیز کاهش داده و سرعت برقراری تعادل بسیار پایین می آید. در صنعت هدف این است که در مدت زمان کمتری آمونیاک مورد نظر به دست بیاید. بنابراین روش هابر در مقیاس صنعتی در دماهای بالا حدود 450°C انجام می شود. و برای جبران تأثیر افزایش نسبی دما، از کاتالیزگر و فشار بالا استفاده می کنند.


کاتالیزگر:

در صنعت برای اینکه سرعت برقراری تعادل و در نتیجه سرعت تولید آمونیاک را باز هم بیشتر کنند واکنش مورد نظر را در مجاورت کاتالیزگر آهن (Fe) انجام می دهند. در واقع کاتالیزگر کمک می کند تا در دماهای به نسبت پایین تر، آمونیاک سریع تر تشکیل شود و در نتیجه $\text{NH}_3(\text{g})$ به مقدار بیشتر و ارزان تر تولید شود.

اگر از کاتالیزگر استفاده نکنیم مجبوریم دما را تا حدود 1000°C افزایش دهیم، دمای بالا باعث جابه جایی تعادل در مسیر برگشت و تجزیه مقداری از NH_3 تولید شده می شود، هم چنین دمای بالا استهلاک دستگاه ها را زیاد کرده و عمر مفید آنها را کاهش می دهد. اما با استفاده از کاتالیزگر می توانیم در دمای پایین تر حدود 450°C به سرعت مطلوب برسیم

فشار:

اگر واکنش تعادلی تولید آمونیاک را در نظر داشته باشید متوجه خواهید شد برای افزایش تولید آمونیاک می توان فشار را زیاد کرد. زیرا با افزایش فشار، تعادل به سمتی جابه جا می شود که مجموع ضرایب استوکیومتری مواد گازی آن کمتر است. بنابراین در فشارهای بالا واکنش در جهت




تولید $\text{NH}_3(\text{g})$ پیش می رود. به همین دلیل تا آنجا که ممکن باشد فرایند هابر در فشارهای بالا انجام می شود. در صنعت روش هابر را در فشاری بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ اتمسفر انجام می دهند. به این ترتیب هابر توانست شرایط بهینه برای تولید آمونیاک را بیابد. شرایطی که در آن، تنها ۸۲ درصد مولی مخلوط را آمونیاک تشکیل می دهد

جداسازی آمونیاک:

یکی از جنبه های اصلی فرایند هابر، خارج کردن $\text{NH}_3(\text{g})$ از محیط واکنش از طریق مایع کردن گاز آمونیاک است. با این کار تعادل به سمت کامل شدن پیش می رود. در ضمن $\text{N}_2(\text{g})$ و $\text{H}_2(\text{g})$ واکنش نکرده، بازگردانی می شوند.

نقطه جوش آمونیاک، نیتروژن و هیدروژن به ترتیب 33°C ، -196°C و -253°C است. پس مخلوط را تا دمای نزدیک به 40°C - سرد می کنند. تا آمونیاک به شکل مایع از سامانه تعادلی خارج گردد.



فرایند هابر نمونه تاریخی جالبی از تأثیر پیچیده شیمی بر زندگی ماست. هرچند تولید آمونیاک باعث طولانی تر شدن جنگ جهانی اول گردید؛ اما به دنبال آن شرایط تولید کودهای شیمیایی و افزایش بازدهی فراورده های کشاورزی فراهم شد.

ارزش فناوری های شیمیایی

- نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و معادن مس، آهن، طلا، مرمر و فیروزه از جمله منابع شیمیایی ارزشمندی هستند که به طور یکسان در جهان توزیع نشده اند. به همین دلیل برخی کشورها صادر کننده این منابع و برخی دیگر وارد کننده آنها هستند.
- برخی کشورهای دنیا با کسب درآمد از فروش منابع خود زمینه آسایش، رشد و توسعه را فراهم می کنند.
- بسیاری از کشورها منابع طبیعی خود را کم و بیش بدون فراوری و به همان صورتی که از طبیعت به دست می آید، به فروش می رسانند. فرایندی که به خام فروشی منابع معروف است.

- روش دیگر این است که به کمک فناوری های شیمیایی مواد خام و اولیه را به فراورده های دیگر تبدیل کرد تا بتوان به قیمت بالاتری به فروش رساند.
- خام فروشی برای منابع معدنی مانند نفت، سنگ معدن آهن، مس، روی و حتی منابع کشاورزی مانند پنبه است.
- هر چه درصد خلوص ماده شیمیایی بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.
- فناوری های جداسازی و خالص سازی مواد یکی از فناوری های پیشرفته، گران، پرکاربرد و در عین حال کارآفرین و درآمدزا به شمار می رود.
- به کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده، سبب رشد و بهره وری اقتصاد یک کشور می شود.
- فناوری ارتباطات، کشاورزی، غذایی، نظامی، دارویی، الکترونیکی و آموزشی از جمله فناوری هایی هستند که بشر امروزی از آنها برای حل مسائل خود بهره می برد.

قسمت پنجم

قسمت پنجم که از صفحه های ۱۱۳ تا ۱۱۹ کتاب درسی را شامل می شود، مطالب زیر را می خوانید:

- گروه عاملی، کلید سنتز مولکول های آلی

- فرایند سنتز PET

- بازیافت PET

جای خالی

۳۷۱. هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید (برخی از موارد اضافی هستند).

تولید مواد - اکتشاف - سنتز - ترفتالیک اسید - الکل - اتر - آب - عاملی - اتن - اتیلن گلیکول

- ا. کانون بسیاری از پژوهش های شیمیایی است و منجر به طراحی جدید می شود.
- ب. گروه های که به ترکیب خواص ویژه ای می بخشند و رفتار مواد آلی را تعیین می کنند.
- ج. برای سنتز یک استر از واکنش یک اسید آلی با یک در شرایط مناسب استفاده می شود.
- د. برای تولید یک ضد عفونی کننده می توان از واکنش اتیلن با بهره برد.
- ه. گاز از مهم ترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است
- و. ماده ای اولیه تولید PET که به طور مستقیم نمی توان آنها را از نفت خام به دست آورد، و است.

درست یا نادرست

۳۷۲. جمله های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و شکل صحیح جمله های نادرست را بنویسید.

- ا. عدد اکسایش کربن در تبدیل پارازیلین به ترفتالیک اسید افزایش می یابد.
- ب. گاز اتن در اثر واکنش با محلول غلیظ پتاسیم پرمنگنات در شرایط مناسب به اتیلن گلیکول تبدیل می شود.
- ج. ماده ای اولیه تولید PET را به طور مستقیم می توان از نفت خام به دست آورد.
- د. یک واکنش شیمیایی هنگامی از دیدگاه اتمی به صرفه تر است که بازده بیشتری داشته باشد.
- ه. پلاستیک ها به دلیل چگالی کم، نفوذپذیری نسبت به هوا و آب، و مقاومت در برابر خوردگی کاربردهای وسیعی در زندگی دارند.

و. هر واکنشی که در آن ترکیب آلی اکسیژن دار از یک هیدروکربن تولید می شود، واکنش اکسایش — کاهش است.

برقراری ارتباط

۳۷۳. هر یک از عبارتهای ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است،

این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید (برخی از موارد ستون B اضافی هستند.)

ستون A	ستون B
أ. نام دیگر اتانویک اسید	(a) پتاسیم پر منگنات
ب. افشانه بی حس کننده	(b) پارازایلن
ج. حلال چسب	(c) متانول
د. ماده‌ی تولید شده از اتن که به عنوان سوخت به کار می‌رود.	(d) اتیل استات
ه. پلیمر سازنده بطری آب	(e) پلی اتیلن ترفتالات
و. الکل دو عاملی	(f) ترفتالیک اسید
ز. ماده به دست آمده از نفت و ماده اولیه تولید PET	(g) پلاستیک مذاب
ح. اکسنده‌ای قوی برای بالا بردن عدد اکسایش کربن	(h) اتیلن گلیکول
ط. تهیه شده از چوب و تبدیل کننده زباله‌های PET به پلیمرهای مفید	(i) سرکه
ی. نام خرده‌های پلاستیک جهت بازیافت	(j) کلرواتان
	(k) پرک
	(l) اتان

مهارتی

۳۷۴. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید

أ. شیمی‌دان‌ها چگونه می‌توانند ماده‌ای نو برای کاربردی معین سنتز کنند؟

ب. نام گروه‌هایی که به ترکیب خواص ویژه‌ای می‌بخشند، چیست؟

ج. در چه صورتی ساخت یک ماده به دانش پیشرفته تر و فناوری کارآمدتری نیاز دارد؟

۳۷۵. ساختار اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید را در نظر گرفته و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

ا. آیا می توان این دو ترکیب را به طور مستقیم از نفت خام تهیه کرد؟


ب. آیا این دو ترکیب می توانند تحت شرایط معین ترکیب شوند؟

ج. پلیمر حاصل از مونومرهای آن جزء کدام دسته از پلیمرهاست؟ چرا؟


د. نام پلیمر به وجود آمده چیست؟

ه. ساختاری پلیمری آن را نشان دهید.

و. پلیمر به دست آمده چه کاربردی دارد؟



۳۷۶. مجموع تغییرات عدد اکسایش تبدیل پارازایلن را به ترفتالیک اسید به دست آورید.




۳۷۷. واکنش زیر را در نظر گرفته به پرسش ها پاسخ دهید:

ا. گونه کاهنده و اکسنده را مشخص کنید


ب. موازنه نمایید.



۳۷۸. نمودار داده شده فرایند تشکیل ماده ی سازنده بطری آب را نشان می دهد جاهای خالی را کامل کنید:



۳۷۹. در نمودار زیر جاهای خالی را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی و یا کاربرد آنها پر کنید.



۳۸۰. در یک بطری آب به جرم ۳۸/۴ گرم چند مول مونومر سازنده اتیلن ترفتالات وجود دارد؟ ($O = 16, H = 1, C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$)



۳۸۱. حداقل چند گرم ترفتالیک اسید برای واکنش با ۳۱۰ گرم اتیلن گلیکول با خلوص ۸۰٪ لازم است؟


۳۸۲. چگونه می توان پلاستیک های مصرف شده پلی اتیلن ترفتالات را بازیافت کرد؟

۳۸۳. فرایند تهیه متانول صنعتی را بنویسید.

۳۸۴. با توجه به واکنش های زیر، برای تولید هر کیلوگرم فراورده واکنش گاز متان با بخار آب ($CO + 3H_2$) چند کیلوژول انرژی باید صرف شود؟

$$O = 16, C = 12, H = 1. \text{g.mol}^{-1}$$






۳۸۵. با توجه به کادر زیر که مربوط به روش های تولید متانول است،


ا. به جای حروف A و B عبارت مناسب را جایگزین کنید.

ب. تولید مستقیم متانول از متان چه مزیتی دارد؟




۳۸۶. روند تولید پلاستیک با کدام نمودار زیر بر حسب گذر زمان صحیح است؟ چرا؟

مقدار پلاستیک (تن)



ب

مقدار پلاستیک (تن)





الف

بررسی نکات مهم درس:

- اغلب مواد آلی شامل گروه های عاملی گوناگون هستند.
 - گروه های عاملی رفتار مواد آلی را تعیین می کنند.
 - تولید یک ماده آلی جدید می تواند با تغییر ساختار یا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه باشد.
 - شیمی دان ها به کمک اطلاعات زیر ماده ای نو برای کاربردی معین سنتز می کنند:
- (۱) دانش مربوط به ساختار و رفتار گروه های عاملی
 - (۲) دانستن شرایط و عوامل مؤثر بر انجام واکنش های شیمیایی از مواد خام یا اولیه در دسترس
 - (۳) تغییر گروه های عاملی موجود در یک ماده آلی

یادآوری

- در جدول زیر خلاصه گروه‌های عاملی آورده شده است:

نام خانواده دارای گروه عاملی	فرمول گروه عاملی	نام گروه عاملی	فرمول مولکولی داری بخش هیدروکربنی سیر شده
هالوآلکانی	X- (F, Cl, Br, I)	هالید	$C_nH_{2n+1}X$
آلکنی	$-C \equiv C-$	ان	C_nH_{2n}
آلکینی	$-C \equiv C-$	این	C_nH_{2n-2}
آروماتیک		بنزنی	C_6H_6
فنولی		فنول	C_6H_6O
الکل	-OH	هیدروکسیل	$C_nH_{2n+1}OH$
اتر	-O-	اتری	$C_nH_{2n+2}O$
آلدهید	$-CHO$ یا $\begin{smallmatrix} O \\ \\ -C-H \end{smallmatrix}$	آلدهیدی	$C_nH_{2n}O$
کتون	$-CO-$ یا $\begin{smallmatrix} O \\ \\ -C- \end{smallmatrix}$	کتونی	$C_nH_{2n}O$
اسید (کربوکسیلیک اسید)	$-COOH$ یا $\begin{smallmatrix} O \\ \\ -C-OH \end{smallmatrix}$	کربوکسیل	$C_nH_{2n}O_2$
استر	$-COO-$ یا $\begin{smallmatrix} O \\ \\ -C-O- \end{smallmatrix}$	کربوکسیلات	$C_nH_{2n}O_2$
آمین	-NH-	آمینی	$C_nH_{2n+3}N$
آمید	$\begin{smallmatrix} O \\ \\ -C-NH_2 \end{smallmatrix}$	آمیدی	$C_nH_{2n+1}N$

- اولین عامل‌های شناخته شده در کتاب شیمی ۲ پیوند دوگانه با نام عامل آلکنی و پیوند سه گانه با نام عامل آلکینی و ترکیبات آروماتیک با نام عامل بنزنی شناخته شد. قرار گرفتن اتم‌های هالوژن به جای هیدروژن آلکان‌ها نیز به آن خواص و رفتار ویژه‌ای می‌بخشد.
- شیمی دان‌ها به موادی که فرمول مولکولی یکسان اما ساختار (فرمول ساختاری) متفاوتی دارند، ایزومر (همپار) می‌گویند.
- ترکیباتی که در یک خانواده قرار دارند هومولوگ (هم رده) می‌گویند.
- با توجه به جدول مشخص است که الکل‌ها با اترها، آلدهیدها با کتون‌ها و اسیدها با استرها ایزومرنند.
- به گروه $\begin{pmatrix} O \\ || \\ -C- \end{pmatrix}$ کربونیل گفته می‌شود. مهم‌ترین تفاوت گروه عاملی آلدهیدی و کتونی، اتم هیدروژن متصل به گروه کربونیل در گروه عاملی آلدهیدی است.


- ساده‌ترین آلدهید یک کربن (فرمالدهید $H-C(=O)-H$) و ساده‌ترین کتون سه کربن (استون $CH_3-C(=O)-CH_3$) دارد.

- استون یک ترکیب آلی اکسیژن دار است که به عنوان حلال در صنعت و آزمایشگاه به کار می‌رود. (نام دیگر استون، پروپانون می‌باشد).

- الکل ها به دلیل برقراری پیوند هیدروژنی نسبت به اترهای هم کربن نقطه جوش بالاتری دارند.
- آلکن های کوچک تحت شرایطی می توانند پلیمر شوند و انواع پلاستیک ها را تولید کنند. به طوری که اتن یکی از مهم ترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است.
- از ترکیب الکل با اسید در حضور کاتالیزگر اسیدی طی یک واکنش برگشت پذیر، استر تولید می شود (برگشت این واکنش آبکافت استر نام دارد).
- آبکافت استر در محیط بازی برگشت ناپذیر است و الکل با نمک آلکانوات تشکیل می شود.
- از اسید و الکل های دو عاملی پلی استر حاصل می گردد.
- از واکنش آمین با یک اسید، آمید و اگر دو عاملی باشند پلی آمید تولید می گردد.

فرمول مولکولی و تعداد پیوند کووالانسی

- برای به دست آوردن فرمول مولکولی و تعداد پیوند کووالانسی به روش زیر عمل می کنیم:
۱. تعداد کربن ها شمارش می شود.
 ۲. با توجه به فرمول عمومی آلکان ها که به ازای n تا کربن $2n+2$ هیدروژن وجود دارد، تعداد هیدروژن را از روی فرمول می نویسیم.
 ۳. به ازای وجود هر حلقه یا پیوند پای دو تا هیدروژن کسر می شود.
- مثال: برای نوشتن فرمول مولکولی ترکیب زیر، نقاط شمارش می شود C_{10} پس مطابق فرمول $C_8H_{2 \times 8 + 2}$ یعنی C_8H_{18} خواهد شد. حال به تعداد پیوند پای که برابر دو تا و یک حلقه ۶ تا هیدروژن کسر می شود $C_8H_{18-6} = C_8H_{12}$.
- تذکره:** حضور اکسیژن در ترکیب در تعداد هیدروژن تأثیری ندارد ولی اگر نیتروژن داشته باشیم به ازای هر اتم نیتروژن یک هیدروژن افزوده می شود.
- تذکره ۲:** به ازای وجود هر حلقه بنزن در ساختار، ۸ اتم هیدروژن از فرمول اصلی کسر می شود.




$$\text{تعداد پیوند کووالانسی} = \frac{1}{2} \{ (2 \times \text{تعداد اکسیژن}) + \text{تعداد هیدروژن} + (4 \times \text{تعداد کربن}) \}$$

$$\text{تعداد اکسیژن} \times 2 = \text{تعداد جفت الکترون غیر پیوندی در یک ترکیب آلی}$$

سنتز چیست؟

سنتز یک فرایند شیمیایی هدفمند است که در آن با استفاده از مواد ساده تر، مواد شیمیایی دیگر را تولید می کنند. می توان از گاز اتن مواد آلی گوناگون پر مصرف و ارزشمند تهیه کرد. این گاز یکی از مهم ترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است. به همین ترتیب با استفاده از مواد مناسب و واکنش های شیمیایی می توان مواد آلی گوناگون را به یکدیگر تبدیل کرد.


تبدیل اتن به مولکول های دیگر



کاربرد مواد حاصل از اتن

کاربرد	ماده
سوخت	اتان
افشانه بی حس کننده موضعی	کلرواتان
سازنده اصلی برخی پلاستیک ها	پلی اتن
ضد عفونی کننده	اتانول
با اتانوائیک اسید، تولید اتیل استات به عنوان حلال چسب	

تبدیل عامل ها به یکدیگر



- بدیهی است هر چه نوع و تعداد گروه های عاملی در مولکول هدف بیشتر باشد ساخت آن دشوارتر بوده و به دانش پیشرفته تر و فناوری کارآمدتری نیاز دارد.

- بازده واکنش، هزینه مواد و انرژی مصرف شده برای تولید ماده هدف به نوع واکنش و فناوری به کاررفته بستگی دارد.

اهداف شیمی دان ها

گام اول

۱. تهیه مواد مناسب
۲. ارزان بودن مواد و روش تهیه آنها

بخش چهارم : شیمی راهی به سوی آینده روشن تر




۳. دوستدار محیط زیست
۴. واکنش های شیمیایی آسان
۵. فراورده واکنش پربازده
۶. کاهش هزینه تمام شده برای تولید یا سنتز

گام دوم


۱. طراحی فناوری
۲. اجرا
۳. تولید در مقیاس صنعتی

ساخت PET


- پلاستیک ها را می توان یکی از نتایج خلاقیت و نوآوری بشر دانست. این مواد به دلیل ویژگی هایی زیر کاربردهای وسیعی دارند:
 ۱. چگالی کم
 ۲. نفوذناپذیری نسبت به هوا و آب
 ۳. ارزان بودن
 ۴. مقاومت در برابر خوردگی
- برای ساخت بطری پلاستیک یا **PET** نیاز به تهیه مواد اولیه اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید است.
- اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید در نفت خام وجود ندارند.
- مطابق با طراحی زیر، مواد اولیه ساخت PET فراهم می شود.



- در این واکنش‌ها پارازایلن و اتن نقش کاهنده و پتاسیم پرمنگنات نقش اکسنده دارند.



پس در مجموع به ازای هر مولکول پارازایلن ۱۲ درجه عدد اکسایش افزایش می‌یابد.




در این واکنش به ازای هر مول اتن ۲ درجه عدد اکسایش، بیشتر می‌شود.


واکنش پارازایلن با پتاسیم پرمنگنات در دمای بالا به این صورت است:



- روش دیگری که می‌تواند پارازایلن را به ترفتالیک اسید تبدیل کند واکنش آن با اکسیژن هوا و کاتالیزگر مناسب است.

اکنون می‌توان با انجام واکنش اتیلن گلیکول با ترفتالیک اسید (مونومرهای سازنده پلیمر) پلی اتیلن ترفتالات را سنتز کرد:






- این پلیمر همانند پلیمرهای سنتزی ماندگاری زیادی دارد و در طبیعت به کندی تجزیه می‌شود. به همین دلیل پسماند آنها تهدیدی جدی برای زندگی روی کره زمین به شمار می‌آید.

بازیافت PET

- پلاستیک‌ها را می‌توان یکی از نتایج خلاقیت و نوآوری بشر دانست که امروزه سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن از این مواد در جهان تولید می‌شود و این روند رو به افزایش است:



- استفاده بی‌رویه و بیش از حد این مواد در صنایع گوناگون به همراه زیست تخریب ناپذیری آنها سبب شده که در جای جای کره زمین یافت شوند. از این رو بازیافت آنها اجتناب ناپذیر، بسیار ضروری و ارزشمند است.
- یکی از مواد پلاستیکی قابل بازیافت، پلی اتیلن ترفتالت است. برای این منظور، باید آنها را جداگانه جمع‌آوری و سپس با انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به مواد قابل استفاده تبدیل کرد.

راه‌های بازیافت

(۱) پس از شست و شوی مواد پلاستیکی می‌توان آنها را خرد کرده و به تکه‌های کوچک به نام پرک تبدیل و یا ذوب کرده و دوباره از آنها برای تولید وسایل و ابزار دیگر استفاده می‌کنند.

(۲) پسماندها را به مونومرهای سازنده یا مواد اولیه مفید و ارزشمند تبدیل می‌کنند.


- عامل تعبیه کننده روش بازیافت، سطح فناوری هر کشور یا گروه صنعتی است.
- شیمی‌دان‌ها با بررسی‌های فراوان پی بردند که PET در شرایط مناسب با متانول واکنش می‌دهد و به مواد مفیدی تبدیل می‌شود.

متانول (CH₃OH)


- متانول مایعی بی‌رنگ و بسیار سمی است.
- ساده‌ترین عضو خانواده الکل‌ها است.
- متانول را از چوب تهیه می‌کنند.

روش‌های تولید متانول

۱. در صنعت گاز کربن مونوکسید را با گاز هیدروژن در شرایط مناسب و در حضور کاتالیزگر واکنش می‌دهند:




برای تهیه گاز هیدروژن و کربن مونواکسید، گاز متان را با بخار آب در حضور کاتالیزگر واکنش می‌دهند:



گاز متان به عنوان زیست گاز و سازنده اصلی گاز طبیعی است که در میدان‌های نفتی به فراوانی با قیمت ارزان یافت می‌شود.

۲. گاز متان را در حضور کاتالیزگر با اکسیژن واکنش می‌دهند.



- تولید مستقیم متانول از متان در حضور گاز اکسیژن و کاتالیزگر کمک می‌کند تا در فشار کم، دماهای به نسبت پایین تر و در مدت زمان کمتری به فراورده مورد نیاز دست یافت، هم چنین دمای بالا استهلاک دستگاه‌ها را زیاد کرده و عمر مفید آنها را کاهش می‌دهد.

پایان



نوبت امتحانی: دیماه ۹۷
پایه: دوازدهم رشته: ریاضی/تجربی
تاریخ امتحان:
شروع امتحان: ۸ صبح
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز
دبیرستان غیر دولتی امام رضا(ع) - دوره دوم

شماره دانش آموزی:
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
نام درس: شیمی
شعبه:

نام و نام خانوادگی دبیر: آقای همایونی	نمره به عدد:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نمره به عدد:
تاریخ و امضاء:	نمره به حروف:	تاریخ و امضاء:	نمره به حروف:

ردیف	شرح سوالات	نمره
۱	با توجه به کادر زیر ، عبارت های داده شده را کامل کنید. (برخی از کلمات کادر اضافی هستند) درجه یونش - سلول گالوانی - خورنده - صابون - نیم واکنش - کلویید - اسیدهای چرب - الکتروشیمی جرم مولی زیاد - ثابت یونش - واکنش اکسایش و کاهش - سوسپانسیون - سلول الکترولیتی آ- چربی ها مخلوطی از و استرهای بلند زنجیر با هستند. ب- مخلوطی که همگن نبوده و حاوی توده های مولکولی با اندازه های متفاوت است را نامند. پ- پاک کننده های افزون بر، برهم کنش میان ذره ها ، با آلاینده ها واکنش میدهند. ت- شیمی دان ها برای بیان میزان یونش اسیدها ، از کمیتی به نام استفاده می کنند. ج- شاخه ای از دانش شیمی که در بهبود خواص مواد و تأمین انرژی نقش بسزایی دارد را گویند. چ- شیمی دان ها هریک از فرآیندهای گرفتن و از دست دادن الکترون را با یک نمایش می دهند. ح- دستگاهی که می تواند بر اساس قدرت کاهندگی فلزها انرژی الکتریکی تولید کند را می گویند.	۲
۲	علت را در موارد زیر بیان کنید. ۱- خاصیت آب خالص همواره خنثی است. ۲- در محلول ۰/۰۱ مولار از فورمیک اسید $[H^+] > [HCOOH]$ است. ۳- فلز پلاتین را می توان در بخش های مختلف بدن برخلاف فلز روی هنگام جراحی به کار برد. ۴- عدد اکسایش کربن هنگام سوختن کامل متان ۸ درجه افزایش می یابد. ۵- از لیتیم به طور چشمگیری در ساخت باتری ها با ویژگی های گوناگون استفاده شده است.	۲/۵
۳	عبارت درست را با علامت $\checkmark$ و عبارت نادرست را با علامت $\times$ مشخص کنید. آ) صابون در آب سخت بدلیل تشکیل رسوب با یون های کلسیم و منیزیم خوب کف نمی کند. ☐ ب) $RC_6H_4SO_3^-Na^+$ همانند $RCOONa$ یک پاک کننده است که از سود و چربی های حیوانی در صنعت تولید می ☐. پ) اغلب میوه ها دارای اسیدند و PH آن ها کمتر از ۷ است. ☐	۱/۵

ردیف	شرح سوالات	نمره																																				
۳	ت) در واکنش روی با اکسیژن ، یون روی کاهنده است. ☐ ج) اگر تیغه مسی ، در محلول سبز رنگ آهن (II) سولفات قرار دهیم ، پس از مدتی محلول آبی رنگ می شود. ☐ چ) SHE در مقابل نیم سلول روی و نیم سلول مس به ترتیب به عنوان آند و کاتدعمل کرده و شیمیدانان را قادر به تعیین پتانسیل استاندارد این دو نیم سلول کرد. ☐ ح) در برق کافت آب PH در اطراف کاتد برخلاف PH در اطراف آند با گذشت زمان کاهش می یابد. ☐																																					
۴	در جداول زیر جای نقطه چین عبارت ، کلمه ، فرمول یا عدد مناسب بنویسید. <table><tr><td>خاصیت محلول</td><td>PH</td><td>$[H^+]$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>$1/8 \times 10^{-2}$</td></tr><tr><td></td><td>۱۱/۴</td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">نام ترکیب شیمیایی</th><th rowspan="2">فرمول شیمیایی</th><th colspan="2">نوع اکسید</th><th rowspan="2">رنگ کاغذ PH در محلول</th></tr><tr><th>اسیدی</th><th>بازی</th></tr><tr><td></td><td>SO_3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>سدیم اکسید</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>سلول گالوانی</th><th>نوع تبدیل انرژی</th><th>جهت حرکت الکترون ها</th><th>جهت حرکت آنیون ها</th><th>تغییر جرم کاتد با گذشت زمان</th></tr><tr><td>آلومینیوم - روی</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	خاصیت محلول	PH	$[H^+]$			$1/8 \times 10^{-2}$		۱۱/۴		نام ترکیب شیمیایی	فرمول شیمیایی	نوع اکسید		رنگ کاغذ PH در محلول	اسیدی	بازی		SO_3				سدیم اکسید					سلول گالوانی	نوع تبدیل انرژی	جهت حرکت الکترون ها	جهت حرکت آنیون ها	تغییر جرم کاتد با گذشت زمان	آلومینیوم - روی					۳
خاصیت محلول	PH	$[H^+]$																																				
		$1/8 \times 10^{-2}$																																				
	۱۱/۴																																					
نام ترکیب شیمیایی	فرمول شیمیایی	نوع اکسید		رنگ کاغذ PH در محلول																																		
		اسیدی	بازی																																			
	SO_3																																					
سدیم اکسید																																						
سلول گالوانی	نوع تبدیل انرژی	جهت حرکت الکترون ها	جهت حرکت آنیون ها	تغییر جرم کاتد با گذشت زمان																																		
آلومینیوم - روی																																						
۵	در هر مورد با خط زدن واژه نادرست ، عبارت داده شده را کامل کنید. آ) گاز آمونیاک $\frac{\text{اسید ضعیف}}{\text{باز ضعیف}}$ آرنوس به شمار می رود زیرا در آب $\frac{\text{غلظت یون هیدرونیوم}}{\text{غلظت یون هیدروکسید}}$ را به میزان کمی افزایش می دهد. ب) اگر مجرای لوله ای با رسوب $CaCO_3$ به سختی مسدود شده باشد ، استفاده از پاک کننده $\frac{\text{هیدروکلریک اسید یا جوهر نمک}}{\text{مخلوط آلومینیوم و سدیم هیدروکسید}}$ مناسب است. پ) محلول ۰/۱ مولار $\frac{HF}{KOH}$ رسانای خوب الکتریسیته است. ت) $e. m. f$ سلول $\frac{Au^{3+}}{Cu^{2+}}$ با $\frac{Mg}{SHE}$ ولتاژ بیشتری دارد. ث) از واکنش اسید معده با $\frac{NaHCO_3}{NH_4NO_3}$ به عنوان ضد اسید $[OH^-]$ $\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$ می یابد.	۲																																				
۶	در ساختار زیر عدد اکسایش کربن نشاندار شده را تعیین کنید.	۰/۵																																				



نوبت امتحانی: دیماه ۹۷
پایه: دوازدهم رشته: ریاضی/تجربی
تاریخ امتحان:
شروع امتحان: ۸ صبح
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز
دبیرستان غیر دولتی امام رضا(ع)

شماره دانش آموزی:
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
نام درس: شیمی

نام و نام خانوادگی دبیر: آقای همایونی	نمره به عدد:	نام و نام خانوادگی دبیر:	نمره به عدد:
تاریخ و امضاء:	نمره به حروف:	تاریخ و امضاء:	نمره به حروف:

ردیف	شرح سوالات	نمره
۷	در $C_{17}H_{35}COONa$ بخش آبدوست و آب گریز را مشخص کرده و بگویید چگونه مخلوطی پایدار از آب و چربی تشکیل میدهد؟	۱
۸	ساختار سلول گالوانی رسم کنید که در آن واکنش کلی زیر صورت گیرد. نیم واکنش آندی و کاتدی را بنویسید. $Zn(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$	۱/۵
۹	به ۲۰۰ لیتر آب $25^{\circ}C$ به تقریب چند میلی گرم HNO_3 اضافه کنیم تا PH به ۳ برسد؟ $HNO_3 = 63 g.mol^{-1}$ (از تغییر حجم صرف نظر کنید)	۱/۲۵

ردیف	شرح سوالات	نمره
۱۰	۲ گرم اسید قوی HA با جرم مولی ۸۰ را با آب مقطر به حجم ۵۰۰ ml می رسانیم ، با ۲۵۰ میلی لیتر از آن چند میلی لیتر محلول باز قوی BOH با $PH = 12$ به طور کامل خنثی می شود؟ $BOH(aq) + HA(aq) \rightarrow BA(aq) + H_2O(l)$	۱/۵
۱۱	با توجه به واکنش های مقابل به سوالات پاسخ مناسب دهید. $1) Fe_{(s)} + H_2O_{(l)} + O_{2(g)} \rightarrow Fe(OH)_{3(s)}$ $2) Pd^{2+}_{(aq)} + Cd_{(s)} \rightarrow Pd_{(s)} + Cd^{2+}_{(aq)}$ $3) M_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)} \rightarrow M^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)}$ آ) در واکنش (۱) گونه کاهنده و در واکنش (۲) گونه کاهش یافته را تعیین کنید. ب) اگر واکنش (۳) در جهت نوشته شده به طور طبیعی انجام نشود ، فلز M کدامیک از فلزهای Ag یا Zn است؟ چرا؟	۰/۵ ۰/۵







نوبت امتحانی: دیماه ۹۷
پایه: دوازدهم رشته: ریاضی/تجربی
تاریخ امتحان:
شروع امتحان: ۸ صبح
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز
دبیرستان غیر دولتی امام رضا(ع)


شماره دانش آموزی:
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
نام درس: شیمی

نام و نام خانوادگی دبیر: آقای همایونی	نام و نام خانوادگی دبیر:	نمره به عدد:	نمره به عدد:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	نمره به حروف:	نمره به حروف:

ردیف	شرح سوالات	نمره
۱۲	به موارد زیر پاسخ مناسب دهید. (۱) از سلول زیر به چه منظوری استفاده می شود؟ 	۰/۲۵
	(۲) واکنش کلی در سلول مقابل چیست؟ به چه نامی معروف است؟ 	۰/۷۵
	(۳) ورودی به آند و خروجی به کاتد در سلول زیر چیست؟ 	۰/۵
	(۴) در شکل زیر چه عنصری حفاظت کاتدی می شود؟ برای آن یک کاربرد بنویسید. 	۰/۵
	اطلاعات مورد نیاز:	
	$Mg > Al > Mn > Zn > Fe > H_2 > Cu > Ag > Pt > Au$ قدرت کاهندگی	



سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی ۳	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	ساعت شروع: ۱۰ صبح
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

	توجه : استفاده از ماشین حساب ساده (چهار عمل اصلی) مجاز است.																										
۱	با استفاده از واژه های درون کادر ، عبارت های زیر را کامل کنید. @Phys100 صابون - افزایش - اسید - کاهش - هیدرونیوم - پاک کننده غیر صابونی - اکسایش - هیدروکسید - باز * پاک کننده ای با فرمول همگانی RCOO^-Na^+ یک ... (آ) ... است. * کلسیم اکسید (CaO) یک ... (ب) ... آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون ... (پ) ... می شود. * در یک سلول گالوانی کاتد الکترودی است که در آن نیم واکنش ... (ت) ... رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن ... (ث) ... می یابد.	۱/۲۵																									
۲	در جدول زیر برخی ویژگی های کلوئیدها با مخلوط های دیگر مقایسه شده است. آن را کامل کنید. <table><tr><th>ویژگی</th><th>نوع مخلوط</th><th>سوسپانسیون</th><th>کلوئید</th><th>محلول</th></tr><tr><td>رفتار در برابر نور</td><td>نور را پخش ... (آ) ...</td><td>نور را پخش می کنند</td><td>نور را پخش ... (ب) ...</td><td></td></tr><tr><td>همگن بودن</td><td>ناهمگن</td><td>ناهمگن</td><td>ناهمگن</td><td>... (پ) ...</td></tr><tr><td>پایداری</td><td></td><td></td><td>... (ت) ...</td><td>پایدار است/ته نشین نمی شود</td></tr><tr><td>ذره های سازنده</td><td>ذره های ریز ماده</td><td>... (ث) ...</td><td>... (ج) ...</td><td></td></tr></table>	ویژگی	نوع مخلوط	سوسپانسیون	کلوئید	محلول	رفتار در برابر نور	نور را پخش ... (آ) ...	نور را پخش می کنند	نور را پخش ... (ب) ...		همگن بودن	ناهمگن	ناهمگن	ناهمگن	... (پ) ...	پایداری			... (ت) ...	پایدار است/ته نشین نمی شود	ذره های سازنده	ذره های ریز ماده	... (ث) ...	... (ج) ...		۱/۵
ویژگی	نوع مخلوط	سوسپانسیون	کلوئید	محلول																							
رفتار در برابر نور	نور را پخش ... (آ) ...	نور را پخش می کنند	نور را پخش ... (ب) ...																								
همگن بودن	ناهمگن	ناهمگن	ناهمگن	... (پ) ...																							
پایداری			... (ت) ...	پایدار است/ته نشین نمی شود																							
ذره های سازنده	ذره های ریز ماده	... (ث) ...	... (ج) ...																								
۳	با توجه به واکنش $\text{Sn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Sn}^{4+}(\text{aq}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ ، پاسخ دهید. (آ) کدام گونه کاهش یافته است؟ دلیل بنویسید؟ (ب) کدام گونه کاهنده است؟ (پ) معادله نیم واکنش اکسایش را نوشته و آن را موازنه کنید.	۱/۵																									
۴	با توجه به شکل های زیر پاسخ دهید. (آ) شکل (۱) چه نوع جامدی را نشان می دهد؟ (ب) کدام شکل ساختار الماس را نشان می دهد؟ (پ) اگر چگالی ساختار (۱) برابر $2/27 \text{ g.cm}^{-3}$ باشد، چگالی ساختار (۲) کدام یک از عددهای زیر است؟ a) $3/51 \text{ g.cm}^{-3}$ b) $1/96 \text{ g.cm}^{-3}$  شکل (۱) شکل (۲)	۰/۷۵																									
۵	pH شیره معده انسان در زمان استراحت حدود ۳/۷ است. غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در یک نمونه شیره معده در دمای اتاق بر حسب مول بر لیتر حساب کنید. $\log 2 = 0.3$	۱/۷۵																									
	" ادامه سؤالات در صفحه دوم "																										

سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی ۳	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	ساعت شروع: ۱۰ صبح
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۶	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید . شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید . (آ) استفاده از واژه "فرمول مولکولی" برای ترکیب $C_6H_{12}O_6(s)$ مناسب است. (ب) در آبکاری یک قاشق مسی با فلز نقره، قاشق باید به قطب مثبت باتری متصل شود. (پ) ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو ترکیب های یونی به شمار می روند.	۱/۲۵												
۷	با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر، پاسخ دهید.  پاراایلن  ترفتالیک اسید (آ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار را در این ترکیب تعیین کنید؟ (ب) قسمت های A و B قطبی یا ناقطبی هستند؟ (پ) حلال مناسب برای پاراایلن ، آب یا هگزان است؟ چرا؟	۱/۲۵												
۸	در هر مورد عبارت درست را کامل کنید. (آ) هرچه تفاوت بین نقطه ذوب و جوش یک ماده خالص $\frac{\text{بیش تر}}{\text{کم تر}}$ باشد، آن ماده در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده و نیروهای جاذبه میان ذره های سازنده مایع $\frac{\text{قوی تر}}{\text{ضعیف تر}}$ است. (ب) هنگامی که در دمای ثابت، غلظت یکی از مواد واکنش دهنده گازی در سامانه تعادلی کاهش یابد، واکنش در جهت $\frac{\text{برگشت}}{\text{رفت}}$ پیش می رود، تا به تعادل $\frac{\text{آغازی}}{\text{جدید}}$ برسد.	۱												
۹	در جدول زیر قدرت اسیدی دو اسید $CH_3COOH(aq)$ و $HNO_3(aq)$ مقایسه شده است. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><th>ردیف</th><th>نام اسید</th><th>فرمول شیمیایی</th><th>Ka</th></tr><tr><td>۱</td><td>نیترو اسید</td><td>$HNO_3(aq)$</td><td>$4 / 5 \times 10^{-4}$</td></tr><tr><td>۲</td><td>استیک اسید</td><td>$CH_3COOH(aq)$</td><td>$1 / 8 \times 10^{-5}$</td></tr></table> (آ) کدام اسید قوی تر است؟ چرا؟ (ب) در دمای ۲۵ درجه، pH محلول یک مولار کدام اسید ، (CH_3COOH) یا HNO_3 ، بزرگتر است؟ محاسبه لازم نیست، فقط دلیل بنویسید .	ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	Ka	۱	نیترو اسید	$HNO_3(aq)$	$4 / 5 \times 10^{-4}$	۲	استیک اسید	$CH_3COOH(aq)$	$1 / 8 \times 10^{-5}$	۱/۵
ردیف	نام اسید	فرمول شیمیایی	Ka											
۱	نیترو اسید	$HNO_3(aq)$	$4 / 5 \times 10^{-4}$											
۲	استیک اسید	$CH_3COOH(aq)$	$1 / 8 \times 10^{-5}$											
" ادامه سؤالات در صفحه سوم "														

سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی ۳	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	ساعت شروع: ۱۰ صبح
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۱/۵	برای هر یک از عبارت های زیر دلیل بنویسید. (آ) در اثر ایجاد خراش در سطح حلبی، فلز آهن خورده می شود. (ب) سیلیسیم کاربید (SiC) در تهیه سنباده به کار می رود. (پ) با کاهش حجم سامانه تعادلی $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ در دمای ثابت، مقدار فراورده ها افزایش می یابد.	۱۰										
	$E^\circ (Fe^{2+}/Fe) = -0.44V$ $E^\circ (Sn^{2+}/Sn) = -0.14V$											
۱	با توجه به نمودارهای زیر پاسخ دهید. (آ) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان بیش تر است ؟ چرا؟ (ب) واکنش (۲) گرماده یا گرماگیر است؟ دلیل بنویسید.	۱۱										
۱/۲۵	با توجه به پتانسیل کاهش استاندارد مس و روی به پرسش های زیر پاسخ دهید . (آ) در سلول گالوانی روی - مس، کدام فلز نقش آند را ایفا می کند؟ چرا؟ (ب) emf سلول روی - مس را حساب کنید. (پ) کدام نمودار تغییر غلظت یون ها را در سلول گالوانی روی - مس به درستی نشان می دهد .	۱۲										
	$E^\circ (Cu^{2+}/Cu) = +0.34V$ $E^\circ (Zn^{2+}/Zn) = -0.76V$											
۱	با توجه به جدول زیر، پاسخ دهید. (آ) آیا با کاتیون پلاتین (Pt^{2+}) می توان یون کروم (Cr^{2+}) را اکسید کرد؟ چرا؟ (ب) آیا محلول نقره نیترات را می توان در ظرفی از جنس فلز آلومینیوم نگه داری کرد؟ چرا؟	۱۳										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نیم واکنش کاهش</th> <th>$E^\circ (V)$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$</td> <td>$+0.80$</td> </tr> <tr> <td>$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pt(s)$</td> <td>$+1.2$</td> </tr> <tr> <td>$Cr^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Cr^{2+}(aq)$</td> <td>$-0.12$</td> </tr> <tr> <td>$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$</td> <td>$-1.59$</td> </tr> </tbody> </table>	نیم واکنش کاهش	$E^\circ (V)$	$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	$+0.80$	$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pt(s)$	$+1.2$	$Cr^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Cr^{2+}(aq)$	-0.12	$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$	-1.59	
نیم واکنش کاهش	$E^\circ (V)$											
$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	$+0.80$											
$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pt(s)$	$+1.2$											
$Cr^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Cr^{2+}(aq)$	-0.12											
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$	-1.59											
ادامه سؤالات در صفحه چهارم "												

سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی ۳	رشته : ریاضی - فیزیک	تعداد صفحه: ۴	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	ساعت شروع: ۱۰ صبح
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۱۴	تبادل $A_2(g)+B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$ را در نظر بگیرید. با توجه به شکل زیر گرماده یا گرماگیر بودن آن را با نوشتن دلیل مشخص کنید. ۸۹°C ۳۲°C $A_2(g)$ $B_2(g)$ $AB(g)$ @Phys100	۰/۷۵								
۱۵	با توجه به نمودار زیر پاسخ دهید. (آ) با افزایش شعاع آنیون هالید، آنتالپی فروپاشی شبکه چه تغییری می کند؟ دلیل بنویسید. (ب) چگالی بار یون های لیتیم و پتاسیم را مقایسه کنید؟ (پ) نقطه ذوب لیتیم فلوئورید (LiF) بیشتر است یا نقطه ذوب پتاسیم برمید (KBr) ؟ دلیل بنویسید. آنتالپی فروپاشی شبکه (کیلوژول بر مول) Li^+ Na^+ K^+ F^- Cl^- Br^-	۱/۲۵								
۱۶	با توجه به معادله واکنش تعادلی زیر، پاسخ دهید. $2SO_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ (آ) عبارت ثابت تعادل واکنش را بنویسید. (ب) با توجه به جدول زیر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش (K) را $435^{\circ}C$ حساب کنید. <table><tr><th>ماده</th><th>$SO_2(g)$</th><th>$O_2(g)$</th><th>$SO_3(g)$</th></tr><tr><td>غلظت تعادلی ($molL^{-1}$)</td><td>4×10^{-2}</td><td>1×10^{-1}</td><td>2×10^{-5}</td></tr></table> (پ) با توجه به مقدار K محاسبه شده، میزان پیشرفت این واکنش در $435^{\circ}C$ کم است یا زیاد؟ چرا؟	ماده	$SO_2(g)$	$O_2(g)$	$SO_3(g)$	غلظت تعادلی ($molL^{-1}$)	4×10^{-2}	1×10^{-1}	2×10^{-5}	۱/۵
ماده	$SO_2(g)$	$O_2(g)$	$SO_3(g)$							
غلظت تعادلی ($molL^{-1}$)	4×10^{-2}	1×10^{-1}	2×10^{-5}							
	موفق باشید.	جمع نمره								
	۲۰									

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی- فیزیک	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی ماه سال ۱۳۹۷		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	
ردیف	راهنمای تصحیح @Phys100		
۱	(آ) صابون (۰/۲۵) (صفحه ۱۱) (ب) باز (۰/۲۵) (پ) هیدروکسید (۰/۲۵) (صفحه ۱۶) (ت) کاهش (۰/۲۵) (ث) افزایش (۰/۲۵) (صفحه ۲۵)		
۲	(آ) می کنند (۰/۲۵) (ب) نمی کنند (۰/۲۵) (پ) همگن (۰/۲۵) (ت) پایدار است یا نه نشین نمی شود. (۰/۲۵) (ث) توده های مولکولی (۰/۲۵) (ج) یون ها یا مولکول ها (۰/۲۵) (صفحه ۷)		
۳	(آ) Fe^{2+} (۰/۲۵) الکترون به دست آورده است. (۰/۲۵) (ب) Sn^{2+} (۰/۲۵) (پ) $Sn^{2+}(aq) \rightarrow Sn^{4+}(aq) + 2e^-$ (نوشتن درست نیم واکنش ۵/۵ نمره و قرار دادن ضریب ۲ برای الکترون ۰/۲۵ نمره) (صفحه ۴۲) (ت) جامد کووالانسی (۰/۲۵) (ب) شکل (۲) (۰/۲۵) (پ) ۳/۵۱ یا گزینه a (۰/۲۵) (صفحه ۶۹)		
۴	(آ) جامد کووالانسی (۰/۲۵) (ب) شکل (۲) (۰/۲۵) (پ) ۳/۵۱ یا گزینه a (۰/۲۵) (صفحه ۶۹)		
۵	انمره) $[H^+] = 10^{-pH} \xrightarrow{pH=2/7} [H^+] = 10^{-2/7} = 10^{-4} \times 10^{1/7} = 2 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ (صفحه ۲۵) $[H^+][OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$ (۰/۷۵)		
۶	(آ) درست. (۰/۲۵) (ب) نادرست. (۰/۲۵) قاشق باید نقش کاتد را ایفا کند و به قطب منفی باتری متصل شود. (صفحه ۶۲) (پ) نادرست. (۰/۲۵) ترکیب هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، جزو مواد مولکولی به شمار می روند. (صفحه ۸۷)		
۷	(آ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار، ۳+ است. (۰/۲۵) (صفحه ۶۳) (ب) قسمت A قطبی (۰/۲۵) قسمت B ناقطبی. (۰/۲۵) (صفحه ۵ قسمت ب) سوال ۱) (پ) هگزان. (۰/۲۵) زیرا پارازیلین یک مولکول ناقطبی است و هگزان هم یک حلال ناقطبی است. (۰/۲۵) (صفحه ۶ قسمت ث) سوال ۱)		
۸	(آ) بیش تر (۰/۲۵) قوی تر (۰/۲۵) (صفحه ۷۶) (ب) برگشت (۰/۲۵) جدید (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۳)		
۹	(آ) نیترواسید (یا HNO_3) (۰/۲۵) ثابت یونش (K_a) آن بزرگ تر است. (۰/۵) (صفحه ۲۳) (ب) استیک اسید (۰/۲۵) اسید ضعیف تری است و میزان یونش آن در آب کمتر (۰/۲۵). از این رو غلظت یون هیدرونیوم در محلول امولار آن کمتر می باشد. (۰/۲۵) (نتیجه جدول صفحه ۲۸)		
۱۰	(آ) زیرا E° فلز آهن کوچک تر است و تمایل آن به الکترون دادن و اکسید شدن بیش تر است. (۰/۵) (صفحه ۵۹ قسمت آ) سوال ۱) (ب) یک جامد کووالانسی بسیار سخت است که می تواند بر سطح مواد خراش ایجاد کند. (۰/۵) (سوال ۲ صفحه ۸۷) (پ) با کاهش حجم، سامانه تعادلی در جهت شمار مولکول های کم تر یعنی رفت جابه جا می شود. (۰/۵) (صفحه ۱۰۵)		
ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم"			

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی- فیزیک علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵	
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی ماه سال ۱۳۹۷		مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	@Phys100	نمره
۱۱	آ) نمودار (۳) (۰/۲۵) انرژی فعال سازی آن کم تر است. در نتیجه سرعت آن بیشتر است. (صفحه ۹۵) ب) I گرماگیر (۰/۲۵) زیرا سطح انرژی فراورده ها بالاتر از واکنش دهنده ها است. (۰/۲۵) (صفحه ۹۵)		۱
۱۲	آ) فلز روی. (۰/۲۵) پتانسیل کاهش آن کوچک تر است. (۰/۲۵) (صفحه ۴۷) ب) $emf = E^{\circ}_{\text{کاتد}} - E^{\circ}_{\text{آند}} \Rightarrow emf = 0.34 - (-0.76) = 1.1V$ (۰/۵) پ) نمودار (۲) (۰/۲۵) (صفحه ۶۲)		۱/۲۵
۱۳	آ) بله. (۰/۲۵) زیرا E° آن بزرگ تر است و تمایل Pt^{2+} به الکترون گرفتن زیاد است. (صفحه ۴۷) ب) خیر (۰/۲۵) زیرا فلز آلومینیم می تواند به یون های نقره درون محلول الکترون بدهد و واکنش انجام شود. (۰/۲۵) (صفحه ۴۷)		۱
۱۴	آ) گرماده. (۰/۲۵) با کاهش دما، تعادل در جهت رفت جابه جا شده (۰/۲۵) و مقدار فراورده ها افزایش یافته است. (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۵)		۰/۲۵
۱۵	آ) کاهش می یابد. (۰/۲۵) آنتالپی فروپاشی شبکه با شعاع آنیون رابطه ی وارونه دارد. (۰/۲۵) ب) چگالی بار یون لیتیم بزرگ تر است. (۰/۲۵) پ) لیتیم فلوئورید (۰/۲۵) آنتالپی فروپاشی شبکه آن بیش تر است (۰/۲۵) (صفحه ۷۹)		۱/۲۵
۱۶	آ) $K = \frac{[SO_2]^2}{[SO_3]^2 [O_2]}$ (۰/۵) (صفحه ۱۰۱) ب) $K = \frac{(2 \times 10^{-5})^2}{(4 \times 10^{-2})^2 (1 \times 10^{-1})} = 2.5 \times 10^{-6}$ (۰/۵) عدد گذاری درست هر عبارت ثابت تعادل ۰/۲۵ نمره و جواب آخر ۰/۲۵ نمره (صفحه ۱۰۲) پ) میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است. (۰/۲۵) ثابت تعادل واکنش بسیار کوچک است. (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۲)		۱/۵
	خسته نباشید.	جمع نمره	۲۰

همکار محترم: لطفا در صورت مشاهده پاسخ های صحیح و مشابه کتاب درسی نمره منظور فرمایید.

@Phys100

نام و نام خانوادگی:	آزمون شیمی ۳ (نوبت اول)	به نام خداوند جان و خرد
	تاریخ امتحان: ۹۷/۱۰/	دبیرستان ، منطقه تهران
	زمان پاسخ‌گویی: ۸۵ دقیقه	نام دبیر:

بارم	ردیف	"دانش‌آموز گرامی، پاسخ هر پرسش را با دقت در فضای جلوی آن بنویسید و استفاده از ماشین حساب در این آزمون ممنوع است"
۱/۲۵	۱	در هر مورد با خط زدن واژه نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید. (آ) برای افزایش قدرت پاک‌کنندگی مواد شوینده به آنها نمک‌های (سولفات * فسفات) می‌فزایند. (ب) در میان فلزهای موجود در جدول دوره‌ای (لیتیم * طلا) کم‌ترین پتانسیل کاهشی استاندارد را دارد. (پ) pH محلول شیشه پاک‌کن در شرایط یکسان از محلول لوله بازکن (کم * بیش) تر است. (ت) فلزهای فعال را می‌توان از برق‌کافت (محلول نمک * نمک مذاب) آنها تهیه کرد. (ث) محلول آبی اسیدها در واکنش با (اغلب * همه) فلزها، گاز و نمک تولید می‌کنند.
۲/۲۵	۲	با توجه به نمودار زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول در دمای اتاق بیش‌تر است؟ چرا؟ (ب) درصد یونش و ثابت یونش $HA(aq)$ را حساب کنید. (پ) pH و $[OH^-]$ را برای $HB(aq)$ حساب کنید. ($\log 2 = 0.3$ و $\log 3 = 0.5$)

کانال شیمی اصفهان
@esfchemistry

درستی یا نادرستی هریک از جمله‌های زیر را مشخص کنید و شکل درست واژه نادرست را بنویسید.

(آ) اوره با فرمول مولکولی $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ، یک ترکیب قطبی و محلول در هگزان است..

(ب) سلول‌های سوختی، دوستدار محیط زیست بوده و منبع انرژی سبز هستند.


(پ) در شرایط یکسان، سرعت واکنش منیزیم با محلول هیدرویدیک اسید کم‌تر از هیدروفلوئوریک اسید است.

(ت) عدد اکسایش کربن در CH_2F_2 برابر با $+1$ است.

اگر در شکل روبه‌رو لوله A حاوی آب روغن باشد :

(آ) لوله B حاوی چه نوع مخلوطی هستند؟

(ب) توضیح دهید با افزودن چه ماده‌ای می‌توان مخلوط A را به B تبدیل کرد؟



برای هر جمله از ستون «آ»، تنها یک واژه مناسب از ستون «ب» بیابید و در نقطه چین بنویسید.


«ب»	«آ»
* خوردگی - آمونیاک -	محلول آبی آن یک پاک‌کننده خورنده به شمار می‌رود.
سلول الکترولیتی -	فراورده صنعتی مهمی که در محل مورد نیاز الکتریسته تولید می‌کند.
هیدروژن کلرید -	محلول آبی این ماده در دمای اتاق یک سامانه تعادلی است.
باتری - خنثی شدن -	از جمله واکنش‌های اکسایش - کاهش ناخواسته و زیان‌بار است.
پتاسیم نیترات *	

با توجه به شکل (آبکاری قاشق فلزی را با نقره)، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

(آ) قاشق فلزی به کدام قطب باتری (آند یا کاتد) متصل است؟

(ب) نام یا فرمول شیمیایی الکترولیت را بنویسید.

(پ) معادله نیم‌واکنش آندی انجام شده در این سلول را بنویسید.




کانال شیمی اصفهان
@esfchemistry

با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید.

(آ) این شکل کدام یک از قلمروهای الکتروشیمی را نشان می‌دهد؟

(ب) توضیح دهید آیا محلول درون بشر با جوش شیرین واکنش می‌دهد؟



نام و نام خانوادگی:	آزمون شیمی ۳ (نوبت اول)	به نام خداوند جان و خرد
	تاریخ امتحان: ۹۷/۱۰/	دبیرستان ، منطقه تهران
شماره کلاس:	زمان پاسخ‌گویی: ۸۵ دقیقه	نام دبیر:

برای هریک از موارد زیر، دلیلی بنویسید.

(آ) پاک‌کننده‌ها و داروها دو دسته از موادی هستند که نقش مهمی در افزایش شاخص امید به زندگی دارند.

(ب) بازیافت فلز آلومینیم روش مناسب‌تری از تهیه این فلز به روش هال است.

(پ) برای کاهش خاصیت اسیدی خاک به آن اهک می‌فزایند.

(ت) استیک اسید (CH_3COOH)، یک اسید تک‌پروتون‌دار به شمار می‌رود.



(ث) برای حفاظت از لوله‌های نفت که از جنس آهن هستند، از فلز منیزیم استفاده می‌شود.

کانال شیمی اصفهان
@esfchemistry

۲/۵

۸

محلول‌های (۱) و (۲) به حجم 50 L تهیه شده‌اند و شکل زیر pH نمونه‌ای از هریک را نشان می‌دهد. در هر مورد حساب کنید چه جرمی از حل شونده برای تهیه محلول به کار رفته است؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{Br} = 80$)





? g HBr

? g NaOH

۲

۹

۱/۲۵		با توجه به شکل سلول مس - پلاتین به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) هریک از نمادهای A ، B و C نشان‌دهنده چیست؟ (ب) واکنش کلی سلول را بنویسید. (ب) نیروی الکتروموتوری آن را حساب کنید.	۱۰
۱/۵		با توجه به شکل که انحلال $N_2O_5(s)$ را در آب نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) معادله واکنش را بنویسید. (ب) اگر هر ذره هم‌ارز با ۰/۰۱ مول و حجم محلول ۲۵۰ میلی‌لیتر باشد، pH محلول را حساب کنید. $\log 2 = 0.3$	۱۱
۱	برای ورقه آهنی که با لایه نازکی از قلع پوشیده شده است، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (آ) نام این نوع آهن چیست و چه کاربردی دارد؟ (ب) در اثر ایجاد خراش در سطح این نوع آهن، کدام فلز خورده می‌شود؟ چرا؟		۱۲
۱/۵	به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (آ) با رسم ساختار لوویس یون $S_2O_3^{2-}$، عدد اکسایش اتم مرکزی را تعیین کنید (* راهنمایی : اتم مرکزی یکی از اتم‌های گوگرد است). (ب) با توجه به واکنش‌های داده شده گونه‌های اکسنده را با نوشتن دلیل برحسب کاهش قدرت مرتب کنید. $2Cr^{3+}(aq) + Ni^{2+}(aq) \rightarrow 2Cr^{2+}(aq) + Ni(s)$ $Zn(s) + Ni^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Ni(s)$ $Zn(s) + 2Cr^{3+}(aq) \rightarrow 2Cr^{2+}(aq) + Zn^{2+}(aq)$		۱۳

نام و نام خانوادگی:	آزمون شیمی ۳ (نوبت اول)		به نام خداوند جان و خرد	
	تاریخ امتحان: ۹۷/۱۰/		دبیرستان ، منطقه تهران	
	شماره کلاس:		نام دبیر:	
	زمان پاسخ‌گویی: ۸۵ دقیقه			

برای پاسخ دادن به پرسش‌های این آزمون می‌توانید از داده‌های جدول زیر استفاده کنید.

نیم‌واکنش کاهش	$E^\circ (V)$
$Au^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Au(s)$	$+1/5^\circ$
$Pt^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Pt(s)$	$+1/2^\circ$
$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$	$+0/8^\circ$
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$	$+0/34^\circ$
$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$	$0/0^\circ$
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Fe(s)$	$-0/44^\circ$
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$	$-0/76^\circ$
$Mn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Mn(s)$	$-1/18^\circ$
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Al(s)$	$-1/66^\circ$
$Mg^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Mg(s)$	$-2/37^\circ$

$$E^\circ (Sn^{2+} / Sn) = -0/14 V$$

H ۱																	He ۲
Li ۳	Be ۴											B ۵	C ۶	N ۷	O ۸	F ۹	Ne ۱۰
Na ۱۱	Mg ۱۲											Al ۱۳	Si ۱۴	P ۱۵	S ۱۶	Cl ۱۷	Ar ۱۸
K ۱۹	Ca ۲۰	Sc ۲۱	Ti ۲۲	V ۲۳	Cr ۲۴	Mn ۲۵	Fe ۲۶	Co ۲۷	Ni ۲۸	Cu ۲۹	Zn ۳۰	Ga ۳۱	Ge ۳۲	As ۳۳	Se ۳۴	Br ۳۵	Kr ۳۶
Rb ۳۷	Sr ۳۸	Y ۳۹	Zr ۴۰	Nb ۴۱	Mo ۴۲	Tc ۴۳	Ru ۴۴	Rh ۴۵	Pd ۴۶	Ag ۴۷	Cd ۴۸	In ۴۹	Sn ۵۰	Sb ۵۱	Te ۵۲	I ۵۳	Xe ۵۴
Cs ۵۵	Ba ۵۶	La ۵۷	Hf ۷۲	Ta ۷۳	w ۷۴	Re ۷۵	Os ۷۶	Ir ۷۷	Pt ۷۸	Au ۷۹	Hg ۸۰	Tl ۸۱	Pb ۸۲	Bi ۸۳	Po ۸۴	At ۸۵	Rn ۸۶

شاد، تندرست و پیروز باشید

کانال شیمی اصفهان
@esfchemistry